

## 衛生福利部國民健康署提供低收入戶及中低收入戶國中青少年

### (出生日期 88 年 9 月 1 日至 91 年 8 月 31 日) 接種 HPV 疫苗

子宮頸癌是國人女性很常見的一種癌症，而子宮頸癌是因為長期感染人類乳突病毒（HPV）所引起的。現在已經研發出疫苗，可以預防這類病毒的感染，進而減少 6 至 7 成的子宮頸癌發生，相關的資訊可以參考下列所附之「HPV 疫苗介紹」。

由於 HPV 疫苗價格昂貴，政府為了照顧收入較少的家庭，將補助其家中就讀國中的女兒施打 HPV 疫苗。

**提醒:**若已完成或曾經完成 3 劑 HPV 疫苗接種，則無須再接種。

如有相關疑問，歡迎於上班時間電話洽詢免付費專線: 0800-212-008 及各縣市衛生局，或洽國民健康署癌症防治組：02-25220888 轉 792、785。



### 人類乳突病毒(HPV)疫苗介紹

#### 子宮頸癌很常見嗎？

子宮頸癌是女性常見的癌症，主要是因為感染人類乳突病毒（HPV）造成的。雖然女性一生中有高達 5 至 7 成的機會感染，大部分的人感染後會經由身體的免疫系統自行清除，但如果無法清除而成為長期感染的帶原者，未來罹患子宮頸癌的機率就大增。

#### 接種 HPV 疫苗可以預防子宮頸癌嗎？

會感染女性生殖道的人類乳突病毒約有 40 種分型。而約有 6 至 7 成的子宮頸癌是因為感染第 16、18 型的病毒而引起的。接種 HPV 疫苗就是在預防感染第 16、18 型的病毒，因而可以預防 6 至 7 成的子宮頸癌的發生。

#### HPV 疫苗終身有效嗎？以後還要不要補打？

目前研究證實 HPV 疫苗至少有 7 年以上的保護力，但因 HPV 疫苗是上市不久的疫苗故追蹤期不夠長，未來是否需要再補打疫苗，仍需觀察後才能知道。

#### 接種後有什麼常見的副作用？

施打 HPV 疫苗比較常見的副作用是接種部位紅腫、疼痛，以及發燒、噁心和暈眩。雖然國際上之報告顯示接種後有少數發生關節炎、多發性硬化症、基蘭巴瑞德症候群(是很少見的肌肉無力疾病)，或死亡之案例，但經判讀分析個案資料後，皆未證實是因接種疫苗引起。提醒您接種後如果出現相關不適症狀時請儘速就醫詢問專業醫師意見。

#### 接種時要注意些什麼？

1. 懷孕或準備懷孕的人不建議接種。
2. 需在 6 個月內接種完 3 劑，否則會影響疫苗效果。
3. 與接種其他疫苗相同，如身體有任何特殊狀況須事先告訴醫師。
4. 仍有 3 至 4 成的子宮頸癌是因為感染其他型別的人類乳突病毒所引起，因此接種疫苗後，在有性生活後仍需定期接受子宮頸抹片檢查，以及性行為時全程使用保險套。
5. 接種後有任何的異常反應，請務必通知當地縣市衛生局。

