

農藥使用範圍

普通名稱:托福松

農藥代號:I054

廠牌名稱:COUNTER

通過日期:074-06-01

劑型	含量	混合	作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	核准日期	原始登記廠商名稱	施藥方法	注意事項	備註
GR	10.000		十字花科蔬菜	切根蟲	10 公斤		播種時		1				1.種植前 3 日將藥劑施於畦面，並與土壤混拌約 5 公分深後種植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		大豆	莖潛蠅	20 公斤		種植前		1				1.將藥劑均勻施於畦溝中一次，覆土 3 公分後播種。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		甘蔗	寄生性線蟲	30 公斤		種植前		1				1.將藥劑均勻施於植溝內，覆土後植蔗。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.適用於春植砂質地灌溉方便之蔗園區。2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		甘蔗	地下害蟲	30 公斤		種植前		1				將藥劑均勻施於植溝 20~25 公分深處，覆土後植蔗。	1.適用於新植蔗園。2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		甘蔗	根瘤線蟲	30 公斤		種植前		1				1.將藥劑均勻施於植溝內，覆土後植蔗。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.適用於春植砂質地灌溉方便之蔗園區。2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		西瓜	根瘤線蟲	15 公斤		種植時		1				1.種植當日將藥劑施於植穴內，覆土後定植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	

劑型	含量	混合	作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用 時期	施藥 間隔	施用 次數	安全 採收期	核准 日期	原始登記 廠商名稱	施藥 方法	注意 事項	備註
GR	10.000		柑桔 類	寄生 性線 蟲	20 公斤 (每株施 用 50G)		萌芽 時		1				春芽萌發時，於樹 冠外圍下開 15 公 分深環溝，將藥劑 均勻撒佈於溝底， 覆土後灌水，保持 適當濕度。	1. 限春芽萌 發時施用， 生長期不可 施用; 2. 施藥 時必須戴手 套。	
GR	10.000		香蕉	球莖 象鼻 蟲	30G/每株		害蟲 發生 時			12			將藥劑均勻施用於 莖基周圍 15 公分 處，覆土後灌水， 保持適當濕度。	施藥時必須 戴手套。	
GR	10.000		番茄	根瘤 線蟲	15-20 公 斤		移植 前		1				1. 移植當日將藥劑 條施於 15 公分深 之植溝內，覆土後 定植。2. 土壤須保 持濕潤才能發揮藥 效。	1. 限種植前 使用，生長 期不可施用; 2. 施藥時必 須戴手套。	

農藥使用範圍

普通名稱:托福毆殺滅

農藥代號:N011

廠牌名稱:

通過日期:083-01-26

劑型	含量	混合	作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	核准日期	原始登記廠商名稱	施藥方法	注意事項	備註
GR	10.000	A	西瓜	根瘤線蟲	20 公斤		種植當日	-	1	-	83-09-27		1.種植當日將藥劑施於植溝內，覆土後定植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	

農藥使用範圍

普通名稱:芬滅松

農藥代號:N001

廠牌名稱:NEMACUR

通過日期:074-06-01

劑型	含量	混合	作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	核准日期	原始登記廠商名稱	施藥方法	注意事項	備註
EC	40.000		水稻	線蟲 白尖病		1000	預浸24小時,再浸藥2hr	-	-	-	85-09-17			和 24%毆殺滅(SL)一起使用。	
EC	40.000		柑桔類	寄生性線蟲	3 公升	2000	新芽萌發時	-	-	-	84-03-06			在樹冠下方均勻噴灑稀釋液每棵約15L,施藥前土讓宜保持適當濕潤	
EC	40.000		草莓	葉芽線蟲	0.16 公升	3000	浸苗時	-	-	-	-				
GR	10.000		水稻	線蟲 白尖病	每育苗箱 60g		秧苗綠化期		1	-	85-09-17		均勻撒佈	不可施用於本田	
GR	10.000		西瓜	根瘤線蟲	15 公斤		種植時		1	-			1.種植當日將藥劑施於植溝內,覆土後定植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用,生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		柑桔類	寄生性線蟲	30 公斤		萌芽時		1	-			春芽萌發時,於樹冠外圍下開15公分深環溝,將藥劑均勻撒佈於溝底,覆土後灌水,保持適當濕度。	1.限種植前使用,生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		胡蘿蔔	根瘤線蟲	20-40 公斤		播種前		1	-			1.施於植溝約10公分深處,覆土後種植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用,生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	

劑型	含量	混合	作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	核准日期	原始登記廠商名稱	施藥方法	注意事項	備註
GR	10.000		番茄	根瘤線蟲	30 公斤		移植時	-	1	-			1.移植當日將藥劑條施於 15 公分深之植溝內，覆土後定植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		菸草	根瘤線蟲	20-40 公斤		移植前	-	1	-			1.移植前將藥劑條施於植溝內，並與土壤混拌後覆土定植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		落花生	根瘤線蟲	15 公斤		種植時	-	1	-			1.種植當日將藥劑條施於 15 公分深之植溝內，覆土後播種。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		薑	根瘤線蟲	100 公斤		開溝條施後	-	1	-			1.將藥劑條施於植溝內覆土後，經 10~14 天種植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	5.000		西瓜	根瘤線蟲	30 公斤		種植時	-	1	-	79-03-06		1.種植當日將藥劑施於植溝內，覆土後定植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	

農藥使用範圍

普通名稱:福瑞松

農藥代號:I155

廠牌名稱:THIMET

通過日期:074-06-01

劑型	含量	混合	作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	核准日期	原始登記廠商名稱	施藥方法	注意事項	備註
GR	10.000		大豆	蚜蟲	10 公斤		種植前		1				1.將藥劑均勻施於植溝中一次，覆土 3 公分後播種。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		大豆	神澤氏葉蟬	10 公斤		種植前		1				1.將藥劑均勻施於植溝中一次，覆土 3 公分後播種。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		大豆	潛蠅	10 公斤		種植前		1				1.將藥劑均勻施於植溝中一次，覆土 3 公分後播種。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		甘蔗	寄生性線蟲	30 公斤		種植前		1				1.將藥劑均勻施於植溝內，覆土後植蔗。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.適用於春植砂質地灌溉方便之蔗園區。 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		甘蔗	地下害蟲	40 公斤		種植前		1				1.將藥劑均勻施於植溝內，覆土後植蔗。 2.金針蟲為害嚴重地區之秋植蔗園準備下年期留宿根者，除新植前施藥外，可於培土期(1~2月間)再增施同藥量一次。3. 防治蔗龜時應提早於一月間開根，並將同藥量之藥劑施於蔗株兩側 20~25 公分深處後覆土。4.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.適用於宿根蔗園。 2.施藥時必須戴手套。	

劑型	含量	混合	作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	核准日期	原始登記廠商名稱	施藥方法	注意事項	備註
GR	10.000		豆類	豆蚜	10 公斤		種植前		1				1.將藥劑與適量之砂土混拌後均勻施於植溝中，覆土 3 公分後種植。2.一公克藥劑施用 4 穴。3.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		豆類	根潛蠅	10 公斤		種植前		1				1.將藥劑與適量之砂土混拌後均勻施於植溝中，覆土 3 公分後種植。2.一公克藥劑施用 4 穴。3.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		豆類	莖潛蠅	10 公斤		種植前		1				1.將藥劑與適量之砂土混拌後均勻施於植溝中，覆土 3 公分後種植。2.一公克藥劑施用 4 穴。3.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		香蕉	花薊馬	30 公斤		花薊抽出後								
GR	10.000		棉花	棉蚜	12.5 公斤		開花前		1				1.播種時，將藥劑施於距離種穴 2 公分，深約 5 公分處後覆土。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		棉花	二點小綠葉蟬	12.5 公斤		開花前		1				1.播種時，將藥劑施於距離種穴 2 公分，深約 5 公分處後覆土。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		菜豆	根潛蠅	10 公斤		種植前		1				1.將藥劑與適量之砂土混拌後均勻施於植溝中，覆土 3 公分後種植。2.一公克藥劑施用 4 穴。3.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	

劑型	含量	混合	作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	核准日期	原始登記廠商名稱	施藥方法	注意事項	備註
GR	10.000		菜豆	莖潛蠅	10 公斤		種植前		1				1.將藥劑與適量之砂土混拌後均勻施於植溝中，覆土 3 公分後種植。2.一公克藥劑施用 4 穴。3.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		菜豆	豆蚜	10 公斤		種植前		1				1.將藥劑與適量之砂土混拌後均勻施於植溝中，覆土 3 公分後種植。2.一公克藥劑施用 4 穴。3.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		菜豆	赤葉蟬	10 公斤		種植前		1				1.將藥劑與適量之砂土混拌後均勻施於植溝中，覆土 3 公分後種植。2.一公克藥劑施用 4 穴。3.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		鳳梨	粉介殼蟲	0.5G/株									缺水地區	
GR	10.000		蔥	蔥潛蠅	20 公斤		種植前		1				1.將藥劑均勻施於植溝中一次，覆土後定植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套	

農藥使用範圍

普通名稱:毆殺滅

農藥代號:I167

廠牌名稱:VYDATE

通過日期:074-06-01

劑型	含量	混合	作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	核准日期	原始登記廠商名稱	施藥方法	注意事項	備註
GR	10.000		水稻	線蟲白尖病	每育苗箱 60g		秧苗綠化期		1	-	85-09-17		於秧苗綠化期均勻撒佈。	不可施用於本田	
GR	10.000		甘蔗	寄生性線蟲	40-60 公斤		種植時		1	-			1.將藥劑均勻施於植溝內，覆土後植蔗。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.適用於春植砂質地灌溉方便之蔗園區。2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		荖藤	根瘤線蟲	20 公斤		種植當日及「落藤」時各 1 次		共 2 次	40	99-08-04		1.種植當日將藥劑施於植溝內，覆土後定植。2.於「落藤」時條施於根莖旁後覆土。3.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		晚香玉	根瘤線蟲	40 公斤		種植當日		1	-	83-01-13	台灣杜邦股份有限公司	1.種植當日將藥劑施於植溝內，覆土後種植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	施藥時必須戴手套。	

劑型	含量	混合	作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	核准日期	原始登記廠商名稱	施藥方法	注意事項	備註
GR	10.000		番茄	根瘤線蟲	20-40 公斤		移植時	-	1	-			1.移植當日將藥劑條施於 15 公分深之植溝內，覆土後定植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
GR	10.000		菸草	根瘤線蟲	60 公斤		移植前	-	1	-			1.移植前將藥劑條施於植溝內，並與土壤混拌後覆土定植。2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用; 2.施藥時必須戴手套。	
SL	10.000		十字花科蔬菜	黃條葉蚤	2.4-4.8 公升	200	發生時每 7 天一次	7	-	6					
SL	10.000		水稻	線蟲白尖病		450								稻種預浸 24 小時後,再浸藥處理 2 小時	
SL	10.000		西瓜	番茄斑潛蠅		250		7-10		6					
SL	10.000		芥菜	番茄斑潛蠅	2.4-4.8 公升	200		7-10		6					

劑型	含量	混合	作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	核准日期	原始登記廠商名稱	施藥方法	注意事項	備註
SL	10.000		柑桔類	銹蟎	2.4-7.2公升	350	發生初期	21	7						
SL	10.000		柑桔類	潛葉蛾	2.4-7.2公升	350	萌芽時	7	7					五月至九月新芽萌發時每七日施藥一次	
SL	10.000		番茄	根瘤線蟲	30公撮/每株	200	於植株定植後第20天及第40天行根部灌注		3		96-09-29	台灣杜邦股份有限公司			
SL	10.000		番茄	根瘤線蟲	4.8公升	250	移植後							1. 10%毆殺滅粒劑每公頃每次用藥量20公斤。2. 10%毆殺滅溶液在移植後第20天及40天行葉面施藥。	
SL	10.000		落花生	根瘤線蟲	2.88-3.6公升	350	生長初期							1. 種植同時植溝處理;2. 種植當日應開溝15公分條施之,即可播種;3. 種植後20天、40天葉面噴藥各一次;4. 限生育早期(40天)施用	
SL	10.000		蒜	根蟻	24公升	450	發生時及每7天一次	7	3	26				限種植後45天內使用	