

常見毒品、新興毒品及物質濫用一覽表

| 序號 | 名稱 | 俗稱 | 毒品類 | 管制藥物分級 | 作用 | 危害 | 備註 |
|----|----------------------------|-------------------------|-------|---------|---------|---|---|
| 1 | 海洛因 (Heroin) | 4號仔、白粉、細仔、軟仔 | 第一級毒品 | 中樞神經抑制劑 | 第一級管制藥物 | 吸食後感欣快感。 | 長期使用易產生依賴性，使用後容易出現情緒不穩、精神弛急，且常見靜脈注射居多，因其共用注射針頭及針頭，造成感染愛滋病及病毒性肝炎風險。 |
| 2 | 嗎啡 (Morphine) | 咖啡 | 第一級毒品 | 中樞神經抑制劑 | 第一級管制藥物 | 吸食後最典型之感覺為興奮及欣快感，但隨之而來的是陷入沉醉狀態，長期使用會產生耐受性及心理、生理依賴性。 | 長期使用易產生依賴性，使用過量出現呼吸抑制、血壓降低、意識改變、運動不協調症狀。 |
| 3 | 古柯鹼 (cocaine) | 可卡因、可可精、快克 (Crack)、Coke | 第一級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 第一級管制藥物 | 阻斷神經傳導而達到局部麻醉效果，刺激大腦皮質而興奮、不安、多話。 | 長期使用容易產生感官幻覺、多疑、猜忌、妄想等精神症狀，過量會產生胡言亂語、呼吸衰竭、心臟麻痺等症狀。 |
| 4 | (甲基)安非他命 (Methamphetamine) | 冰塊、安公子、冰糖、安仔、炮仔 | 第二級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 第二級管制藥物 | 提神、疲勞感消失、活動力增加、食慾減退、欣快感及衝動、心跳加快與體溫升高。 | 長期使用可能會引發類似思覺失調症、猜忌、妄想、情緒不穩、幻覺、強迫或重複性的行為及睡眠障礙等，常暴力攻擊行為等。戒斷症狀：疲倦、沮喪、焦慮、易怒、全身無力等。 |
| 5 | 大麻 (Marijuana) | 草、麻仔、老鼠尾巴、420 | 第二級毒品 | 中樞神經迷幻劑 | 第二級管制藥物 | 使用後出現興奮、幻覺、亢奮等現象。 | 厭食、焦慮、不安、躁動、憂鬱、睡眠障礙、記憶及認知能力減退、憂鬱、多疑、失去方向感等症狀。 |

常見毒品、新興毒品及物質濫用一覽表

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 6 Flunitrazepam | FM2、約會強暴丸、十字架、615、815、強姦藥丸 | 第三級毒品 中樞神經抑制劑 | 第三級管制藥物 鎮靜安眠。 | 過量使用會引起嗜睡、注意力無法集中、憂鬱等情況。 | |
| 7 佐沛眠(Zolpidem) | | 第四級毒品 中樞神經抑制劑 | 第四級管制藥物 具有鎮靜效果。 | 過量使用會造成暈眩、幻覺、意識障礙等症狀。 | |
| 8 二氫去氧嗎啡(Desomorphine) | 鱷魚(Krokodil) | 第一級毒品 中樞神經抑制劑 | 第一級管制藥物 擁有效率且強效的類鴉片藥物的鎮靜、止痛效果。 | 壞疽、靜脈炎、血栓、肺炎、腦膜炎、敗血症、骨髓炎、肝腎損傷、腦損傷及愛滋病毒感染等。 | |
| 9 (Phencyclidine ; PCP) | 苯環利定 天使塵(Angel Dust)、Love boat | 第二級毒品 中樞神經迷幻劑 | 第二級管制藥物 原為麻醉用途，因使用後產生幻覺、欣快感而遭濫用。 | 會引起幻覺、躁動、胡言亂語、喪失方向感、暴力傾向、思覺失調等。 | |
| 10 3,4-亞甲基雙氫焦二異丁基 (3,4-Methylenedioxypyrovalerone ; MDPV) | 浴鹽 | 第二級毒品 新興影響精神物質 中樞神經興奮劑 | 第二級管制藥物 強烈興奮感、性慾增強、飢餓感減弱、睡眠減少；僅攝入少量就易成癮。 | 恐慌、妄想、焦慮、躁動、失眠、營養不良、脫水、發汗、腹痛、流鼻血和全身痙攣等。 | |


常見毒品、新興毒品及物質濫用一覽表

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|--|
|  | 液態搖頭丸 (Gamma-Hydroxybutyrate ; GHB) | 第二級毒品 神仙水、G水 | 中樞神經抑制劑 | 第二級管制藥物 | 具鎮靜及麻醉效果。 | 昏睡、暈眩、噁心、暫時記憶性喪失、視幻覺、心搏減慢、痙攣、呼吸抑制、昏迷等。 |
|  | 亞甲雙氫甲基安非他命 (3,4-Methylenedioxymethylamphetamine ; MDMA) | 第二級毒品 搖頭丸、狂喜、忘我、綠蝴蝶、Ecstasy、金剛、梅粉 | 中樞神經興奮劑 | 第二級管制藥物 | 放快感、多話、提升感官敏感度。 | 焦慮、現實脫離感、短期記憶缺損、幻覺、自殺意念；過量時產生體溫過高、脫水、低血鈉、急性格血壓、橫紋肌溶解症及急性腎衰竭等症狀。 |
|  | 硝甲西泮 (Nimetazepam) | 第三級毒品 一粒眠、五仔、紅豆、Give Me Five | 中樞神經抑制劑 | 第三級管制藥物 | 治療焦慮、失眠、酒精戒斷、肌肉緊繃等症狀。 | 呕心、嘔吐、近期記憶喪失、反彈；性失眠、幻覺、憂鬱、呼吸抑制；對使用超過四周之長期使用者造成記憶力、注意力障礙。 |
|  | K他命 (Ketamine) | 第三級毒品 K他命、K仔、Special K、Cat Valium | 中樞神經抑制劑 | 第三級管制藥物 | 全身性麻醉劑，產生與現實環境解離作用。 | 專注力及記憶力受損、心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張而呈強直性、陣發性發作；罹患慢性間質性膀胱炎，使膀胱纖維化增厚，容量變小，甚至需進行膀胱重建手術。 |
|  | 4-甲基卡西酮 (Mephedrone) | 第三級毒品 啾啾、Meow Meow | 中樞神經興奮劑 | 第三級管制藥物 | 賦似安非他命和搖頭丸的作用，引發中樞神經、心血管或是腸胃道、泌尿系統異常。 | 嚴重幻覺、腦部受損、自殺傾向。 |

常見毒品、新興毒品及物質濫用一覽表

| | | | | | |
|----|--|---------------|---|---|---|
| 16 | 氯苯環戊酮 (Chlorophenyl cyclopentyl ketone) | 香 第三級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 第四級管制藥物 欣快感、時空認知扭曲的心理作用。 | 濫用可能產生心搏過速、高血壓、高熱、幻覺、妄想，嚴重甚至死亡。 |
| 17 | 3,4-亞甲基雙氫甲基卡西酮 (Methy lone) | bk-MDMA | 中樞神經興奮劑 第三級毒品 | 第三級管制藥物 作用與MDMA或甲基安非他命類似，無醫療用途；欣快感、多話、提升感官敏感度。 | 焦慮、現實脫離感、短期記憶缺損、精神病、幻覺、自殺意念。 |
| 18 | 甲基胺丙基苯并呋喃 (2-Methylaminopropyl) Benzofuran; MAPP) | 炸彈、Benzo Fury | 中樞神經興奮劑 第二級毒品 | 第二級管制藥物 亢奮。 | 高血壓、心跳加快、身體抽搐、痙攣伴隨劇烈心跳、失去意識，嚴重導致死亡。 |
| 19 | 卡痛(Kratom) | Biak、Ketum | 植物性成癮物質，少量會產生中枢神經性興奮；用量高時會造成鎮靜效果 第三級毒品 | 第三級管制藥物 鎮定劑、止痛藥。 | 噁心、發癢、冒汗、口乾舌燥、便祕、頻尿和食慾不振；長期使用會導致體重降低、厭食、失眠、妄想、錯覺和嚴重的混亂。 |
| 20 | 5-甲氨基-N,N-二異丙基色胺 (5-MeO-DiPT, 5-Methoxy-diisopropyl tryptamine) | 火狐狸 | 中樞神經迷幻劑 第四級毒品 | 第四級管制藥物 興奮感、強烈幻覺、對空間時間的感覺改變。 | 瞳孔放大、噁心、嘔吐、視覺及聽覺扭曲、腹瀉，過量使用具致命危險。 |

常見毒品、新興毒品及物質濫用一覽表

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------|------------------------|--|--------------------------------|---|--|
| 21 | 類大麻活性物質 | K2、Spicy | 第二級毒品、第三級毒品 中樞神經迷幻劑 | 中樞神經迷幻劑 第二級管制藥物 | 興奮感、強烈幻覺，改變對空間時間的感覺，迷幻效果比大麻更強。 | 焦慮、噁心、幻覺、妄想、心跳過速、短暫失憶、記憶受損、無方向感、狂躁、腦部認知功能改變、逐漸喪失協調性與專注力或昏迷，甚至傷害呼吸系統。 |  |
| 22 | 一氧化二氮，學名為氧化亞氮 (Nitrous oxide；N2O) | 笑氣、吹氣球 | 未列級； 列入關注化學物質 | 中樞神經抑制劑 不屬於管制藥物 | 全身心麻醉。 | 頭重腳輕、漂浮感、欣快感、手麻、立體感完全喪失、憂鬱，長時間使用會產生末梢神經及脊髓病變、癱瘓。 |  |
| 23 | 三甲氧笨乙胺 (Mescaline) | 麥司卡林、仙人掌毒鹼 | 第二級毒品 中樞神經迷幻劑 | 第二級管制藥物 中樞神經迷幻劑 | 服用後會心搏加快、體溫和血壓升高、皮膚發癢和乾燥。 | 幻覺、精神混亂、產生暴力行為。 |  |
| 24 | 恰特草(Xhat) | 阿拉伯茶、巧茶、東非罌粟 | 第二級毒品 中樞神經迷幻劑 | 含有第二級毒品卡西酮(Cathinone)與第四級毒品去甲麻黃鹼(Cathine) 第二級管制藥物 | 興奮、對中樞神經具有刺激作用。 | 引起擬交感神經興奮、造成瞳孔放大、心搏加快和血壓增加、易患潰瘍，食慾不振、長期使用會導致永久牙齒變黑(呈綠色)。 |  |
| 25 | 夫拉卡(Flakka) | 礫石 | 未列級數 未列級數 | 合成偽興奮劑卡西酮(Cathinone)的化學物質，是從阿拉伯茶提煉而成 | 興奮、不能入睡。 | 失眠、營養不良、腹痛、流鼻血、脫水、全身疼痛；精神方面幻覺、妄想、偏執、焦慮、短期記憶不足、心率增加、心跳異常、憂鬱、出汗增加、瞳孔散大。 |  |

常見毒品、新興毒品及物質濫用一覽表

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------|--|--|--|
| 26 | 毒郵票 | 混合性毒品 (二級及三級) | 多種強烈迷幻藥成分 , 主要成份為LSD | 興奮、感官放大、產生變形錯覺。 | 內含的LSD會對人體神經中樞產生損害，長期使用會誘發「思覺失調症」等症狀，自殘等行為。 |
| 27 | 毒品咖啡色 | 混合性毒品 (二級及三級) | 主要成份由二級毒品MDMA(搖頭丸)或MDPV(浴鹽)、三級毒品K他命等混合而成 | 飄飄然、興奮、幻覺。 | 幻覺、心律不整、記憶力衰退、大腦不可逆的傷害。 |
| 28 | Happy粉 | 混合性毒品 | 主要成份由K他命、副甲氨基甲基安非他命(DMHA)等混合而成，有水果味 | 興奮、全身發熱、增強性慾。 | 休克、猝死。 |
| 29 | α -PiHP(合成卡西酮類) | 混合性毒品 | 多種類型混合而成 | 全身性麻醉劑，產生與現實環境解離作用吸食後會有興奮感，而外型漂亮且無色無味。 | 迷幻、心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張而呈強直性、罹患慢性間質性膀胱炎。 |
| 30 | 甲氨基甲基安非他命 (Methoxymphetamine；MMA) | 第二級毒品 | 中樞神經興奮劑(安非他命及相似濫用物質) | 第二級管制藥物 | 心房性或心室性心律不整、高血壓、腦溢血、肺水腫、心臟衰竭、休克等。失眠、易怒、食慾減退、體重減輕、體溫過高、情緒改變、妄想思覺失調症、幻覺、幻聽、強迫性的反覆行為、中風等。 |

常見毒品、新興毒品及物質濫用一覽表

| | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---|---|
| 31 對甲氧基甲基安非他命 (Paramethoxymethamphetamine ; PMMA , 炸彈藥物)  | 第二級毒品 中樞神經興奮劑(安非他命及相似濫用物質) | 興奮、心搏加速、血壓上升、發汗及脫水。 | 第二級管制藥物 中樞神經抑制劑 | 抽搐、發抖、胡言亂語、休克、熱衰竭、腦水腫、中風、心律不整。 |
| 32 吩坦尼 (Fentanyl)  | 第二級毒品 芬太尼 | 中樞神經抑制劑 | 第二級管制藥物 頻鴉片類強效麻醉性止痛劑，藥效更勝嗎啡。常用於手術麻醉、癌症末期病患、重度疼痛、慢性頑固性疼痛。 | 懡心、嘔吐、便祕、暈眩、嗜睡、嚴重者會因呼吸抑制而導致死亡。 |
| 33 墨西哥鼠尾草 (Salvia divinorum)  | 第三級毒品 飛行草、夢境草 | 中樞神經迷幻劑 | 第三級管制藥物 出現類似大麻、LSD、K他命的迷幻作用，產生妄想、幻覺、混亂 | 嚴重導致精神障礙及思覺失調症。 |
| 34丙泊酚 (Propofol)  | 第四級毒品 牛奶針 | 中樞神經抑制劑 | 第四級管制藥物 全身性麻醉劑 | 失去意識、心跳減緩、呼吸抑制，嚴重者會導致死亡 |
| 35 依托咪酯 (Etmidate)  | 第三級毒品 噻尾毒品、睡眠煙彈、上頭煙、神奇菸彈 | 全身性麻醉劑 | 第四級管制藥物 醫療用途為麻醉，加入電子煙油吸食後幻覺、顫抖、站立不穩等狀況，類似酒醉模樣。 | 容易造成腎上腺功能傷害、抽搐、腦部神經損傷、噁心及嘔吐、嚴重者會因呼吸抑制而導致死亡。 |

常見毒品、新興毒品及物質濫用一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製
104年1月制訂、113年9月修訂九版

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--|
| 36 哈密瓜錠、蔓越莓錠 | 混合性毒品 多種類型混合而成 | 興奮、心搏加速並產生幻覺，以多種口味做為吸引賣點。 | 迷幻、心搏過速、血壓上升，意識改變進而造成精神障礙。 |
| 37 (Sibutramine) | 泰國減肥藥 第四級毒品 | 中樞神經抑制劑 第四級管制藥物 | 抑制食慾達到減肥效果興奮、心搏加速。 抑制食慾達到減肥效果興奮、心搏加速。 |
| 38 4-溴-2,5-二甲氨基苯基乙胺 (4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine) | 2C-B膠囊、六角楓葉、Nexus 第三級毒品 | 中樞神經迷幻劑 第三級管制藥物 | 低劑量會增強視覺、聽覺和觸覺感受；高劑量則導致幻覺是毒性極強的幻覺劑。 低劑量會增強視覺、聽覺和觸覺感受；高劑量則導致幻覺是毒性極強的幻覺劑。 |
|   | | | |