

荔枝椿象防治使用殺蟲劑

農藥普通名稱	含量	劑型	每公頃每次用藥量(公升)	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	安全採收期	注意事項
丁基加保扶	48.34	乳劑	0.6-1.5	1,000	害蟲發生時開始施藥	7天	21天	避免於開花期使用。
丁基加保扶	48.34	水基乳劑	0.6-1.5	1,000	害蟲發生時開始施藥	7天	21天	避免於開花期使用。
丁基加保扶	25	可濕性粉劑	0.8-2	750	害蟲發生時開始施藥	7天	21天	避免於開花期使用。
丁基加保扶	40	可濕性粉劑	0.5-1.3	1,200	害蟲發生時開始施藥	7天	21天	避免於開花期使用。
亞滅培	20	水溶性粉劑	0.2-0.4	4,000	害蟲發生時開始施藥	7天	7天	避免於開花期使用。
陶斯松	50	水基乳劑	0.3-0.8	1,800	害蟲發生時開始施藥	7天	10天	避免於開花期使用。
陶斯松	25	可濕性粉劑	0.6-1.5	1,000	害蟲發生時開始施藥	7天	10天	避免於開花期使用。
陶斯松	50	可濕性粉劑	0.3-0.8	1,800	害蟲發生時開始施藥	7天	10天	避免於開花期使用。
陶斯松	22.5	乳劑	0.6-1.5	1,000	害蟲發生時開始施藥	7天	10天	避免於開花期使用。
陶斯松	40.8	乳劑	0.3-0.8	2,000	害蟲發生時開始施藥	7天	10天	避免於開花期使用。
陶斯松	44.9	乳劑	0.3-0.8	2,000	害蟲發生時開始施藥	7天	10天	避免於開花期使用。
陶斯松	40.8	水基乳劑	0.3-0.8	2,000	害蟲發生時開始施藥	7天	10天	避免於開花期使用。
陶斯松	75	水分散性粒劑	0.2-0.4	3,500	害蟲發生時開始施藥	7天	10天	避免於開花期使用。
賽洛寧	1	可濕性粉劑	0.9-2.1	700	害蟲發生時開始施藥	7天	6天	避免於開花期使用。
賽洛寧	5	水分散性粒劑	0.2-0.4	3,500	害蟲發生時開始施藥	7天	6天	避免於開花期使用。
賽洛寧	2.8	乳劑	0.3-0.8	2,000	害蟲發生時開始施藥	7天	6天	避免於開花期使用。
賽洛寧	2.8	水懸劑	0.3-0.8	2,000	害蟲發生時開始施藥	7天	6天	避免於開花期使用。
賽洛寧	2.5	微乳劑	0.3-0.8	2,000	害蟲發生時開始施藥	7天	6天	避免於開花期使用。