

世界百大入侵植物

小花蔓澤蘭

每年8-9月為防治月



蔓藤植物 葉三角卵形 花冠白色



植物殺手

每平方公尺覆蓋面積可結17萬粒種子隨風散播莖節接觸土壤亦可萌芽；蔓莖一天生長24公分，原生植物遭覆蓋致死，嚴重影響生態平衡。

人工拔除
最有效

開花前拔
最省事

拔淨裝袋
最妥當



國際毒草

銀膠菊

發芽季為4-10月



銀膠菊莖部凹陷
夾雜深淺條紋

葉似艾草
花似滿天星



區別	銀膠菊	艾草
葉	葉片呈淡綠色 (無特殊氣味)	葉背為灰白色 (搓揉有濃香味)

植物殺手

移除方式

- 人力或簡單機具
- 農地以農耕機具清除
- 市售除草劑
(固殺草、嘉磷塞)
- ※**拔除後的植株**
- 以黑色垃圾袋悶腐
或乾燥後焚毀

提醒事項

分佈：
常見於休耕地、閒置地
及道路沿線等。

✔ **特別注意**
銀膠菊之腺毛、花粉等，對
有些人會造成過敏反應，拔
除時請著長袖衣物、手套及
口罩，移除後儘速洗手。



世界百大入侵植物

銀合歡



向陽性植物

幾乎整年開花結實



戰鬥力分析

- **攻擊力**：分泌含羞草毒素，造成單一林相。
- **繁殖力**：種子產量極高，據統計單株一年可產約 1-2萬顆種子，且發芽率高達60%。
- **生命力**：生長適應性強、抗旱，耐鹽鹼，幾乎無病蟲害；砍伐後，反提升萌蘖機會。
- **散佈力**：種子具休眠性，等待適合時機萌芽，由低海拔至中海拔之山區、河邊及路旁等都有它的蹤跡。

移除方式

- 利用挖除砍除、或注射藥劑、動物啃除等方式，發現立即連移除，接著以植相變方式，進行樹種造林撫育，並持續監控，加強移除幼苗及萌蘖，抑制其生長與種子萌發。

