

檔號：
保存年限：

財團法人台灣香蕉研究所 函

地址：904 屏東縣九如鄉玉泉村榮泉街 1 號
承辦人：翁敏雄
電話：(08)7392111~3
傳真：(08)7390595
E-mail：kaofone@yahoo.com.tw

受文者：台南市政府農業局

發文日期：中華民國 106 年 5 月 18 日

發文字號：(106)台蕉研發字第 3003 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：今(106)年 5-6 月正值香蕉抽穗高峰期，此時抽穗之蕉區，適逢香蕉花薊馬危害發生期，請務必把握防治時機，俾確保香蕉外觀優良品質蕉株，請查照。

說明：

- 一、香蕉花薊馬蟲口整年均可見，初春時期尤其猖獗，其中以種植「新北蕉」(寶島蕉)及「台蕉 7 號」(玉泉)且逢蕉株抽穗蕉園者最為嚴重。倘若香蕉花苞抽出莖頂，尚未彎曲前疏忽花薊馬防治，易導致花薊馬侵入花苞，在香蕉幼果果皮上產卵及剝吸汁液，造成果皮外表出現許多卵斑及水銹疤痕，嚴重者果皮出現裂痕，影響香蕉外觀品質至鉅。務請蕉農把握防治時機，進行花薊馬防治作業。
- 二、防治方法：每 3-5 天巡視蕉園 1 次，在花苞抽出莖頂前期或初彎前，選擇下列一種藥劑配方防治：
 - 1、以 2.8% 第滅寧乳劑 3,000 倍液，噴施剛抽出莖頂或初彎下花苞，每隔 5 天噴施 1 次，共噴 3 次。
 - 2、5% 陶斯松粒劑或 10% 福瑞松粒劑：每株 15 公克，分別撒施於第 1、2 葉鞘內，並於終花期前以 2.8% 第滅寧乳劑 3,000 倍液噴果房 1 次。
 - 3、終花後切除花苞，減少蕉園花薊馬密度。
 - 4、定期防除蕉園雜草，避免花薊馬滋生擴散。

農業局 106/05/23



1060545310



正本：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、台灣香蕉、芒果外銷業者聯誼會、台灣省青果運銷合作社、台灣省青果運銷合作社高雄分社、台灣省青果運銷合作社屏東分社、台灣省青果運銷合作社台中分社、台灣省青果運銷合作社嘉南分社、台灣省青果運銷合作社東台分社、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台中市政府農業局、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府農業局、高雄市政府農業局、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府

副本：行政院農業委員會農糧署、本所農場



蟲害預測中心