各項預防接種間隔時間一覽表

106.05版

疫苗種類		最短間隔時間
不活化疫苗	◆ B型肝炎疫苗（HepB） ◆ 白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗（DTaP） ◆ 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗混合疫苗（DTaP-IPV） ◆ 減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap） ◆ 減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（Tdap-IPV） ◆ 白喉破傷風混合疫苗（DT） ◆ 破傷風減量白喉混合疫苗（Td） ◆ 注射式小兒麻痺疫苗（IPV） ◆ 日本腦炎疫苗（JE） ◆ A型肝炎疫苗（HepA） ◆ b型嗜血桿菌疫苗（Hib） ◆ 流感疫苗（Flu） ◆ 狂犬病疫苗（Rabies） ◆ 多醣體流行性腦脊髓膜炎疫苗（MPSV4） ◆ 結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗（MCV4） ◆ 結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV） ◆ 多醣體肺炎鏈球菌疫苗(PPV) ◆ 人類乳突病毒疫苗(HPV) ◆ A型肝炎B型肝炎混合疫苗（HepA-HepB）# ◆ 五合一疫苗（DTaP-IPV-Hib） ◆ 六合一疫苗（DTaP-IPV-HepB-Hib）	◆ 與其他不活化疫苗可同時(分開不同部位接種)或間隔任何時間接種
活性減毒疫苗	◆ 卡介苗（BCG） ◆ 水痘疫苗（Varicella） ◆ 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR） ◆ 黃熱病疫苗（Yellow fever） ◆ 輪狀病毒疫苗（Rota） ◆ 口服小兒麻痺疫苗（OPV）# ◆ 日本腦炎疫苗（JE）	◆ 可同時接種，如不同時接種最少要間隔4週。如為口服活性減毒疫苗則可與其他活性減毒注射式疫苗同時或間隔任何時間接種。 ◆ 接受一般肌肉注射免疫球蛋白治療或HBIG者，宜間隔3個月後再接種MMR、水痘或JE疫苗*(palivizumab無須間隔)。 ◆ 輸過血或接受靜脈注射血液製品者，宜間隔6個月後再接種MMR、水痘或JE疫苗（Washed RBCs無須間隔）。 ◆ 曾靜脈注射高劑量（≧1g/kg）免疫球蛋白治療時，宜間隔11個月後再接受MMR、水痘或JE疫苗。
不活化疫苗 與 活性減毒疫苗	(上列兩種類)	◆ 霍亂疫苗與黃熱病疫苗應間隔3週以上。 ◆ 其他可同時(分開不同部位接種)或間隔任何時間接種。

備註：1.*：小於1歲之麻疹個案接觸者，如已施打肌肉注射免疫球蛋白(IMIG)，應間隔6個月以上再接種MMR或水痘疫苗。

2.#：國內已無進口。