

預防接種前幼兒健康評估表

■基本資料

姓 名：_____ 性 別：_____

出生日期：_____年_____月_____日 聯絡電話：(公/宅)_____

電子郵件：_____ (手 機)_____

體 溫：_____℃

■接種疫苗種類

- ☐卡介苗 ☐B型肝炎疫苗 ☐五合一疫苗(白喉、破傷風、非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺)
- ☐日本腦炎疫苗 ☐水痘疫苗 ☐麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗
- ☐結合型肺炎鏈球菌疫苗(_____價) ☐A型肝炎疫苗
- ☐幼兒流感疫苗3歲以下(曾經接種☐是, ☐否) ☐減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(小一新生)
- ☐幼兒流感疫苗3歲以上(曾經接種☐是, ☐否)

■接種劑次

☐第一劑 ☐第二劑 ☐第三劑 ☐第四劑 ☐第五劑

■健康評估

	評 估 內 容	評估結果	
		是	否
區	1. 預防接種後是否曾有嚴重特殊反應,如發高燒(40.5℃以上)、抽搐、昏迷、休克、哭鬧3小時以上……等。		
	2. 是否曾對同一類疫苗或對疫苗的任何成分(如雞蛋、明膠及新黴素)有過敏反應。		
	3. 目前是否有嚴重的心臟、肝臟、腎臟…等病症。		
	4. 接種活性減毒疫苗:本人或家屬是否有白血病、癌症、免疫缺失…等病史與家族遺傳疾病,或使用免疫抑制劑等。 ※本人30天內曾(或預定)施行腸道或肛門手術,應改接種注射式小兒麻痺疫苗。 ※本人如長期服用中藥,致無法評估,請轉介至兒科專科醫師評估後再接種。	本人	
里		家屬	
	5. 一年內有否抽搐狀況。		
	6. 最近三天內有無就醫、吃藥等情形,現在身體有無任何病徵,如發燒(38.5℃以上)、紅疹、皮疹、紫斑、嘔吐、呼吸困難…等或正服用水楊酸(阿斯匹靈)等藥物。		
	7. ☐ 最近三個月內曾否肌肉注射免疫球蛋白(免疫血清)。 ☐ 最近六個月內曾否輸過血或接受靜脈注射血液製品(Washed RBCs除外)。 ☐ 最近十一個月內是否曾靜脈注射高劑量($\geq 1\text{g/kg}$)免疫球蛋白。 ※上列狀況如經評估為「是」者,應依其規範之間隔時間,再接種水痘疫苗或麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗。		

■備註

1. 嬰幼兒服用未經衛生署核准及醫師處方之八寶粉、驚風散、珍珠粉等含重金屬之藥物容易發生慢性鉛中毒導致腦症及死亡,故應告知家長勿服用。
2. 水痘疫苗接種後六星期內不可服用阿斯匹靈。
3. 以上評估結果請按各項疫苗之禁忌,決定是否給予接種,水痘疫苗及MMR疫苗可同時接種,JE除與DTwP需間隔1M,餘可與其他疫苗同時接種。
4. 如無法判定,請協調家屬帶幼兒前往預注協辦醫院診所,請醫師詳細評估是否接種,如續由衛生所接種,請持醫師醫囑。
5. 接種疫苗前請詳細閱讀「兒童健康手冊」及相關衛教單張。
6. 本評估表紀錄後由各衛生所妥善保存六年。

評估後是否接種:是_____否_____ 評 估 者:_____

疫苗接種人員:_____ 家長簽名:_____

電腦登錄人員:_____ 日 期:_____年_____月_____日

101.12×200,000張