

嬰幼兒常規疫苗接種

ΩB 型肝炎疫苗

出生 24 小時內且出生體重達 2,000 克以上的寶寶應儘速接種第一劑疫苗，第二劑於滿月施打，滿 6 個月便可施打第三劑。

Ω 卡介苗

出生滿 24 小時且體重達 2,500 克的寶寶，若無其他特殊疾病問題，建議及早施打。

自（105）年 1 月 1 日起將卡介苗適合接種年齡由出生 24 小時後，調整為出生滿 5 個月，建議接種時間為出生滿 5-8 個月。

※若寶寶已接受「嚴重复合型免疫缺乏症」（SCID）的新生兒自費篩檢，應等待結果報告無異常後，再接種卡介苗疫苗。

除了卡介苗之外，還有麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗的三合一疫苗、水痘疫苗、口服輪狀病毒疫苗等活性疫苗，因這些疫苗含有減毒但仍具活性的病菌，因此，若寶寶患有免疫缺陷相關疾病，則不能施打這些疫苗。

Ω 五合一疫苗

五合一疫苗就是包含白喉、破傷風、百日咳、B 型嗜血桿菌、小兒麻痺等疾病的疫苗。

滿 2 個月可接種第一劑；滿 4 個月應接種第二劑；第三劑於滿 6 個月時接種；最後的第四劑則是滿 2 歲 3 個月接種。

Ω 流感疫苗

出生滿 6 個月大之後。

第一年需要打兩劑，兩劑間隔 4 星期，以後每年施打一次即可。

Ω 水痘疫苗

出生滿 1 歲後。

Ω 麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗

第一劑在滿 1 歲時接種；第二劑於滿 5 歲後，再接種。

Ω 日本腦炎疫苗

滿 1 歲 3 個月接種第一劑；在第一劑接種完畢後 2 星期，再接種第二劑；第三劑則於滿 2 歲 3 個月時接種；滿 5 歲後再接種第四劑即可。

Ω 肺炎鏈球菌疫苗

滿 2 個月大開始接種第一劑，滿 4 個月接種第二劑，第三劑為 12 至 15 個月以後。

Ω 輪狀病毒疫苗

素有幼兒國民病之稱的輪狀病毒為，幾乎每位 5 歲以下的嬰幼兒都被感染過，特別是秋冬交替季節。而目前臺灣有兩種口服輪狀病毒疫苗，分別為 2 劑型與 3 劑型，最早均可於 1.5 個月投予，服用間隔為 1~2 個月。

※自費疫苗，本所無施打。

Ω A 型肝炎疫苗

滿 1 歲時，可接種第一劑；第一劑後間隔 6 個月接種第二劑。

雖然臺灣本土很少見 A 型肝炎案例，但是經口傳染的 A 型肝炎，容易透過從到中國、東南亞等流行地區回臺的人而傳染。若是家中成員時常至上述地區，建議寶寶也接種 A 型肝炎疫苗。

提醒家長：寶寶滿 1 歲後該項疫苗可與麻疹腮腺炎德國麻疹混合、水痘、肺炎鏈球菌、日本腦炎及五合一等疫苗分開不同部位同時接種，保護幼兒健康。

※自費疫苗，本所無施打。

Ω 常見疫苗副作用為何？

多數疫苗的安全性都頗高，但還是可能會產生一些副作用，如：發燒、注射局部腫脹、手腳痠痛、睡眠不安穩或是食慾不振等，這些輕微副作用至多 2~3 天內就會消除。如接種部位紅腫嚴重或經過數日不退、出現化膿或持續發燒，應儘速就醫。

只有極少數才可能發生危及生命或身體健康的嚴重副作用，如：全身過敏、過敏性休克等。醫師建議，接受疫苗後，應先留在原地觀察 20~30 分鐘，倘若 30 分鐘內並無明顯的過敏反應，產生其副作用的機會就大為降低，但像是全身長疹子等過敏反應，可能在 1~2 天內發生，家長要持續注意。

預防注射是公共衛生問題，部分家長連公費疫苗都不願施打，認為目前臺灣少有此傳染病，其實這是所有人施打之後所形成非常緊密的防護網所致。倘若施打的人少，此防護網會鬆散，防護效果差。