



# 高風險跌倒 用藥手冊



北門區衛生所高齡友善藥局  
關心您的健康

臺南

TAINAN





# 抗組織胺用藥

## • 咳利寧液Colin solution 120cc/瓶



用途  
用法

- 止咳、化痰藥水
- 成人每次5ml，一日3~4次

副作用

- 多尿、頭痛、焦燥、複視、嗜睡

注意事項

- 可能引起睡意，服用後不可駕車



# 止咳用藥



## • 滅咳康複合膠囊Medicon-A Cap.

用途  
用法

- 止咳、化痰
- 一日3次

副作用

- 嗜睡、眩暈、發疹、噁心、嘔吐、食慾不好

注意事項

- 可能引起睡意，服用後不可駕車



# 降血糖用藥



## • 利糖妥錠 Glutrol (Glipizide) 5毫克

用途  
用法

- 降血糖
- 早飯前、晚飯前各1次

副作用

- **低血糖症狀**：無力、冒冷汗、心跳快、頭昏眼花、臉色蒼白、意識混亂、噁心、食慾不好

注意事項

- 可能低血糖症狀，血糖須密切監測



# 降血糖用藥



## • 美獲平錠Metfopin F.C 850毫克

用途  
用法

- 降血糖
- 早飯後、晚飯後各1次

副作用

- 肚子痛、脹氣、噁心、疲倦、頭痛、頭昏眼花

注意事項

- 可能引起**乳酸中毒**，80歲以上不建議使用



# 降血壓用藥



## • 脈優錠Norvasc (Amlodipine)5毫克

### 用途 用法

- 降血壓、心絞痛
- 一天一次

### 副作用

- 姿勢性低血壓、頭痛暈眩、水腫、疲倦、噁心、臉潮紅

### 注意事項

- 可能造成頭暈、目眩，病人在站立或走路時應小心扶持



# 心血管用藥



## • 美特朗錠Mikelan (Carteolol)5毫克

### 用途 用法

- 降血壓、狹心症
- 一天二~三次

### 副作用

- 姿勢性低血壓、頭痛暈眩、心跳過慢、失神、疲倦無力、噁心、肚子不舒服

### 注意事項

- 可能造成頭暈、目眩，病人在站立或走路時應小心扶持



# 泌尿道用藥



## • 優那持續釋放膜衣錠Urnal 0.2毫克

### 用途 用法

- 前列腺肥大症、尿失禁
- 一天一次，睡前

### 副作用

- 眩暈、低血壓、腸胃不適、頭痛

### 注意事項

- 可能造成頭暈、低血壓，病人在站立或走路時應小心扶持





# 緩瀉劑



## • 樂瑪可顆粒劑 Normacol 7克/包

### 用途 用法

- 治療便秘
- 一天1~2包，飯後

### 副作用

- 腹脹、脹氣、**腹瀉**、噁心、腹痛

### 注意事項

- 勿於睡前服用或服用完立即躺下
- 因增加上廁所頻率而**易跌倒**