

臺南市政府登革熱疫情緊急室內（壓罐式噴藥）通知單

最近您居住之社區內有登革熱疫情發生，為消滅帶病毒之成蟲，需執行室內緊急壓罐式噴藥工作，以避免他人再受感染，將於 年 月 日 午 時至 時，進行貴住戶居家室內外壓罐式噴藥工作，為使防疫工作執行徹底，敬請配合並注意下列事項：

壓罐式噴藥前注意事項

- 一、壓罐式噴藥所使用之藥劑係經環保署審核合格之環境衛生用藥，為合成除蟲菊精化合物，使用之劑量只足以殺死蚊蟲，對人體毒性極低，對昆蟲及魚類毒性較高，但對家庭常見蟲害例如：蚊子、蒼蠅、蟑螂、跳蚤、塵蟎等均有奇效。
- 二、壓罐式噴藥方式為空間噴灑，噴藥範圍為室內，含各層樓、所有房間及地下室。
- 三、住戶在壓罐式噴藥前，請先關閉門窗，並收拾食物及餐具，如有養魚，水族箱要暫時關閉打氣機並密蓋。寵物請務必帶離開，其餘物品可用報紙或塑膠袋大略掩蓋，不要過度包覆，以避免成蚊躲避在內，降低噴藥效果。
- 四、如有要事或工作，需於該段時間外出，請將鑰匙交付可信賴之鄰居或里(鄰)長。若屆時無人在家，我們將依傳染病防治法第三十八條，會同派出所員警，由鎖匠開鎖進入壓罐式噴藥。
- 五、若貴住戶拒絕壓罐式噴藥，不僅會讓病媒蚊往沒噴藥的區域竄逃，增加您及家人被叮咬的危險性，衛生單位也將依傳染病防治法第三十八條及六十七條規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，為保障您及家人的健康，請您配合防疫工作，並避免受罰。
- 六、家中如有無法行動者，請與執行單位聯絡，事先安排119協助暫時安置。

壓罐式噴藥後注意事項

- 一、壓罐式噴藥後暴露在外的會接觸到嘴巴的餐具及用具等，在使用前應清洗乾淨，直接接觸到殺蟲劑的食物應丟棄，不可食用。
- 二、壓罐式噴藥後務必將門窗繼續關閉60分鐘，以殺死所有成蟲。再戴口罩進入，將門窗、電風扇打開，以利殺蟲劑排出，至少30分鐘充分通風後才可進入。
- 三、本藥劑會自行揮發，亦可消滅家中塵蹣，較常接觸或使用的物品，使用溼布擦拭即可；不擦拭，亦可有短暫殘存效果，避免蚊蟲進入家中。
- 四、請注意地板是否溼滑，務必小心行走，避免滑倒受傷。
- 五、依傳染病防治法第38條，貴公司行號、機關應給予公假，如需請假證明，請於壓罐式噴藥當日洽詢執行同仁。

再次提醒您！！

- 一、壓罐式噴藥工作只能治標，加上蚊子的卵在乾燥的環境下可存活一年之久，若要徹底消滅登革熱疫情，請您務必至少每週清除或刷洗1次積水容器，病媒蚊幼蟲易孳生在如花瓶、水缸、花盆底盤、冰箱底盤、飲水機底盤、廢棄輪胎、瓶瓶罐罐等積水容器，如有久未使用之馬桶，請關閉其水源，蓋上馬桶蓋。
- 二、若您或家人在此段時間內有發燒、頭痛、出疹、肌肉酸痛或關節痛等症狀，請立刻就醫或主動至轄區衛生所採血檢驗，以利衛生單位即時展開有效防治措施。在檢驗結果尚未確認前，也請您儘量待在家裏休息，穿著長袖長褲，睡覺時掛蚊帳以避免蚊蟲叮咬，防止疫情擴散。

~~壓罐式噴藥期間也許會帶給您諸多不便，但為維護市民健康，仍請您全力配合~~

_____區公所
聯絡電話：日
 夜

壓罐式噴藥後，倘若社區發生登革熱群聚，請配合社區區塊戶內外化學防治噴藥。

臺南市政府

關心您的健康



積水容器 完全清除
社區動員 刻不容緩