

認識登革熱



登革熱的症狀


登革熱 臨床症狀



通報定義：突發發燒 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 並伴隨下列任二(含)項以上症狀：

- 頭痛/後眼窩痛/肌肉痛/關節痛/骨頭痛
- 出疹
- 白血球減少
- 噁心/嘔吐
- 血壓帶試驗陽性
- 任一警示徵象：
 - 腹部疼痛及壓痛
 - 持續性嘔吐
 - 臨床上體液蓄積（腹水、胸水…）
 - 黏膜出血
 - 嗜睡/躁動不安
 - 肝臟腫大超出肋骨下緣2公分
 - 血比容增加伴隨血小板急速下降

感染途徑



台灣傳播登革熱的病媒蚊（成蟲期）

埃及斑蚊




白線斑蚊



登革熱病媒蚊生活史



卵




孵化

(約3-4天)




幼蟲

(約5-8天)



蛹

(約1-3天)



羽化




雌蚊具絲狀觸角



雄蚊具羽毛狀觸角




噴藥治標不治本



落實巡倒清刷才是解決之道

巡

經常巡檢，
避免戶內外積水。



倒

清除積水，
必要的容器倒置。



清

容器減量，
清除不要的器物。



刷

刷洗容器，
避免蟲卵再附著。

