守護健康
ការពារសុខភាព

衛生福利部 國民健康署
ទីស្នាក់ការសុខាភិបាល
បុរជាពលរដ្ឋ
នក្រៃសួងសុខាភិបាលនិ
ងរបបឧបត្ថម្ភក

衛生福利部國民健康署 編印
បោះពុម្ពដោយ ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពបុរជាពលរដ្ឋ
臺北市大同區塔城街36號
ផ្ទះលេខ 36 ផ្លូវ TA CHENG មណ្ឌល TA TONG ទីក្រុង TAIPEI
電話/ទូរស័ព្ទលេខ(02) 2522-0888 傳真/ទូរលេខ(02)2522-0629
孕產婦關懷專線：0800-870870
ខុសថ្លៃស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់សុរដីមានគក៏ះ 0800-870870
出版年：2017年 បោះពុម្ពឆ្នាំ 2017

孕婦健康手冊 【中柬版／ភាសាចិន】 衛生福利部國民健康署 編印

孕婦健康手冊 【中柬版】 【ភាសាចិន】

សៀវភៅសុខភាពអ្នកមានផ្ទៃពោះ

準媽媽姓名／ឈ្មោះម្តាយ:

產檢時請記得攜帶孕婦健康手冊
សូមនាំយកសៀវភៅសុខភាពអ្នកមានផ្ទៃពោះមកជាមួយនៅពេលត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ

衛生福利部國民健康署 編印
បោះពុម្ពដោយ
ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពបុរជាពលរដ្ឋ
本印製經費由國民健康署菸品健康福利捐支應
បិច្ចាគថវិកាបោះពុម្ពដោយមន្ទីរសុខភាពនិងសុខុមាលភាពថ្នាំជក់នទើសុនាក់ការសុខាភិបាលជាតិ

我幸福.因為愛

ខ្ញុំមានសុភមង្គល,ពីព្រោះសេចក្តីស្រលាញ់

給寶寶最貼心的禮物　哺餵母乳

衛生福利部國民健康署 提醒您

「公共場所母乳哺育條例」明定婦女於公共場所母乳哺育時，
任何人不得禁止、驅離或妨礙，違者處六千元以上三萬元以下罰鍰。

母乳哺育相關資訊請參閱170-182頁

「母乳哺育網站」http://www.hpa.gov.tw/breastfeeding/

免付費諮詢專線: 0800-870870

អំណោយដ៏ល្អសំរាប់កូនបំបៅទឹកដោះម្តាយ

ក្រសួងសុខភិបាលជាតិ នាយកដ្ឋានសុខមាលភាពនិងសុខភិបាលដាស់តឿនអ្នក

(ច្បាប់បំបៅដោះម្តាយនៅទីសាធារណៈ)កំណត់ថាស្ត្រីបំបៅនៅទីសាធារណៈ មិនថាអ្នកណាទេក៏មិនអាចហាមឃាត់បណ្តេញឬរំខាន អ្នកមិនគោរពតាមនឹងត្រូវពិន័យទឹកប្រាក់ចំនួន៦ពាន់ដល់៣ម៉ឺន។

ពត៌(គំ)មានទាក់ទងនឹងការបំបៅដោះសូមអានទំព័រ១៧១-១៨៣

(អ៊ីនធឺណេតអំពីបំបៅដោះម្តាយ)http://www.hpa.gov.tw/breastfeeding/

បណ្តាញទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ: 0800-870870

孕婦健康手冊

សៀវភៅសុខភាពអ្នកមានផ្ទៃពោះ

衛生福利部國民健康署

ក្រសួងសុខភិបាលជាតិ នាយកដ្ឋានសុខមាលភាពនិងសុខភិបាល

出版機關：衛生福利部國民健康署

អង្គការបោះពុម្ពផ្សាយ៖ ក្រសួងសុខភិបាលជាតិ
នាយកដ្ឋានសុខមាលភាពនិងសុខភិបាល

出版年月：2017 年 07 月

ខែឆ្នាំបោះពុម្ព 2017.07

孕婦健康手冊 【中柬版】

【ភាសាខ្មែរ】សៀវភៅសុខភាពអ្នកមានផ្ទៃពោះ

衛生福利部國民健康署 編印
ចោះពុម្ពដោយ ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ
本印製經費由國民健康署菸品健康福利捐支應
បរិច្ចាគថវិកាចោះពុម្ពដោយមន្ទីរសុខភាពនិងសុខុមាលភាពថ្នាំជក់នៃទីស្នាក់ការសុខាភិបាលជាតិ

給準媽媽的話

親愛的準媽媽孕產過程順利的關鍵，除了醫護人員的醫療照護外，更重要的是準媽媽妥善的自我照護。

我們特地為您設計了 - 孕婦健康手冊，配合產檢時程，提供健康紀錄表，協助您關心及記錄自己的健康狀況，並讓醫師/助產師替您做最好的照護及叮嚀。另外，一些您在孕期必須知道的保健訊息，希望您能仔細閱讀，有疑問也可以請教醫師/助產師，讓懷孕更輕鬆愉快噢！

如有拾獲本手冊，請聯絡持有人（電話：　　），或者交至鄰近衛生局（所）或持有人產檢院所，協助返還。

សំដីទៅកាន់អ្នកមានផ្ទៃពោះ

ម្ដាយជាទីស្រលាញ់គ្រប់រូបគន្លឹះនៃការសម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាពរួមមានការមើលថែទាំពីសំណាក់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងការថែទាំសុខភាពដោយខ្លួនឯងរបស់ម្ដាយដែលវាជាគន្លឹះសំខាន់ជាងគេ។

យើងខ្ញុំបានរៀបរៀងជាពិសេសន្ធរសៀវភៅសុខភាពមាតាដែលផ្ដល់នូវតារាងកំណត់ត្រាសុខភាពសុរបទៅតាមពេលវេលានៃការពិនិត្យគភិដីម្បីជួយអ្នកក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់និងកត់ត្រាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងជួយឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតនិងឆ្មបផ្ដល់នូវការមើលថែទាំនិងដំបូន្មានដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។ក្រៅពីនេះចំពោះពត៌មានសុដីអំពីសុខភាពក្នុងកំឡុងពេលមានគភិសូមអ្នកអានឲ្យបានលំអិតបុរសនិងបីមានចម្ងល់អាចសួរទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតនិងឆ្មបដើម្បីឲ្យការមានគភិបុរកបទៅដោយភាពធូរស្រាលនិងភាពសប្បាយរីករាយ!

បុរសនិងបីរីសហានសៀវភៅនេះ,សូមទំនាក់ទំនងមុចាស់សៀវភៅ(ទូរស័ព្ទ),ឬនាំយកទៅកាន់មន្ទីសុខាភិបាលនៅកុបរែនាៈឬយកទៅកាន់មន្ទីពេទ្យរបស់មុចាស់សៀវភៅនេះដើម្បីជួយកុនុងការសងទៅវិញ។

給準爸爸的話

人類的懷孕期長達9個多月之久，讓準爸媽有足夠的時間、機會去學習、調適、計畫及準備如何為人父母。準爸媽若能在孕期有效尋求協助、聽取別人經驗或是搜尋閱讀相關資料，經過綜合整理，仔細深刻的針對自己理想的生產方式及為人父母的技巧，妥善評估與準備，為迎接新生命做好更圓融的決策與安排，將會有更令自己滿意的經驗。

從懷胎開始，準媽媽的身心就逐漸開始產生變化，且隨著孕期週數的增加，其身心的負擔也隨之增長。因此，這時候非常需要準爸爸及家人的關懷與照顧。建議準爸爸及家人透過關懷及實際行動（如：傾聽，分享準媽媽的快樂與憂慮、陪準媽媽去醫院做產檢、一同參加產前教育課程及產前運動…）除了可以支持準媽媽孕期的辛苦外，亦可了解胎兒的生長發育情況、促進夫妻感情及建立親子關係的良好基礎。

同時，準爸爸及家人在決定哺餵嬰兒的方式上佔有很重要的地位，準爸爸在產前學習：(1)正確的哺乳知識，(2)參與哺餵母乳的技巧，(3)各種母乳問題處理的技巧，(4)照顧嬰兒的技巧等，將有助於參與產後媽媽的哺乳與嬰兒照顧，有利於延長持續哺乳時間及勝任照顧嬰兒。

在懷孕後期至準備生產期間，建議準爸爸及家人一同找好生產的場所；認識生產預兆、了解生產過程、學習如何協助減緩因為懷孕帶給準媽媽的不適；與醫師、準媽媽討論及決定生產方式。另外，可以多分擔準媽媽的家事、參與照顧家中其他小孩，讓準媽媽能充分的休息。建議準爸爸陪伴準媽媽散步，作產前運動；若懷孕後期因身體不適、情緒不穩定、或因擔心身材變形而不開心時，應協助解除不適並多予支持。

ជំរូន្មានសម្រាប់ឪពុក

ជំពូកមនុស្សមានគភ៌រយៈពេល៩ខែដែលផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ម្ដាយឪពុកក្នុងការសិក្សាសម្របខ្លួនផែនការនិងត្រៀមលក្ខណៈក្លាយខ្លួនទៅជាមាតាបិតា។ក្នុងកំឡុងពេលមានគភ៌ម្ដាយឪពុកអាចសុំជំនួយនិងទទួលយកបទពិសោធន៍ពីអ្នកដទៃឬស្រាវជ្រាវឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនានាបន្ទាប់មកផែនការបូកសរុបរៀបចំផែនការជ្រើសរើសពិធីសម្រាលនិងរបៀបផែនជាម្ដាយឪពុកដែលខ្លួនចង់បានផែនការវាយតម្លៃនិងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវផែនការរៀបចំនិងសម្របចេយុទ្ធសាស្ត្រដឲ្យកាន់តែល្អិតនិងរស់រវីកដើម្បីត្រៀមទទួលការមកដល់នជីវិតថ្មី។ទាំងនេះ នឹងផ្ដល់នូវបទពិសោធដ៏គួរឲ្យពេញចិត្តទៅដល់អ្នក។

ចាប់ផ្ដើមពីការពរពោះ ចិត្តកាយរបស់ម្ដាយចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរម្យ៉ាងទៀតសម្ពាធផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងផ្នែករាងកាយនឹងកើនឡើងជាលំដាប់ស្របទៅតាមកំណើនឡើងនអោយគភ៌។ហេតុដូចនេះដំណាក់កាលនេះត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់និងការមើលថែទាំងពីសំណាក់ឪពុកនិងសមាជិកគ្រួសារ។យើងណានៅំឲ្យឪពុកនិងសមាជិកគ្រួសារយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើម្ដាយតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែង (ឧទាហរណ៍៖ស្ដាប់និងចរែករំលែកភាពសប្បាយរីករាយនិងទុក្ខសោករបស់ម្ដាយកំដរម្ដាយទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅមន្ទីរពេទ្យចូលរួមការអប់រំនិងលំហាត់ប្រាណមុនពេលសម្រាលជាមួយម្ដាយ...) ក្រៅពីជួយគាំទ្រដល់ការលំហាករបស់ម្ដាយក្នុងពេលមានគភ៌ អាចស្វែងយល់ពីស្ថានភាពលូតលាស់របស់គភ៌ បង្កើនមនោសញ្ចេតនារវាងប្ដីប្រពន្ធនិងជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងមាតាបិតានិងបុត្រធីតា។

ទន្ទឹមគ្នានឹងនេះឪពុកនិងសមាជិកគ្រួសារមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសរបៀបបំបៅកូន។ការសិក្សារបស់ឪពុកមុនពេលសម្រាល៖ ១. ចំណេះដឹងក្នុងការបំបៅដោះត្រឹមត្រូវ ២. របៀបចូលរួមក្នុងការបំបោះដោះម្ដាយ៣. វិធីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទដែលកើតមានក្នុងការបំបៅដោះ ៤. វិធីមើលថែទាំទារក។ល។វានឹងមានប្រយោជន៍ដល់ការចូលរួមបំបៅនិងមើលថែទារកក្រោយពេលសម្រាលជួយពន្យារយៈពេលបំបៅនិងអាចមើលថែទាំទារកបាន។

ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនិងដំណាក់កាលត្រៀមសម្រាលយើងណានៅំឲ្យឪពុកនិងសមាជិកគ្រួសាររួមគ្នាស្វែងរកកន្លែងសម្រាលឲ្យបានស្របច្បាស់គាល់ពីសញ្ញាមុនពេលសម្រាលស្វែងយល់ដំណាក់កាលនៃការសម្រាលសិក្សាពីវិធីជួយកាត់បន្ថយភាពមិនសមរបស់ម្ដាយដែលបណ្ដាលមកពីការមានគភ៌ពិភាក្សានិងជ្រើសរើសរបៀបសម្រាលជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតនិងម្ដាយ។ក្រៅពីនេះអាចជួយសម្រាលបន្ទុកការងារផ្ទះរបស់ម្ដាយឲ្យបានច្រើនចូលរួមមើលថែទាំកូនដទៃទៀតក្នុងគ្រួសារដើម្បីឲ្យម្ដាយសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់។យើងណានៅំឲ្យបិតាកំដរមាតាដើរលំហែរលំហាត់ប្រាណមុនពេលសម្រាល។ប្រសិនបើក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនការមានគភ៌បណ្ដាលឲ្យមាតាមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែមិនស្រួលខ្លួនអារម្មណ៍មិននឹងនប្រដោយសារព្រួយបារម្ភខូចរាងគំប្បីគួរជួយមាតាបំបាត់ភាពមិនស្រួលព្រមទាំងផ្ដល់ការគាំទ្រឲ្យបានច្រើន។

對準爸媽而言，生產過程是充滿未知、不安、既期待又害怕的情緒，準爸媽在產前一起參加生產教育是個減輕對生產害怕的好方法，準爸爸可以成為良好的持續陪伴支持者，準爸爸也需要參與生產教育課程，以免到生產時候的慌亂，形成緊張與害怕，也對協助準媽媽因應生產的不適無法有所幫助。生產教育，可協助準爸媽討論對懷孕和生產有關的問題，如：學習非藥物減痛及因應生產疼的技巧，獲得支持、資訊及有關生產害怕的心理教育，降低對生產害怕的程度，增加準媽媽對疼痛的忍受力，進而彼此有一個滿意的生產結果及經驗。

準媽媽生產時的疼痛和不舒服是無法言喻的，孤軍奮鬥的無助感更令準媽媽焦慮，正向的生產經驗是增強日後照顧新生兒及育兒自信心的來源之一，所謂的「為母則強」，其中絕對需要準爸爸來共同參與，況且生產時有了準爸爸的陪伴，更能讓準媽媽有「被愛」、「正向能量」的感受。準爸爸雖然在生產當下不是直接面臨生產的痛苦，但是在未來仍是要扮演為人父的責任；在生產時一同奮鬥的滿足感與參與感，能讓準爸爸開始覺察自己成為父親的角色與該盡的責任，這樣的心理調適與角色轉換對於婚姻與家庭的關係都有正向的幫助。

到了進入待產階段，準爸爸扮演一個適任的陪產者，能幫助準媽媽面對待產、生產的過程，準爸爸執行及引導準媽媽身體放鬆、給予按摩、熱敷與冷敷、身體清潔、改變姿勢（例如：站立、走動、採直立坐姿、側臥、跪姿、蹲姿等）、提供飲料與餐點，協助準媽媽每兩小時上廁所排尿。準媽媽在待產中有時會有焦慮的行為表現，十分的不安及害怕，例如：失控或哭叫等，此時，準爸爸的辨識、支持及言語的鼓勵非常重要。到了第二產程時，陪伴準媽媽正確的用力及給予加油打氣。之後的迎接新生兒進行早期的肌膚接觸及哺餵嬰兒母乳，都會對整個家庭帶來正面的影響。同時，準爸爸也要知道如何照顧自己休息及進食等。

ចំពោះមាតាបិតាការសម្រាលកូនពោពេញទៅដោយភាពមិនអាចដឹងមុនអន្ទះសារភ័យខ្លាចនិងការរង់ចាំហេតុនេះការចូលរួមក្នុងការអប់រំមុនពេលសម្រាលគឺជាវិធីដ៏ល្អក្នុងការកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចក្នុងការសម្រាល។បិតាអាចក្លាយទៅជាអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកកំដរដ៏ល្អហើយក៏ត្រូវចូលរួមក្នុងការអប់រំមុនពេលសម្រាលដើម្បីជៀងវាងការភ័យខ្លាចនិងច្របូកច្របល់ដែលកើតមានឡើងក្នុងពេលសម្រាល។ការអប់រំស្ដីពីការសម្រាលអាចជួយឲ្យមាតាបិតាពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងការសម្រាលកូនដូចជាៈរៀនពីវិធីបំបាត់ការឈឺចាប់ដោយមិនប្រើថ្នាំនិងវិធីទប់ស្កាត់ការឈឺចាប់ពេលសម្រាលទទួលយកការអប់រំផ្នែកផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រព័ត៌មាននិងការភ័យខ្លាចក្នុងការសម្រាលកាត់បន្ថយកម្រិតនៃភាពភ័យខ្លាចដែលមានចំពោះការសម្រាលបង្កើនការស៊ូទ្រាំចំពោះការឈឺចាប់របស់មាតាឈានទៅដល់ការទទួលបានលទ្ធផលនៃការសម្រាលនិងបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនពេញចិត្ត។

ការឈឺចាប់របស់មាតាក្នុងពេលសម្រាលគ្មានអ្វីអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយ។ភាពឯកាដែលបានមកពីការតស៊ូតែម្នាក់ឯងកាន់តែនាំឲ្យមាតាកាន់តែព្រួយបារម្ភ។បទពិសោធន៍វិជ្ជមានក្នុងការសម្រាលគឺជាប្រភពនៃជំនឿចិត្តមួយក្នុងការមើលថែទាំនិងអប់រំកូននៅថ្ងៃក្រោយដោយក្នុងនោះត្រូវការចាំបាច់នូវការចូលរួមរបស់ឪពុកព្រោះការកំដររបស់ឪពុកក្នុងការសម្រាលជួយឲ្យម្ដាយទទួលបានអារម្មណ៍ “ត្រូវបានស្រលាញ់” និង “ថាមពលវិជ្ជមាន”។ថ្វីត្បិតតែឪពុកមិនបានទទួលរងការឈឺចាប់ដោយផ្ទាល់ក្នុងការសម្រាលប៉ុន្ដែនៅថ្ងៃក្រោយត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវកតបក្នុងការដើរតួជាឪពុក។ការចូលរួមនិងការពេញចិត្តក្នុងពេលតស៊ូជាមួយគ្នាក្នុងការសម្រាលជួយឲ្យឪពុកចាប់ផ្ដើមដឹងថាខ្លួនបានក្លាយទៅជាឪពុកនិងដឹងពីទំនួលខុសត្រូវដែលត្រូវបំពេញ។ការសម្របផ្លូវចិត្តនិងការផ្លាស់ប្ដូរតួអង្គនេះមានផលវិជ្ជមានចំពោះជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងទំនាក់ទំនងគ្រួសារ។

ចូលដល់ដំណាក់កាលត្រៀមសម្រាលឪពុកដើរតួជាអ្នកកំដរសម្រាលដ៏សក្ដិសមម្នាក់ដែលអាចជួយម្ដាយប្រឈមមុខនឹងការត្រៀមសម្រាលនិងការសម្រាល។ឪពុកអនុវត្តន៍និងណែនាំម្ដាយឲ្យបន្ធូរអារម្មណ៍ផ្ទឹសសស្ដៃអំទឹកក្ដៅនិងស្អំទឹកត្រជាក់សម្អាតរាងកាយកែប្រែឥរិយាបថ (ដូចជាៈឈរដើរអង្គុយត្រង់ដេកផ្អៀងលុតជង្គង់អង្គុយចាងហាង។ល។) ផ្ដល់ចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈនិងជួយដល់ម្ដាយចូលបង្គន់បញ្ចេញចោលទឹកនោមរៀងរាល់២ម៉ោងម្ដង។ក្នុងដំណាក់កាលត្រៀមសម្រាលម្ដាយអាចសម្ដែងចេញនូវការព្រួយបារម្ភអន្ទះសារនិងភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍ៈបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឬយំជាដើម។នៅពេលនេះការវិនិច្ឆ័យការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់ឪពុកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ដល់ដំណាក់កាលសម្រាលទី២កំដរម្ដាយឲ្យប្រើកម្លាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្ត។ក្រោយពីទទួលជីវិតថ្មីការប៉ះទង្គិចស្បែកនិងការបំបៅទឹកដោះម្ដាយទៅដល់ទារកដំណាក់កាលបឋមនឹងផ្ដល់នូវឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅដល់គ្រួសារទាំងមូល។ទន្ទឹមគ្នានឹងនេះឪពុកក៏ត្រូវដឹងពីរបៀបមើលថែទាំខ្លួនឯងក្នុងការសម្រាកនិងទទួលទានចំណីអាហារផងដែរ។

準爸爸有了充分的準備後，能減輕新手爸爸的壓力與不安，同時在媽媽產後哺乳時能具有協助參與哺乳的能力，更透過主動積極的參與及支持，提升媽媽對哺餵母乳的滿意及自信能力，延長純母乳哺餵的時間。爸爸能參與嬰兒的照顧，較易與嬰兒建立依附關係，透過彼此互動經驗對爸爸而言是一種愉快經驗，為人爸爸的成就，同時也能更加肯定自己父職角色的功能。

在產後，爸爸可以主動觀察哺乳時機、哺乳前幫忙按摩媽媽背部使其放鬆增加乳汁的分泌、主動協助調整媽媽哺乳姿勢、觀察嬰兒是否正確含乳吸吮、給予媽媽鼓勵與讚美、處理媽媽因奶脹不適的問題、協調長輩對哺餵方式的干預，分擔做家事。當嬰兒莫名啼哭時可以主動了解啼哭原因及安撫嬰兒、更換尿布等。同時，也應該照顧嬰兒及大小孩，讓媽媽有休息的時間。媽媽哺乳及照顧嬰兒時，因有爸爸的支持與參與，使其在母職上能感受到滿足與幸福感。

懷孕生產是一件正常的生命轉變事件，準爸媽共同參與、有心理準備及確實執行，可增進夫妻彼此親密關係及親子關係。

ក្រាយពលេឪពុកធ្វើការត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធនិងភាពអនុទ្រះសារបស់ឪពុកថ្មីថ្មាងទន្ទឹមគ្នានឹងនេះវាក៏ហានផ្តល់នូវលទ្ធភាពក្នុងការជួយបំបៅដោះម្តាយទៅដល់កូនហើយតាមរយៈការគាំទ្រនិងការចូលរួមដ៏សកម្មអាចជួយបង្កើនការពញ្ចេចិត្តគនិងជំនឿចិត្តរបស់ម្តាយទៅលើការបំបៅទឹកដោះដល់កូនពន្យាពលេនការបំបៅទឹកដោះម្តាយសុទ្ធ។ឪពុកដលៃអាចចូលរួមក្នុងការមើលថែទាំទារកតងៃងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតភាពអាស្រ័យគ្នាជាមួយទារក។តាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នានេះផ្តល់នូវបទពិសាធដ៏រីករាយមួយនិងផ្តល់នូវភាពជាគជ័យក្នុងការធ្វើជាឪពុកទៅដល់ឪពុកហើយវាក៏កាន់ធ្វើឲ្យឪពុកស្គាល់កាន់តច្បាស់ពីមុខងារជាឪពុករបស់ខ្លួន។

ក្រាយពលេសម្រាលឪពុកអាចធ្វើការសង្កតេមើលពលេបំបៅទឹកដោះដាយខ្លួនឯងមុនពលេបំបៅដោះជួយធ្វើសរសខ្មែនងរបស់ម្តាយដើម្បីជម្រុញការបញ្ចេញទឹកដោះកាន់តច្រើនជួយផ្តលាស់ប្តូរតរិយាបថបំបៅដោះរបស់ម្តាយសង្កតេមើលទារកថាតើបៅនិងលេបទឹកដោះតុមែតត្រូវដរៃឬទផ្តេដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងកាតសរសើរដល់ម្តាយដោះសារាយបញ្ចហាផ្សងេៗដលៃបណ្តាលមកពីការឡើងដោះរបស់ម្តាយសម្ពរបសម្ពរួលការជ្រៀតជ្រែករបស់អ្នកថាស់ទុំចំពោះរបៀបបំបៅដោះនិងចូលរួមចកៃរំលកៃកិច្ចការងារផ្ទះ។ពលេទារកយំដាយមិនដឹងមូលហតេតុត្រូវធ្វើការសុរងៃយល់ពីមូលហតេុនកៃារយំនិងលួងលាមទារកឬផ្តលាស់ប្តូរកន្ទបទឹកនាមជាដើម។ទន្ទឹមគ្នានឹងនេះគប្បីមើលថទៃាទារកនិងកូនធំៗដទដៃើម្បីឲ្យម្តាយមានពលេវលោសម្រាក។ការគាំទ្រនិងការចូលរួមរបស់ឪពុកក្នុងពលេម្តាយបំបៅទឹកដោះនិងមើលថទៃាទារកគឺជាការជួយជម្រុញឲ្យម្តាយទទួលហាននូវការពញ្ចេចិត្តនិងសុភមង្គល។

ការមានគភិសម្រាលបុត្រគឺជារឿងធម្មតានបៃរបៃំរួលជីវិតម្តាយឪពុកចូលរួមជាមួយគ្នាតុរៀមលក្ខណៈផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្រាន់និងអនុវត្តដជាក់ស្តដៃងអាចជួយបង្កើនភាពស្និតស្នាលរវាងស្វាមីភរិយានិងរវាងបុត្រធីតា។

懷孕的五要五不

五要

◎ 要按時產前檢查 p. 14
◎ 要做好孕期保健 p. 122
◎ 要辨識危險妊娠 p. 214
◎ 要認識早產徵兆 p. 120
◎ 要知道產兆來臨 p. 194

五不要

◎ 不抽菸與喝酒 p. 112
◎ 不吸入二手菸 p. 112
◎ 不亂服用藥物 p. 114
◎ 不選時刻剖腹產 p. 192
◎ 不使用毒品 p. 116

ប្រការ៥យ៉ាងគួរនិងប្រការ៥យ៉ាងមិនគួរធ្វើនៅពេលមានផ្ទៃពោះ

ប្រការ៥យ៉ាងគួរ



- គួរពិនិត្យផ្ទៃពោះតាមពេលកំណត់មុនពេលប្រសូត៦ p.15
- គួរថែទាំសុខភាពនៅពេលមានផ្ទៃពោះ៤៦ p.123
- គួរយល់ដឹងពីគ្រុនថ្នាក់ពីការប្រសូត៥៥ p.215
- គួរយល់ដឹងពីអាការៈប្រសូតមុនខែ៤៥ p.121
- គួរដឹងពីរលោប្រសូតជិតមកដល់ហើយ៧៩ p.195

ប្រការ៥យ៉ាងមិនគួរ

- មិនគួរជក់ហារីឬជឹកសុរា៤១ p.113
- មិនជក់ហារី៤១ p.113
- មិនទទួលទានថ្នាំផ្តសេផ្តាស់៤២ p.115
- មិនជ្រីសរីសរលោប្រសូតកូនដាយវះកាត់៧៧ p.193
- មិនចាក់ថ្នាំញៀន p.117

目錄

健康記事篇

孕婦產前檢查之給付時程及服務項目....14
產前檢查紀錄表....16
我的過去孕產史....18
產檢紀錄總表....20
產科超音波檢查紀錄....24
十次產前檢查紀錄....26
其他產檢紀錄....78
生產紀錄....80
戒菸轉介同意書....82
轉介單....84

準媽媽檢查篇

贏在起跑點....86
遠離先天性遺傳疾病....88
孕婦海洋性貧血篩檢流程....90
常規檢查....92
常見的非常規檢查....98
產檢超音波篩檢說明....100
胎兒超音波檢查說明....102
孕婦免費愛滋病毒篩檢服務....106
產前遺傳診斷與補助....108
趕走對胎兒的不良影響....112
女孩男孩一樣好，生來通通都是寶...118
讓寶寶安全的成長....120

準媽媽生活篇

準媽媽生活DIY....122
當個舒適自在的準媽媽....126
吃出健康(葉酸、碘、鐵)....132
準媽媽的健康注意事項....138
亮黃燈!注意危險徵兆....144
認識產後憂鬱症....146
準媽媽健康操....154
婦女健康的守門員-子宮頸抹片檢查....158

迎接誕生篇

新生兒篩檢....160
寶寶健康的第一道防線....162
預防嬰幼兒感染百日咳....164
新生兒之卡介苗接種注意事項....166
最貼心的哺育方式....170
迎接寶寶的準備 184
寶寶的誕生....188
生產徵兆....194
生產陣痛....196
給準爸爸的話....198
產後健康管理....200
避孕方法簡介....202

資源篇

母嬰親善醫療院所....204
社區心理衛生中心....212
高危險妊娠....214
保母托育....220
立案產後護理之家....222
疑似家庭暴力情事之處理....224
相關資源訊息....226
聯絡地址及電話....228
育兒津貼、國民年金保險生育給付、農民健康保險生育給付....232
勞工保險生育給付、就業保險育嬰留職停薪津貼....234
守護女孩，讓每個寶寶平安出生，長大....236
孕婦B型肝炎追蹤檢查紀錄表....238
孕婦免費愛滋病毒篩檢服務卡....240

មាតិកា



ជំពូកកត់ត្រាសុខភាព

តំលៃ,វ៉ាលេនិងបុរីការសង្កេតមុមអ្នកមានផ្ទៃពោះត្រួតពិនិត្យមុនពេលបុរីសូត.....15
ការកត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពេលបុរីសូត.....17
បុរីវត្ថុតិធ្លាប់មានផ្ទៃពោះឬបុរីសូតរបស់ខ្លួ.....19
តារាងកំណត់ត្រាសរុបនកែារពិនិត្យផ្ទៃពោះ.....21
កំណត់ត្រាការពិនិត្យអ៊ុលត្រាសានផ្ទៃកែសម្ភព.....25

ជំពូកពិនិត្យសុតីមានផ្ទៃពោះ

ឈឺនៈក្នុងចំនុចចាប់ផ្តើមរត់.....87
ឃុលាតឆុងាយពីការឆុលងជំងឺពីកំណើត.....89
ការពិនិត្យជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមតាមលំដាប់.....91
ការពិនិត្យទូទៅ.....93
ការត្រួតពិនិត្យទូទៅ.....99
ការពិនិត្យផ្ទៃពោះការបញ្ជាក់នកែារពិនិត្យអល្ត្រាសាន.....101

ពូកជីវភាពអ្នកមានផ្ទៃពោះ

ការធានាសុខភាពជីវភាពអ្នកមុតាយDIY.....123
ផ្ទៃជាអ្នកមុតាយដលែសុខស្បួល.....127
បរិភាគឲ្យមានសុខភាពលអ(អាសីតហ្វូលិក ជាតិអឺយ៉ូត ជាតិដកែ).....133
បុរីការបុរុងបុរយ៉ែតុនសុខភាពនអែ្នកមុតាយ.....139

ជំពូកទទួលស្វាគមន៍ជីវិតថ្មី

តួរតពិនិត្យទារកថ្មី.....161
ការគាំពារសុខាភាពកូនៗទាំងអស់.....163
ការពារទារកឆុលងជំងឺកុអក់មាន់.....165
បុរីការបុរុងបុរយ៉ែ នុ នកែារចាកថ់ នុាបំ ងកុារជមង្
រីបរេងBCGសមុភាបទ់ ារកទបី កតី.....167
កុបូនដលែមានភាពស្និតស្នាលជាងគនេកែារបំបាដោ:.....171

ជំពូកជំនួយ

មនុទីពទ្យថទែាំមុតាយនិងទារក.....205
មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពចិត្តវិជ្ជានសែហគមុមន៍.....213
សុរុត មីានផទ្ ពោៃះដលែមានគុរ៉ាះថន្ទាក់.....215
ថទែាំដាយមុតាយមដោ:.....221
ផ្ទៈថទែាំកុាយពលេសំាលកូនសុរបចុបាប់.....223
វិធីកុនុងការសង្កេស័យថាមានអំពីហិង្សាកុនុងគ្រួសារ.....225
ធនធានដលែទាក់ទង.....227
ទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋាននិងទូរស័ព្ទ.....229

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យ១០ដងមុនពលេបុរីសូត.....27
កត់ត្រាតួរតពិនិត្យផ្ទៃពោះដទៃ.....79
កត់ត្រាការបុរីសូត.....81
លិខិតយល់ព្រមផ្ទៃរមនុទីពទ្យតមហារី.....83
លិខិតផ្ទៃរទីកនុលងែ.....85

ការពនិ តិ យ្ អល្ត្រិ តរ្ាសានសរ្ ងែរកបកសរ្ាយ.....103
សង្កេពនិ តិ យ្ ជង់ អឺ ដេសដ៍ លស់ រុត្ មីានផទ្ ពោៃះនងិ
ទារកដាយឥតគតិ ថលុ ែ.....107
ការពិនិត្យនិងបំប៉ន់មុនពលេឆុលងជំងឺ.....109
បណ្តុតញេការប៉ះពាល់ទៅដល់ទារក.....113
កូនបុរុសកូនស្រីលែអដួចគ្នា,សុទ្ធតជាសំណប់ចិត្តទាំងអស់.....119
ផ្តល់ការលួតលាស់ដ៏មានសុវត្ថិភាពដល់កូន.....121

ភលុ ងឹ សតុ បុ ព់ណាល៌ឿងអាការៈគ្រួបុរុងបុរ្ យត័ ន្.....145
យល់ដឹងពីជំងឺផ្លូវចិត្តកុាយពលេសំាលកូន.....147
លំហាត់បុរាណសុខភាពសុត្រីទុកមកុលាយជាមុតាយ.....155
ការគាំពារសុខាភាពស្រីត ការពិនិត្យសុបូន.....159

រៀបចំស្វាគមន៍កូន.....185
ការចាប់កំណើតរបស់ទារក.....189
សញ្ញានកែារសមុាល.....195
ឈឺពៈពលេសំាល.....197
សំដីចំពៈឪពុក.....199
ការគ្រប់គ្រងសុខភាពកុាយពលេសំាលកូន.....201
ការបកសុាយអំពីវិធីការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះ:.....203

បុរាក់ឧបត្ថមុភកុនុងការចិញ្ចឹមកូន ការទូទាត់នកែារផ្តុដល់កំណើតនធោនាាប់រងធនលាភបុរជាពលរដ្ឋបុរចាំឆុនាំ និង ការទូទាត់នកែារផ្តុដល់កំណើតនធោនាាប់រងសុខភាពកសិករ.....233
បុរាក់ខមែតុភាពធានាាប់រងការងារហានការធានាាប់រងការងារឈប់សមុាកពីឪពុកមុតាយដាយគ្មានបុរាក់បង់.....235
តវេតាថរែកុសា,ផ្តល់អាយកុមានសុខភាពលអមានសចេកុតីសុខសបុាយ.....237
តារាងកត់ត្រាតួរតពិនិត្យតាមដានសុរ្តីមានផ្ទៃពោះដលែមានជំងឺថ្លើមបុរភេទB.....239
កចិ ចុ ពុមព្រាងនកែារពនិ តិ យ្ រីសុ អដេសដ៍ាយឥតគតិ ថលុ សែមរ្ាបស់ រុដ្ឋ.....241

孕婦產前檢查之給付時程及服務項目

給付時程		建議週數	服務項目
第一次	妊娠第一期 妊娠未滿17週	第12週以前	1. 於妊娠第六週或第一次檢查須包括下列檢查項目： (1) 問診：家庭疾病史、過去疾病史、過去孕產史、本胎不適症狀、成癮習慣查詢。 (2) 身體檢查：體重、身高、血壓、甲狀腺、乳房、骨盆腔檢查、胸部及腹部檢查。 (3) 實驗室檢驗：血液常規(WBC、RBC、Plt、Hct、Hb、MCV)、血型、Rh因子、HBsAg及HBeAg(惟因特殊情況無法於本次檢查者，可於第五次孕婦產前檢查時接受本項檢查)、VDRL(梅毒檢查)、Rubella IgG(德國麻疹抗體)、愛滋病檢查(EIA或PA)及尿液常規。 2. 例行檢查項目。(註二) 註：德國麻疹抗體檢查呈陰性之孕婦，應在產後儘速注射1劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗，該劑疫苗免費。(註五)
第二次		第16週	1. 例行檢查項目。(註二) 2. 早產防治衛教指導
第三次	妊娠第二期 妊娠17週 至未滿29週	第20週	1. 例行檢查項目。(註二) 2. 超音波檢查（因特殊情況無法檢查者，可改於妊娠第三期檢查） 3. 早產防治衛教指導
第四次		第28週	例行檢查項目。(註二)
第五次	妊娠第三期 妊娠29週以上	第32週	1. 例行檢查項目。(註二) 2. 於妊娠32週前後提供：VDRL等實驗室檢驗。
第六次		第34週	例行檢查項目。(註二)
第七次		第36週	1. 例行檢查項目。(註二) 2. 補助孕婦乙型鏈球菌篩檢。(註四)
第八次		第38週	例行檢查項目。(註二)
第九次		第39週	例行檢查項目。(註二)
第十次		第40週	例行檢查項目。(註二)

註一　血液常規檢查包括：白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血小板(Plt)、血球容積比(Hct)、血色素(Hb)、平均紅血球體積(MCV)。

註二　例行檢查項目
(1)問診內容：本胎不適症狀如出血、腹痛、頭痛、癌攣等。
(2)身體檢查：體重、血壓、腹長（宮底高度）、胎心音、胎位、水腫、靜脈曲張。
(3)實驗室檢查：尿蛋白、尿糖。

註三　孕婦產前檢查超過十次及超音波超過一次者，經醫師診斷確為醫療需要，由健保費支應或自費檢查。

註四　孕婦乙型鏈球菌篩檢，於妊娠第35-37週產前檢查時提供1次；若孕婦有早產的現象，得依醫師專業處置，不在此限。

註五　接種地點等相關資訊，請撥打各縣市預防接種專線（請參閱 228 頁）洽詢。

តំលៃវេលានិងប្រការសេវាកម្មអ្នកមានផ្ទៃពោះត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូត

វេលាផ្តល់អោយ		អាយុរាប់នៅទីផ្ទៃមានសប្តាហ៍	ប្រការសេវាកម្ម
លើកទី១	សប្តាហ៍ទី១៦	មុនពេលសប្តាហ៍ទី១២	១. សប្ដាហ៍ទី៦នៃការពរពោះឬការពិនិត្យលើកទី១ចាំបាច់ត្រូវរួមមានការពិនិត្យដូចខាងក្រោម៖ (១) ពិគ្រោះជម្ងឺ៖ប្រវត្តិជម្ងឺតពូជប្រវត្តិជម្ងឺពីអតីតកាលប្រវត្តិសម្រាលកូនពីមុនសញ្ញាណភោគមិនសម្របរបស់ម្ដាយនិងគភ៌និងទម្លាប់ញៀនថ្នាំ។ (២) ការពិនិត្យសុខភាព៖ទម្ងន់កម្ពស់សម្ពាធឈាមក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតសុដន់អាងត្រគាកផ្នែកដីមទ្រូងនិងផ្នែកពោះ។ (៣) មន្ទីរពិសោធន៍ពិនិត្យ៖ពិនិត្យឈាម (WBC, RBC, Plt, Hct, Hb, MCV) ប្រភេទឈាមភ្នាក់ងារRhHBsAg និងHBeAg (បុគ្គលដលៃមិនអាចធ្វើការពិនិត្យផ្នែកនេះក្នុងលើកនេះដោយសារមូលហេតុពិសេសអាចធ្វើការពិនិត្យផ្នែកនេះនៅក្នុងការពិនិត្យលើកទី៥មុនពេលសម្រាល) VDRL (ការពិនិត្យជម្ងឺស្វាយ) Rubella IgG (អង់ទីករជម្ងឺកញ្ជ្រឹល) ជម្ងឺអេដស៍(EIAឬ PA)និងពិនិត្យទឹកនោម។ ២. ការពិនិត្យជាប្រចាំ។ សម្គាល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដលៃមានសញ្ញាអវិជ្ជមានក្នុងការពិនិត្យអង់ទីករជម្ងឺកញ្ជ្រឹលគប្បីចាក់ថ្នាំបង្ការចម្រុះជម្ងឺកញ្ជ្រឹលនិងជម្ងឺក្រឡេទនៃចំនួន១លើកក្រោយពេលសម្រាលកូន។ថ្នាំបង្ការនេះផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។ (សម្គាល់ទី៥)
លើកទី២		សប្តាហ៍ទី១៦	១. ប្រការត្រួតពិនិត្យតាមពេល។(កត់សំគាល់ទី២) ២. ការទូនមានសុខភាពកុំអោយកើតកូនមុនខែ
លើកទី៣	មានផ្ទៃពោះវេលាទី២មានផ្ទៃពោះ១៧សប្តាហ៍ដល់២៩សប្តាហ៍	សប្តាហ៍ទី២០	១. ប្រការត្រួតពិនិត្យតាមពេល។(កត់សំគាល់ទី២) ២. ត្រួតពិនិត្យសំលេងផ្ទៃពោះ(អ្នកដលៃមិនអាចពិនិត្យក្នុងស្ថានភាពពិសេស,អាចពិនិត្យបាននៅតំណាក់កាលផ្ទៃពោះទី៣) ៣. ការទូនមានសុខភាពកុំអោយកើតកូនមុនខែ
លើកទី៤		សប្តាហ៍ទី២៨	ប្រការត្រួតពិនិត្យតាមវេលា។(កត់សំគាល់ទី២)
លើកទី៥	មានផ្ទៃពោះវេលាទី២មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍	១,ប្រការត្រួតពិនិត្យតាមពេល។(កត់សំគាល់ទី២)	១. ប្រការត្រួតពិនិត្យតាមពេល។(កត់សំគាល់ទី២) ២. ក្រោយពេលមានផ្ទៃពោះ៣២សប្តាហ៍ផ្តល់នូវ : ការត្រួតពិនិត្យ VDRL។ល។
លើកទី៦		សប្តាហ៍ទី៣៤	ប្រការត្រួតពិនិត្យតាមពេល។(កត់សំគាល់ទី២)
លើកទី៧		សប្តាហ៍ទី៣៦	១. ប្រការត្រួតពិនិត្យតាមពេល។(កត់សំគាល់ទី២) ២. ពិនិត្យstreptocoប្រភេទខ(កត់សំគាល់ទី៤)
លើកទី៨		សប្តាហ៍ទី៣៨	ប្រការត្រួតពិនិត្យតាមពេល។(កត់សំគាល់ទី២)
លើកទី៩		សប្តាហ៍ទី៣៩	ប្រការត្រួតពិនិត្យតាមពេល។(កត់សំគាល់ទី២)
លើកទី១០		សប្តាហ៍ទី៤០	ប្រការត្រួតពិនិត្យតាមពេល។(កត់សំគាល់ទី២)

កត់សំគាល់ទី១: ប្រការត្រួតពិនិត្យឈាមមានដូចជា:ឈាមស(WBC)ឈាមក្រហម(RBC)ឈាម(Plt)ឈាម(Hct)ឈាម(Hb)ឈាម(MCV)។

កត់សំគាល់ទី២: ប្រការត្រួតពិនិត្យតាមវេលា
(១)អត្ថន័យសួរជំងឺ:មិនស្រួលពោះដូចជាចញ្ចេញឈាម,ឈឺពោះ,ឈឺក្បាល,ស្ពឹក។ល។
(២)ត្រួតពិនិត្យសុខភាព:ទំងន់,សម្ពាធឈាម,កំពស់ស្បូន,សំលេងទារកក្នុងផ្ទៃ,ទីផ្ទៃ,ហើម,ហើមសសៃឈាម។
(៣)ត្រួតពិនិត្យក្នុងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យ:ជំងឺទឹកនោមផ្អែម។

សម្គាល់ទី៣ : ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដលៃមានការត្រួតពិនិត្យមុនសម្រាលកូនលើសពី១០ដងនិងអក្លេលើសពីមួយដង, គ្រូពេទ្យធ្វើតស្រេតហើយបញ្ជាក់ថាត្រូវពេទ្យាបាល ដោយធានារ៉ាប់រងសុខភាពចញ្ចេញប្រាក់ចំណាយឬចញ្ចេញប្រាក់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

កត់សំគាល់ទី៤: ត្រួតពិនិត្យអ្នកមានផ្ទៃពោះមានជំងឺstreptocoប្រភេទខ,ផ្តលជូនមុតងនៅពេលមានផ្ទៃពោះពី៣៥-៣៧សប្ដាហ៍។ប្រសិនបើមានការប្រសូតមុនខែ,ត្រូវធ្វើការព្យាបាលតាមគ្រូពេទ្យ។

សម្គាល់ទី៥ : ពត៌មានទាក់ទងនឹងការទទួលចាក់ថ្នាំបង្ការ សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទចាក់ថ្នាំបង្ការគ្រប់ស្រុកក្រុង (សូមអានទំព័រទី 229)

產前檢查紀錄表

補助時程		建議週數	檢查日期	檢查院所	檢查醫師簽章
第一次	妊娠第一期 妊娠未滿17週	12週以前			
第二次		第16週			
第三次	妊娠第二期 妊娠17週 至未滿29週	第20週			
第四次		第28週			
第五次	妊娠第三期 妊娠29週以上	第32週			
第六次		第34週			
第七次		第36週			
第八次		第38週			
第九次		第39週			
第十次		第40週			

ការកត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូត

វេលាផ្តល់អាយុ		អាយុយាបល់នៅទីប៉ុន្មានសប្តាហ៍	ថ្ងៃពិនិត្យ	មន្ទីពេទ្យត្រួតពិនិត្យ	ហត្ថលេខាគ្រូពេទ្យត្រួតពិនិត្យ
លើកទី១	មានផ្ទៃពោះពេលដំបូង មានផ្ទៃពោះពេលដំបូង មានផ្ទៃពោះមិនទាន់គ្រប់១៧សប្តាហ៍	មុនពេលសប្តាហ៍ទី១២			
លើកទី២		សប្តាហ៍ទី១៦			
លើកទី៣	មានផ្ទៃពោះវេលាទី២មានផ្ទៃពោះ១៧សប្តាហ៍ដល់២៩សប្តាហ៍	សប្តាហ៍ទី២០			
លើកទី៤		សប្តាហ៍ទី២៨			
លើកទី៥	មានផ្ទៃពោះវេលាទី២ មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍ពី២៩សប្តាហ៍	សប្តាហ៍ទី៣២			
លើកទី៦		សប្តាហ៍ទី៣៤			
លើកទី៧		សប្តាហ៍ទី៣៦			
លើកទី៨		សប្តាហ៍ទី៣៨			
លើកទី៩		សប្តាហ៍ទី៣៩			
លើកទី១០		សប្តាហ៍ទី៤០			

我的過去孕產史

（初次產前檢查問診紀錄，請準媽媽產檢前填寫）

生產情形 ＼ 懷孕次數			第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次
妊娠終止日期（年月日）								
活產	活產週數							
	生產方式	自然生產						
		真空吸引						
		產鉗						
		剖腹產						
	性別							
	出生體重（公克）							
	目前存活情形	存						
		歿（年齡、原因）						
流產	自然流產							
	人工流產							
死產	週數							
	生產方式							
胎兒異常								
備註								

បុរេតត្តិធ្លាប់មានផ្ទៃពោះឬបុរសូតរបស់ខ្ញុំ

(កត់ត្រាពិនិត្យសួរជំងឺលើកដំបូងមុនពេលបុរសូត,សូមអ្នកមានផ្ទៃពោះបំពេញមុនពេលត្រួតពិនិត្យ)

សុថានភាពបង្កើតកូន / មានផ្ទៃពោះប៉ុន្មានដង			លើកទី១	លើកទី២	លើកទី៣	លើកទី៤	លើកទី៥	លើកទី៦
ងងៃចុងក្រោយមានផ្ទៃពោះ(ថ្ងៃខែឆ្នាំ)								
បុរសូតរស់	សប្បដាបុរសូតរស់							
	វិធីបង្កើត	បង្កើតដាយធម្មជាតិ						
		ស្បូរបដាយខ្សល់						
		គាប						
		វះពោះ						
	ភាទ							
	ទំងន់ពេលបុរសូត(ក្រាម)							
	សុថានភាពរស់ក្នុងបច្ចុប្បបន្ន	រស់						
		សុលាប់(អាយុ,មូលហេតុ)						
រលូតកូន	រលូតកូនតាមធម្មជាតិ							
	រលូតកូនដាយវះកាត់							
សុលាប់ក្នុងផ្ទៃ	ចំនួនសប្បដាហ៍							
	វិធីបង្កើត							
ទារកមិនបុរក្រតី								
បន្ទុចមែ								

產檢紀錄總表

胎　次：_____
預產期：　　年　　月　　日
最後一次月經開始日期：　　年　　月　　日
身　高(cm)：_____
懷孕前體重(公斤)：_____
BMI = 體重（公斤）/ 身高^2（公尺^2）= _____

	檢查結果		檢查結果
Rh因子		B型肝炎表面抗原	□- □+
血型		B型肝炎e抗原	□- □+
白 血 球（WBC）		梅毒血清反應第一次	□- □+
紅 血 球（RBC）		梅毒血清反應第二次	□- □+
血 小 板（Plt）		德國麻疹抗體反應	□- □+
血球容積比（Hct）		乙型鏈球菌檢查	□- □+
血 紅 素（Hb）			
平均紅血球體積（MCV）			
其他			

自費檢查項目：
第一孕期母血唐氏症篩檢 _____
第二孕期母血唐氏症篩檢 _____
羊膜穿刺 _____
妊娠糖尿病篩檢 _____

骨盆腔檢查

※準媽媽的B型肝炎表面抗原及e抗原檢查結果，如果均為陽性（+），其寶寶應於出生後儘速注射1劑B型肝炎免疫球蛋白及B型肝炎疫苗，越早越好，同時不要晚於24小時，並應在完成第3劑B型肝炎疫苗後，年齡滿12個月大時進行B型肝炎表面抗原（HBsAg）及B型肝炎表面抗體（anti-HBs）等檢測。

※準媽媽如果為B型肝炎表面抗原陽性，請醫師協助將該次產檢結果登錄於「孕婦B型肝炎追蹤檢查紀錄（238頁）」，並請產後依消化專科醫師建議進行相關追蹤檢查。

※準媽媽的德國麻疹抗體檢查結果如為陰性（－），懷孕期間請特別注意，避免感染德國麻疹，以保護胎兒，並應在產後，儘速持德國麻疹抗體檢查陰性（－）證明，至各衛生所或預防接種合約醫院診所，接種1劑麻疹腮腺炎德國麻疹（MMR）混合疫苗（接種3個月內應避免懷孕）。

註：後續頁面亦有提供各次產檢紀錄處，亦可將報告記錄於該頁面。

តារាងកំណត់ត្រាសរុបនៃការពិនិត្យផ្ទៃពោះ

កូនទី៖______
កាលបរិច្ឆេទព្យាករណ៍នៃការសម្រាល៖ ______ថ្ងៃទី ______ខែ ______ឆ្នាំ
កាលបរិច្ឆេទនៃការមករដូវលើកចុងក្រោយ៖ ______ថ្ងៃទី ______ខែ ______ឆ្នាំ
កម្ពស់(cm)៖ ______
ទម្ងន់មុនពេលមានផ្ទៃពោះ (គីឡូក្រាម)៖ ______
BMI = ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) /កម្ពស់^{2}(ម៉ែត្រ^2)= ______

	លទ្ធផលនៃការពិនិត្យ		លទ្ធផលនៃការពិនិត្យ
ក្រុមឈាមRh		ទអែង់ទីសនៃផ្ទៃនៃមេរោគថ្លើមប្រភេទB	☐- ☐+
ប្រភេទឈាម		អង់ទីសនៃ e នៃមេរោគថ្លើមប្រភេទ B	☐- ☐+
គាលិកាឈាមស(WBC)		ប្រតិកម្មលើកទី១នៃសេរ៉ូមជម្ងឺស្វាយ	☐- ☐+
គាលិកាឈាមក្រហម(RBC)		ប្រតិកម្មលើកទី២នៃសេរ៉ូមជម្ងឺស្វាយ	☐- ☐+
ប្លាកែត(Plt)		ប្រតិកម្មនៃអង់ទីករជម្ងឺកញ្ជ្រិល	☐- ☐+
អេម៉ាតូគ្រីត (Hct)		ការពិនិត្យStreptococcusប្រភេទB	☐- ☐+
ហេម៉ូ(Hb)			
បរិមាណគាលិកាក្រហមជាមធ្យម(MCV)			
ផ្សេងទៀត			

ផ្នែកពិនិត្យគិតថ្លៃ
ពិនិត្យដំណាក់កាលទី1ការធ្លាក់ចុះនៃប្រព័ន្ធសញ្ញានៃឈាមម្ដាយ ______________________________
ពិនិត្យដំណាក់កាលទី2ការធ្លាក់ចុះនៃប្រព័ន្ធសញ្ញានៃឈាមម្ដាយ ______________________________
ការចាក់ថ្នាំទឹកភ្លោះ: ______________________________
ការពិនិត្យជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌ ______________________________

ការពិនិត្យអាងត្រគៀក

※ លទ្ធផលនៃការពិនិត្យអង់ទីសនៃe និងអង់ទីសនៃផ្ទៃនៃមេរោគថ្លើមប្រភេទ Bរបស់ម្ដាយប្រសិនមានសញ្ញាវិជ្ជមាន (+)នោះទារកត្រូវចាក់ក្លូប៊ុយលីននៃភាពស៊ាំជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទB និងថ្នាំបង្ការជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទB ចំនួន១លើកជាបន្ទាន់ក្រោយពេលកើតមកមិនលើសពី២៤ម៉ោង ម្យ៉ាងទៀតក្រោយពេលសម្រេចការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទBលើកទី៣ហើយត្រូវទទួលយកការពិនិត្យអង់ទីសនៃផ្ទៃនៃមេរោគថ្លើមប្រភេទB(HBsAg)និងអង់ទីករផ្ទៃនៃមេរោគថ្លើមប្រភេទ B (anti-HBs)ពេលអាយុគ្រប់១២ខែ។

※ ប្រសិនបើការពិនិត្យអង់ទីសនៃផ្ទៃនៃមេរោគថ្លើមប្រភេទ Bរបស់ម្ដាយមានសញ្ញាវិជ្ជមានសូមវេជ្ជបណ្ឌិតជួយកត់ត្រាការពិនិត្យលើកនេះចូលក្នុង “កំណត់ត្រាការពិនិត្យតាមដានជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទBរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រទី២៣៩)” ព្រមទាំងធ្វើការតាមដានក្រោយពេលសម្រាលទៅតាមដំបូន្មានរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ។

※ ប្រសិនបើការពិនិត្យអង់ទីសនៃជម្ងឺកញ្ជ្រិលរបស់ម្ដាយមានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន(-)សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងដំណាក់កាលមានផ្ទៃពោះជៀសវាងឆ្លងជម្ងឺកញ្ជ្រិលដើម្បីជាការការពារទៅដល់ទារកក្នុងផ្ទៃនិងក្រោយពេលសម្រាលសូមប្រញាប់រួសរាន់ទៅទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការចម្រុះជម្ងឺកញ្ជ្រិលនិងជម្ងឺក្រឡេទនៃ (MMR)ចំនួន1លើក (ជៀសវាងការមានផ្ទៃពោះក្នុងកំឡុងពេល៣ខែក្រោយពេលចាក់ថ្នាំបង្ការ) នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬគ្លីនិកមន្ទីរពេទ្យផ្ដល់ថ្នាំបង្ការដោយភ្ជាប់ទៅជាមួយលិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលអវិជ្ជមាន(-)នៃការពិនិត្យអង់ទីសនៃជម្ងឺកញ្ជ្រិល។

សម្គាល់៖ទំព័របន្ទាប់ក៏មានកន្លែងកត់ត្រាការពិនិត្យរាល់លើកអាចកត់ត្រាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យនៅលើទំព័រនេះបាន។

產檢時程	檢查日期	懷孕週數	體重(kg)	血壓(mmHg)	宮底高度(cm)	胎心音分次／(懷孕2個月內免填寫)	尿糖	尿蛋白	浮腫	靜脈曲張	備註 如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表(TIPVDA量表，參閱第224頁)	下次產檢日期
第1次											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
第2次											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
第3次											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
第4次											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
第5次											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
第6次											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
第7次											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
第8次											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
第9次											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
第10次											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	
											□無特殊發現 □需注意或異常項目 □需追蹤 □需轉介	

ជំពូកកត់ត្រាសុខភាព

កាលវិភាគពិនិត្យផ្ទៃពោះ	១ដង	២ដង	៣ដង	៤ដង	៥ដង	៦ដង	៧ដង	៨ដង	៩ដង	១០ដង				
កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យ														
អាយុគភ៌ចំនួនសប្ដាហ៍														
ទម្ងន់(kg)														
សម្ពាធឈាម (mmHg)														
ប្រវែងហាតស្បូន(cm)														
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌ដង/នាទី (ទីបមានផ្ទៃពោះ2ខដំបូងមិនហាច់បំពេញ)														
ជាតិស្ករក្នុងទឹកនាម														
ជាតិប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនាម														
អាការៈហើម														
អាការៈរីកសរសៃឈាម														
សម្គាល់ប្រសិនមានបីមានស្នាមរបួសមិនដឹងមូលហេតុឬសង្ស័យថាទទួលរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ សូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ព្រមទាំងបំពេញតារាងវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃអំពើហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និតតវ៉ៃន់ IPVDA សូមមើលទំព័រទី 225)	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់	☐ គ្មានការប្រទះឃើញជាពិសេស ☐ នកែគួរប្រុងប្រយ័ត្នឬខុសប្រក្រតី ☐ ត្រូវតាមដានជាចាំបាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់
កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកក្រោយ														

產科超音波檢查紀錄

姓名：　　年齡：　　病歷：

LMP：　　EDC：　　週數：

臨床診斷：

1. 胚囊 □有 □無　　2. 胎數 _____

3. 心跳 □有 □無　　4. 胎兒大小週數 _____

5. 胎位 _____　　6. 胎盤位置 _____

7. 羊水 □正常 □過多 □過少　　8. 其他 _____

診斷：_____

_____

_____

檢查日期：　　報告者：

កំណត់ត្រាការពិនិត្យអ៊ុលត្រាសានផ្នែកសម្ភព

ឈ្មោះ អាយុ បុរេតិដ្ឋមុងធី
LMP : EDC : ចំនួនសប្ដាហ៍
ការពិនិត្យ

១.ថង់គភ៌ ☐ មាន ☐ គ្មាន
២.ហ្វូរកេង់គភ៌ _____
៣.ចង្វាក់បេះដូង ☐ មាន ☐ គ្មាន
៤.ចំនួនសប្ដាហ៍អាយុកូនក្នុងផ្ទៃ _____
៥.ទីតាំងគភ៌ _____ ៦.ទីតាំងសុក _____
៧.ទឹកភ្លោះ ☐ ធម្មតា ☐ ច្រើនពេក ☐ តិចពេក
៨.ដទៃទៀត _____
ការពិនិត្យ _____
_____
_____
កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យ អ្នករាយការណ៍

第1次孕婦產前健康照護衛教指導記錄表

(妊娠第一孕期：經醫師診斷、確認懷孕後至妊娠未滿17週前)

(懷孕週數，第_____週)【本項服務由菸品健康福利捐補助】　病歷號

基本資料

由準媽媽填寫

姓名		出生日期	_____年____月____日
身分證字號 (外籍人士護照號碼)			
聯絡地址			
聯絡方式	手機:_____	住家:(　)-_____	
身高_____公分	懷孕前體重_____公斤	目前體重_____公斤	血色素_____ gm/dl

目前是否有接受社會福利補助情況:(可複選)

□0.否，□1.中低收入戶補助，□2.低收入戶補助，□3.特殊境遇家庭補助，

□4.兒少生活補助（項目：____；人數：__），□5.其他_____

有下列情況之懷孕婦女:

□1.未婚懷孕婦女，□2.身心障礙懷孕婦女，□3.其他_____

健康行為

1.您目前是否吸菸?

□0.否，□1.偶爾或應酬才吸，□2.平均一天約吸一包菸（20支）以下，

□3.平均一天約吸一包菸以上

2.您是否特別注意遠離二手菸的環境？

□0.否，□1.是，□2.週遭環境沒有二手菸

3.您目前是否喝酒?

□0.否，□1.偶爾或應酬才喝，□2.經常喝

4.您是否嚼檳榔?：

□ 0.否，□1.偶爾或應酬才嚼，□2.經常嚼

5.您是否曾使用毒品?：

□0.否，□1.是

6.心情溫度計：

□是，□否 1.過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？

□是，□否 2.過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？

1.本資料將用於衛生福利政策評估，供衛生保健及社政單位關懷訪視服務。

□1.同意，□2.不同意。

2.您是否願意衛生及社政人員前往您的家中進行關懷訪視？ □1.願意，□2.不願意。

孕產醫療史

過去是否有相關孕產醫療史

□0.否　，□1.是（請於下列□進行勾選）。

□(1)子宮肌瘤割除或子宮修補術，□(2)心臟病手術，□(3)高血壓病，□(4)妊娠糖尿病，□(5)早產，□(6)先天異常兒，□(7)死胎死產，□(8)新生兒死亡，□(9)陰道難產，□(10)產後出血，□(11)前胎胎兒乙型鏈球菌感染，□(12)流產，□(13)其他_____

※如有上述孕產醫療史情形，請就診院所提供醫療服務或轉介至中、重度級急救責任醫院。

តារាងកំណត់ត្រាលំណាំនៅការថែទាំសុខភាពមុនពេលសម្រាលរបស់ស្ត្រីមានគភ៌លើកទី១

(ដំណាក់កាលមានគភ៌ទី១៖រាប់ចាប់ពីត្រូវបានពិនិត្យឃើញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតនិងបញ្ជាក់ថាមានគភ៌រហូតដល់មុនសប្តាហ៍ទី១៧នៃការមានគភ៌)

(មានផ្ទៃពោះ_____សប្តាហ៍) "សេវាកម្មនេះឧបត្ថម្ភដោយមន្ទីរសុខភាពនិងរបបឧបត្ថម្ភថ្នាំជក់"

លេខអ្នកទទួលការពិនិត្យ

នាមត្រកូល				ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត			_____ថ្ងៃ_____ខែ_____ឆ្នាំ			
លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លេខលិខិតឆ្លងដែននៃជនបរទេស										
អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង										
មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង	ទូរស័ព្ទដៃ៖_______________ ទូរស័ព្ទនៅផ្ទះ៖( )-_______________									
កម្ពស់ _______________	ទម្ងន់មុនពេលមានផ្ទៃពោះ______គីឡូ			ទម្ងន់បច្ចុប្បន្ន______ គីឡូ			អេម៉ូក្លូប៊ីន __________ gm/dl			

តើបច្ចុប្បន្ននមានទទួលជំនួយរបបឧបត្ថម្ភសង្គមដែរឬទេ៖ (អាចជ្រើសរើសច្រើន)

☐ 0.គ្មាន ☐ ១.ជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រួសារចំណូលទាបនិងមធ្យម ☐ ២.ជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រួសារចំណូលទាប

☐ ៣.ជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រួសារស្ថានភាពពិសេស ☐ ៤.ជំនួយឧបត្ថម្ភការរស់នៅរបស់កុមារ (ផ្នែកៈចំនួនមនុស្សៈ)

☐ ៥.ផ្សេងៗ_____

ស្ត្រីមានគភ៌ដែលមានស្ថានភាពសុខភាពដូចខាងក្រោម៖

☐ ១.ស្ត្រីមានគភ៌មិនទាន់រៀបការ ☐ ២.ស្ត្រីពិការមានគភ៌ ☐ ៣.ផ្សេងទៀត_______

១. តើបច្ចុប្បន្ននអ្នកជក់បារីដែរឬទេ?

☐ 0.ទេ ☐ ១.ជក់ម្តងម្កាលឬជក់នៅពេលជួបភ្ញៀវ ☐ ២.ជាមធ្យមក្នុង១ថ្ងៃជក់ក្រោម១កញ្ចប់ (20ដើម)

☐ ៣.ជាមធ្យមក្នុង១ថ្ងៃជក់លើស១កញ្ចប់

២.តើអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងពីបរិស្ថានដែលមានផ្សែងបារីដែរឬទេ?

☐ 0.ទេ ☐ ១.ចាស់ ☐ ២.បរិស្ថានជុំវិញគ្មានផ្សែងបារី

៣.បច្ចុប្បន្ននអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងដែរឬទេ?

☐ 0.ទេ ☐ ១.ផឹកម្តងម្កាលឬផឹកពេលជួបភ្ញៀវ ☐ ២.ផឹកញឹកញាប់

៤.តើអ្នកទំពារស្លាម្លូដែរឬទេ?

☐ 0.ទេ ☐ ១.ទំពារម្តងម្កាលឬទំពារពេលជួបភ្ញៀវ ☐ ២.ទំពារជាញឹកញាប់

៥.តើអ្នកធ្លាប់សេពគ្រឿងញៀនដែរឬទេ?

☐ 0.ទេ ☐ ១.ធ្លាប់

៦.ការពិនិត្យវិបត្តិ៖

☐ មាន ☐ គ្មាន ១.តើ១ខែមុនអ្នកតែងតែរម្ភដែលបណ្តាលមកពីការបាក់ទឹកចិត្តទុក្ខសោកឬអស់សង្ឃឹមចំពោះអនាគតដែរឬទេ?

☐ មាន ☐ គ្មាន ២.តើ១ខែមុនតើអ្នកតែងតែបាត់បង់ចំណាប់ចំណូលចិត្តចំពោះគ្រប់រឿងឬមិនសប្បាយរីករាយចំពោះការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែរឬទេ?

១.ពត៌មានទាំងនេះនឹងត្រូវបានប្រើក្នុងការវាយតម្លៃគោលនយោបាយរបបឧបត្ថម្ភសុខាភិបាលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មចុះយកចិត្តទុកដាក់ពីមន្ទីរធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នកិច្ចការសង្គម។ ☐១.យល់ព្រម ☐២.មិនយល់ព្រម

២.តើអ្នកយល់ព្រមឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងបុគ្គលិកកិច្ចការសង្គមចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅគេហដ្ឋានដែរឬទេ?

☐១.យល់ព្រម ☐២.មិនយល់ព្រម

តើពីមុនធ្លាប់មាន ប្រវត្តិព្យាបាលនិងសម្រាលកូនដែរឬទេ?)

☐គ្មាន ☐១.មាន (សូមជ្រើសរើស☐ខាងក្រោម)

☐(១)ការព្យាបាលកាត់ដុំសាច់ក្នុងស្បូនឬការព្យាបាលប៉ះប៉ូវស្បូន ☐(២) ការវះកាត់ជម្ងឺបេះដូង

☐(៣)ជម្ងឺលើសឈាម ☐(៤)ពេលពពោះជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានគភ៌ , ☐(៥)សម្រាលកូនមុនខែ

☐(៦)ទារកខុសប្រក្រតី ☐(៧)កូនស្លាប់ក្នុងផ្ទៃ ☐(៨)កូនស្លាប់ក្រោយពេលសម្រាល

☐(៩)ពិបាកសម្រាលតាមទ្វារមាស ☐(១០)ហូរឈាមក្រោយពេលសម្រាល

☐(១១)កូនមុនឆ្លង Streptococcus ប្រភេទB ☐(១២)រលូតកូន ☐(១៣)ផ្សេងទៀត

※ ប្រសិនបីមានប្រវត្តិជនកៃព្យាបាលទាក់ទងនឹងការសម្រាលខាងលើសូមមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលពិនិត្យផ្តល់នូវសេវាកម្មព្យាបាលឬបញ្ជូនផ្លាស់ប្តូរអ្នកជម្ងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមានទំនួលខុសត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់កម្រិតមធ្យមនិងធ្ងន់។

衛教主題	重點	準媽媽自我評估		醫事人員指導重點
		清楚	不清楚	
1.維持母胎安全(參閱手冊-讓寶寶安全的成長)	流產徵兆及高危險妊娠	☐	☐	☐知道懷孕早期宜多休息與足夠睡眠，勿提重物。若出現流產之徵兆（陰道出血、下腹部悶痛、持續子宮收縮）時，應立即就醫。
		☐	☐	☐知道本身的健康資料、疾病史及孕產醫療史狀況，未來產檢如有醫師告知：出現孕產醫療史1至13項之一者，請選擇至就近的中、重度級急救責任醫院接受診治或安胎。
		☐	☐	☐知道定期產前檢查的目的、時程及重要性
	危害物質	☐	☐	☐知道菸（含二手菸）對母嬰健康之危害(流產、早產、出生低體重)
		☐	☐	☐知道酒對母嬰健康之危害(流產、早產、死產、出生低體重、中樞神經異常)。
		☐	☐	☐知道檳榔對母嬰健康之危害(流產、早產、死產、出生低體重)。
		☐	☐	☐本次懷孕吸菸者，協助轉介戒菸門診。
	產前遺傳檢查	☐	☐	☐知道孕婦具有下列情形之一者，政府於產前有補助費用做羊膜穿刺檢查。 34歲以上、曾生育過先天異常兒、本人或配偶有遺傳性疾病者、有家族遺傳疾病及本次懷孕經超音波檢查有異常者
2.兩性平權(參閱手冊-女孩男孩一樣好)	疼惜咱的寶貝	☐	☐	☐女孩男孩一樣好，生來通通都是寶，孩子未來的成就無關性別，知道做性別篩檢或因選擇性別而墮胎是違法的。
3.孕期營養(參閱手冊-吃出健康)	營養素補充	☐	☐	☐知道孕前一個月至懷孕期間，增加葉酸、碘攝取的重要性。
		☐	☐	☐知道孕期增加鈣、鐵攝取。素食者補充維生素B12的重要性。
		☐	☐	☐知道適當的選擇與食用營養補充食品。
	均衡飲食	☐	☐	☐知道懷孕早期有孕吐時，宜少量多餐，優先攝取天然食物，避免攝取加工食品、高油高熱量及空熱量食物(如:含糖飲料)。

※紅框內之欄位，請醫護人員協助準媽媽們於衛教指導前先行填寫，以供醫事人員參考。
※返家後，若有孕產諮詢需求，請多加運用全國免付費孕產婦關懷專線0800-870870或孕產婦關懷網站http://mammy.hpa.gov.tw。

醫療院所/助產所名稱及代碼	醫師/助產人員簽章： 指導日期____年____月____日	孕婦簽名：

備註：
1. 本衛教指導內容由衛生福利部國民健康署及臺灣婦產科醫學會、臺灣母胎醫學會、臺灣周產期醫學會、臺灣護理學會、臺灣助產學會、及中華民國營養師公會全國聯合會共同研擬。
2. 本次衛教指導可搭配第1孕期（懷孕第12週-第17週前）第1次至第2次孕婦產前檢查，依孕婦健康需求執行指導，請參閱孕婦健康手冊內容予以衛教。

អនាម័យ ប្រធានបទ	ចំណុចសំខាន់	ការវាយតម្លៃខ្លួនឯងរបស់ម្ដាយ		ចំណុចសំខាន់ចង្អុលបង្ហាញដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាល
		ច្បាស់លាស់	មិនច្បាស់លាស់	
១.រក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ម្ដាយឯងទារក (ឯកសារយោង-នាំឲ្យទារកធំធាត់ដោយសុវត្ថិភាព)	សញ្ញានៃការរលូតកូននិងការមានគភ៌ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់	☐	☐	☐ ងពីការមានផ្ទៃពោះដំណាក់កាលបឋមត្រូវសម្រាកឲ្យបានច្រើននិងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហាមលើករបស់ធ្ងន់។ប្រសិនបើលេចចេញនូវសញ្ញារលូតកូន(ហូរឈាមតាមទ្វារមាសឈឺចុកផ្នែកពោះខាងក្រោម មានកន្ត្រាក់ស្បូនបន្តបន្ទាប់) ត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់។
		☐	☐	☐ ដឹងពីពត៌មានស្ថានភាពសុខភាព、ប្រវត្តិជម្ងឺនិងប្រវត្តិនៃការព្យាបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការមានគភ៌របស់ខ្លួន។នៅក្នុងការពិនិត្យផ្ទៃពោះប្រសិនបើមានវេជ្ជបណ្ឌិតផ្ដល់ដំណឹងៈកើតមានករណីមួយក្នុងចំណោមករណីទី១ដល់ទី១៣នៃប្រវត្តិព្យាបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការមានគភ៌ត្រូវទៅទទួលយកការព្យាបាលនិងរក្សាគភ៌នៅមន្ទីរពេទ្យមានទំនួលខុសត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់កម្រិតមធ្យមនិងធ្ងន់ដែលនៅជិតបំផុត។
		☐	☐	☐ ដឹងពីគោលបំណងកាលវិភាគនិងសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យផ្ទៃពោះទៀងទាត់មុនពេលសម្រាក
	សារធាតុគ្រោះថ្នាក់	☐	☐	☐ ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់របស់បារី (ផ្សែងបារី) ចំពោះសុខភាពម្ដាយនិងទារក (រលូតកើតមុនខែទារកមានទម្ងន់ស្រាល)
		☐	☐	☐ ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងស្រវឹងចំពោះសុខភាពម្ដាយនិងទារក (រលូតកើតមុនខែកូនស្លាប់ក្នុងផ្ទៃទារកមានទម្ងន់ស្រាលប្រព័ន្ធប្រសាទខុសប្រក្រតី)។
		☐	☐	☐ ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃផ្លែស្លាម្លូចំពោះសុខភាពម្ដាយនិងទារក (រលូតកើតមុនខែកូនស្លាប់ក្នុងផ្ទៃទារកមានទម្ងន់ស្រាលប្រព័ន្ធប្រសាទខុសប្រក្រតី)។
		☐	☐	☐ ស្ត្រីដែលជក់បារីក្នុងការមានគភ៌លើកនេះជួយបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ផ្នែកពិគ្រោះផ្ដាច់បារី។
	ការពិនិត្យជម្ងឺតំណពូជមុនពេលសម្រាល	☐	☐	☐ ដឹងពីស្ត្រីមានគភ៌មានស្ថានភាព១ក្នុងចំណោមស្ថានភាពទាំងឡាយខាងក្រោមរដ្ឋាភិបាលមានផ្ដល់ជូនជំនួយឧបត្ថម្ភក្នុងការពិនិត្យចាក់ទឹកភ្លោះមុនពេលសម្រាល។ស្ត្រីមានគភ៌ដែលមានអាយុលើសពី៣៤ឆ្នាំធ្លាប់សម្រាលបានកូនខុសប្រក្រតីខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬស្វាមីមានជម្ងឺផ្លូវភេទតពូជមានជម្ងឺតពូជសណ្ដាននិងលទ្ធផលពិនិត្យអ៊ុលត្រាសោនលើកនេះខុសប្រក្រតី។
២.សមភាពទាំងពីរភេទ (ឯកសារយោង-កូនស្រីឬកូនប្រុសល្អដូចគ្នា)	ស្រលាញ់កូនសំលាញ់របស់យើង	☐	☐	☐ កូនស្រីឬកូនប្រុសល្អដូចគ្នាកើតមកសុទ្ធតែជាកូនរបស់យើង។ភាពជាគជ័យដែលកូនសម្រេចបាននៅថ្ងៃអនាគតមិនបង្អែកលើភេទឡើយ។ដឹងពីការពិនិត្យភេទរបស់គភ៌និងការរំលូតកូនដោយសារជ្រើសរើសភេទជាទង្វើល្មើសច្បាប់។
៣.សារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ (ឯកសារយោង-ទទួលទានដោយសុខភាព)	បន្ថែមសារធាតុបន្ថែមសារធាតុចិញ្ចឹមចិញ្ចឹម	☐	☐	☐ ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការស្រូបយកជាតិអាស៊ីតហ្វូលីកនិងជាតិអ៊ីយ៉ូតចាប់ពី1ខែមុនមានផ្ទៃពោះរហូតដល់កំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។
		☐	☐	☐ ដឹងពីការបង្កើនការស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិដែកក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។សារៈសំខាន់នៃការបំប៉នវីតាមីន B១២ ចំពោះអ្នកញ៉ាំអាហារបួស
		☐	☐	☐ ដឹងពីជ្រើសរើសនិងទទួលទានអាហារបំប៉នឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
	សមភាពនៃការទទួលទាន	☐	☐	☐ ដឹងពីដំណាក់កាលបឋមនៃការមានផ្ទៃពោះតង្វៃក្អួតចាញ់កូនគប្បីទទួលទានអាហារឲ្យបានច្រើនដងតែក្នុងបរិមាណតិចទទួលទានយកអាហារធម្មជាតិជាអាទិភាពជៀសវាងការទទួលទានចំណីអាហារកែច្នៃមែនខ្លាញ់ច្រើនមានកាឡូរីខ្ពស់ឬអាហារអត់កាឡូរី (រួមមានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករជាដើម)។

*ក្រឡានៅក្នុងតារាងពណ៌ក្រហមសូមបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួយស្ត្រីជាម្ដាយក្នុងការបំពេញមុនពេលទទួលយកការអប់រំសុខភាពដើម្បីជាពត៌មានយោងសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល។

*ក្រោយពេលត្រលប់មកគេហដ្ឋានវិញប្រសិនបើមានតម្រូវការផ្នែកប្រឹក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការមានផ្ទៃពោះសូមទំនាក់ទំនងខ្សទូរស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទូទាំងប្រទេសឥតគិតថ្លៃ 0800-870870 ឬគេហទំព័រ http://mammy.hpa.gov.tw

ឈ្មោះនិងលេខកូដមន្ទីរពេទ្យ/មន្ទីរសម្ភព	ហត្ថលេខានិងត្រាវេជ្ជបណ្ឌិត/ឆ្មប កាលបរិច្ឆេទនៃការបង្រៀនឆ្នាំខែថ្ងៃទី ______ថ្ងៃទី ______ខែ______ឆ្នាំ	ហត្ថលេខាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

សម្គាល់៖

១. ខ្លឹមសារនៃការអប់រំសុខភាពនេះត្រូវស្រាវជ្រាវរៀបរៀងឡើងដោយទីស្នាក់ការសុខភាពនិងសុខមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋបនក្រសួងសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថម្ភរួមជាមួយសមាគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រផ្នែកសម្ភពតៃវ៉ាន់សមាគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រមាតានិងទារកតៃវ៉ាន់សមាគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រពេលមានគភ៌តៃវ៉ាន់សមាគមន៍ថ្នាំតៃវ៉ាន់សមាគមន៍ឆ្មបតៃវ៉ាន់សម្ព័ន្ធសមាគមន៍ទូទាំងប្រទេសនសៃមាគមន៍អ្នកឯកទេសចំណីអាហារសធារណៈរដ្ឋបចិន។

២. ការអប់រំសុខភាពលើកនេះអាចផ្គូបផ្គុំជាមួយការពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី១ដល់លើកទី2នដំណាក់កាលមានគភ៌ទី១ (សប្ដាហ៍ទី១២ដល់ទី១៧)។ធ្វើការបង្រៀនណែនាំដោយយោងទៅតាមតម្រូវការផ្នែកសុខភាពរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។សូមផ្ដល់ការបង្រៀនណែនាំដោយយោងទៅតាមខ្លឹមសារនសៀវភៅសុខភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។

初次產檢自我檢核紀錄

初次產檢自我紀錄事項
（妊娠第一期：妊娠未滿17週・建議週數：第12週以前）
※請準媽媽於接受產前檢查前，務必將下列事項及自我檢核紀錄填寫完整

以下是記錄於____年____月____日（懷孕週數第____週）

1. 最後一次月經開始日期：____年____月____日
2. 準媽媽記錄自覺項目：□出血 □腹痛 □頭痛 □痙攣 □其他自覺徵狀:_____
3. 準媽媽的過去健康資料，是醫師診斷的重要參考。請準媽媽詳細的填寫。
   若您曾有下列症狀，請在□打勾。

疾病史	□ 1. 慢性高血壓 □ 2. 糖尿病 □ 3. 心臟病 □ 4. 外科疾病 □ 5. 腎臟病 □ 6. 甲狀腺疾病 □ 7. 血液凝固疾病 □ 8. 法定傳染病疾病 □ 9. 婦科腫瘤及癌症 □ 10. 中樞神經疾病 □ 11. 泌尿系統疾病	□ 12. 消化道及肝臟疾病 □ 13. 貧血 □ 14. 紅斑性狼瘡及自體免疫疾病 □ 15. 支氣管氣喘及肺部疾病 □ 16. 癲癇 □ 17. 家族是否有遺傳性疾病及其他先天性異常 □ 18. 吸菸 □ 19. 同居住者吸菸 □ 20. 飲酒 □ 21. 使用毒品 □ 22. 其他：_____
孕產醫療史	□ 1. 子宮肌瘤割除或子宮修補術 □ 2. 心臟病手術 □ 3. 高血壓病 □ 4. 妊娠糖尿病 □ 5. 早產（懷孕未滿37週之生產） □ 6. 先天異常兒 □ 7. 新生兒死亡 □ 8. 陰道難產 □ 9. 產後出血 □ 10. 前胎胎兒乙型鏈球菌感染 □ 11. 羊水栓塞 □ 12. 羊膜發炎	□ 13. 羊水過多或過少 □ 14. 早期破水 □ 15. 前置胎盤及胎盤剝離 □ 16. 植入性胎盤 □ 17. 胎兒異常或子宮內胎兒死亡；死胎死產 □ 18. 胎兒異常需接受外科手術治療 □ 19. 產前遺傳診斷呈現異常（染色體或基因檢查） □ 20. 胎兒窘迫 □ 21. 子癲前症 □ 22. 子癲症 □ 23. 其他:_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកដំបូងដាយខ្លួនឯង

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកដំបូងដាយខ្លួនឯងcheckup.
(មានផ្ទៃពោះរលោដំបូង:មានផ្ទៃពោះមិនទាន់គ្រប់១៧សហតហ៍,អាយយោបល់នៅទីប៉ុន្មានសហតហ៍)
ឆ្លើបំពេញអាយពញលញនូវបុរការខាងក្រាមនិងការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យដាយខ្លួនឯង,មុនពលធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ។

ខាងក្រាមនេះ _____ថ្ងៃទៃ _____ខែ_____ឆ្នាំ (មានផ្ទៃពោះ_____សហតហ៍)

១. ថ្ងៃដំបូងនៅមករដូវចុងក្រាយថ្ងៃខែឆ្នាំ _____ថ្ងៃទៃ _____ខែ_____ឆ្នាំ

២. បុរការដឹងខ្លួនក្នុងការកត់ត្រារបស់អ្នកមានផ្ទៃពោះ
☐ចញឈាម ☐ឈឺពោះ ☐ឈឺក្បាល ☐ជំងឺconvulsions ☐អាការៈដលៃខ្លួនយល់ឃើញដទទៀតៈ_____

៣. ឯកសាសុខភាពពីមុនរបស់អ្នកមានផ្ទៃពោះ,ជាឯកសារផ្តល់អាយគ្រូពទេយក្នុងការព្យាបាល។សូមអ្នកមានផ្ទៃពោះបំពញអាយលុអិតលុអន់។
បុរសិនបីមានអាការៈដូចខាងក្រាម,សូមvគូសក្នុង ☐

បុរវត្តិជំងឺ

- ☐ ១. ជំងឺលើសឈាម
- ☐ ២. ជំងឺទឹកនាមផ្អែម
- ☐ ៣.ជំងឺបះដូង
- ☐ ៤. ជំងឺក្រពះខ្លួន
- ☐ ៥. ជំងឺក្រលៀន
- ☐ ៦. ជំងឺពកកa thyroid glan
- ☐ ៧.ជំងឺកកឈាម
- ☐ ៨. ជំងឺចំលងដលៃកំណត់តាមចុហាប់
- ☐ ៩. ជំងឺមហារីកស្បូតិ៍
- ☐ ១០. ជំងឺសសបៃរសាទ
- ☐ ១១. ជំងឺបុរព័ន្ធធនាម
- ☐ ១២.ជំងឺក្រពះនិងចុលិម
- ☐ ១៣.ខ្ទុះឈាម
- ☐ ១៤. ជំងឺlupus erythemនិងជំងឺimmunity
- ☐ ១៥. ជំងឺដងុហិមបំពង់កនិងជំងឺសួត
- ☐ ១៦. ជំងឺឆ្អូតជ្រូក
- ☐ ១៧.កុរមគ្រូសារមានអ្នកជំងឺឆ្លងឬជំងឺអបុរកុរតីពិធមុមជាតិឬ?
- ☐ ១៨. ជក់ហារី
- ☐ ១៩. អ្នករស់នៅជាមួយគ្នាជក់ហារី
- ☐ ២០. ផឹកស្រា
- ☐ ២១. បុរីគ្រឿងញៀន
- ☐ ២២. ដទៃ_____

បុរវត្តិពុយាហលមានផ្ទៃពោះ

- ☐ ១. ការពុយាហលកាត់ដុំសៅចក្នុងស្បូន ឬការពុយាហលប៉ះថ្លើសួន
- ☐ ២. ការវះកាត់ជមុងឺបះដូង
- ☐ ៣.ជមុងឺលើសឈាម
- ☐ ៤. ពលេពរពោះ ជមុងឺទឹកនាមផ្អែមកុនុងពលេមានគភ៌
- ☐ ៥. ការសមុកលមុខខែ (សមុកលមុនពលេគភ៌អាយុ៣៧សបុដាហ៍)
- ☐ ៦. ទារកខុសបុរកុរតី
- ☐ ៧.កូនស្លាប់កុរាយពលេសមុកល
- ☐ ៨. ពិហកសមុកលតាមទុវារមាស
- ☐ ៩. ហូរឈាមកុរាយពលេសមុកល
- ☐ ១០. ហូរឈាមកុរាយពលេសមុកល
- ☐ ១១. សុទៈគនុលីៈទឹកសុបូន
- ☐ ១២.រលាកទុរនាប់សុបូន
- ☐ ១៣.ទឹកសុបូនចុរីនឬតិចពក
- ☐ ១៤. បកែទឹកមុនពលេ
- ☐ ១៥. សុកកូនខាងមុខនិងរលាត់សុកកូន
- ☐ ១៦. វៈកាត់ដាក់សុកកូន
- ☐ ១៧. កូនកុនុងផ្ទៃខ្មុសបុរកុរតី ឬកូនសុលាប់កុនុងសុបូន។ កូនសុលាប់កុនុងសុបូន ឬកូនសុលាប់ពលេសមុកល
- ☐ ១៨. ភាពមិនបុរកុរតីរបស់ទារកឬតូរវបានពុយាហល ដាយវៈកាត់
- ☐ ១៩. អបុរកុរតីកុនុងការត្រួតពិនិត្យការឆ្លងមុនពលេបុរសួត(តូរតពិនិត្យឆ្លងព័ណឬគីនី)
- ☐ ២០. ជមុរិតទារក
- ☐ ២១. ជំងឺលើសឈាមនៅពលេមានផ្ទៃពោ
- ☐ ២២. ជំងឺក្រឡាភ្លើង
- ☐ ២៣.ដទៃ_____

初次產檢自我檢核紀錄

4. 我已閱讀的衛教資訊

□產前檢查項目	(14頁)	□是	□否
□戒菸資訊	(82頁)	□是	□否
□孕婦免費愛滋病毒篩檢	(106頁)	□是	□否
□產前遺傳診斷與補助	(108頁)	□是	□否
□孕期生活須知	(122頁)	□是	□否
□孕期不適處理方式	(126頁)	□是	□否
□孕期體重控制與飲食	(132頁)	□是	□否
□孕期感染與妊娠合併症	(138頁)	□是	□否
□須立即就醫之危險徵兆	(144頁)	□是	□否

5. 心情點滴

家人要叮嚀、鼓勵媽咪的話_____

_____

準媽媽要給寶寶的話_____

6. 此次產檢您想要向醫師詢問的問題或困擾，可記錄於此（如：飲食、運動、生活作息、菸、酒、營養）

_____

_____

_____

_____

_____

註：如果您有勾選上述任何症狀，即可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和寶寶的安全（請參閱第214頁）

您有無吸菸？ □有(請參閱第82頁，**並請戒菸**) □沒有

在過去一個禮拜內，您在家的時候，有沒有其他人在您的面前吸菸？

□有(請參閱第82頁，**並請家人戒菸**) □沒有

準媽媽簽名：_____ 家人簽名：_____

孕產婦關懷專線 0800-870870

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកដំបូងដោយខ្លួនឯង

៤.ពត៌មានដលៃខុញ្ចាំហានអាន

☐ បុរការត្រួតពិនិត្យមុនពលេបុរសូត	(ទំព័រទ១៥)	☐មនៃ	☐មិនមនៃ
☐ ត្រួតពិនិត្យជំងឺអដេស៍ឥតគិតថ្លៃសំរាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទ៨៣)	☐មនៃ	☐មិនមនៃ
☐ ត្រួតពិនិត្យជំងឺអដេស៍ឥតគិតថ្លៃសំរាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទ១០៧)	☐មនៃ	☐មិនមនៃ
☐ ការត្រួតពិនិត្យនិងជំនួយជំងឺឆ្លងពីតុរកូលមុនពលេបុរសូត	(ទំព័រទ១០៩)	☐មនៃ	☐មិនមនៃ
☐ គួរយល់ដឹងពីជីវភាពនៅពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទ១២៣)	☐មនៃ	☐មិនមនៃ
☐ វិធីសំរួលនៅពលេមានផ្ទៃពោះមិនស្រួលខ្លួន	(ទំព័រទ១២៧)	☐មនៃ	☐មិនមនៃ
☐ ត្រួតទំងន់និងអាហារនៅពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទ១៣៣)	☐មនៃ	☐មិនមនៃ
☐ ឆ្លងជំងឺនៅពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន	(ទំព័រទ១៣៩)	☐មនៃ	☐មិនមនៃ
☐ អាការៈគ្រុនថ្នាក់ដលៃត្រូវទៅកាន់មន្ទីពទេ្យជាបន្ទាន	(ទំព័រទ១៤៥)	☐មនៃ	☐មិនមនៃ

៥.ចាក់ថ្នាំអារមុ្ណ

សំដីកុ្រមគ្រួសារដាស់តឿនលើកទឹកចិត្តអ្នកមុតាយ

សំដីអ្នកមុតាយទៅកាន់កូន_____

៦.បញ្ចូហានិងកង្វល់ដលៃអ្នកចង់សួរគ្រូពទេ្យនៅពលេត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកនេះ,អាចកត់ត្រានៅទីនេះ(ឧ អាហារ,កីឡា,ជីវភាព,រស់នៅ,ហារី,សុភ,ជីវជាតិ)

_____

_____

_____

_____

កត់សំគាល់ : បុរសិនបីអ្នកមានអាការៈដូចខាងលើ,បុរេហលៃជាអ្នកមានផ្ទៃពោះគ្រុនថ្នាក់,សូមសួរគ្រូពទេ្យហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ,ដើមុ្បីសុវត្ថិភាពខ្លួននិងកូន(សូមអានទំព័រទ២១៥)

តើអ្នកជក់ហារីដរៃឬទេ?

☐ជក់ (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសូមផ្ដាច់ចោហារី**) ☐មិនជក់

កុនុងរយៈពលេ១សបុដាហ៍មុន ពលេអ្នកនៅផ្ទះ តើមាននរណាជក់ហារីនៅមុខអ្នកដរៃឬទេ?

☐មាន (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសំណូមពរឲ្យពួកគផ្ដាច់ចោហារី**) ☐គ្មាន

ហត្ថលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ _____ ហត្ថលខោកុ្រមគ្រួសារ _____

ខ្សែទូរស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់សុរដីមានគតិ៖ 0800-870870

初次產檢紀錄

初次產檢檢查紀錄
（妊娠第一期：妊娠未滿17週　建議週數：第12週以前）

胎　次：　　檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週
預產期：　　年　　月　　日
最後一次月經開始日期：　　年　　月　　日

產前檢查記錄

身高cm _____
體重kg _____
血壓mmHg _____
胎心音(次/分) _____
（懷孕2個月內免填寫）
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

Rh因子 _____
血型 _____
白血球(WBC) _____
紅血球(RBC) _____
血小板(Plt) _____
血球容積比(Hct) _____
血色素(Hb) _____
平均紅血球體積(MCV) _____
其他 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現
☐需注意或異常項目
1. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
2. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
3. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកដំបូងដាយខ្លួនឯង

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកដំបូងដាយខ្លួនឯង
(មានផ្ទៃពោះពលេដំបូង:មានផ្ទៃពោះមិនទាន់គ្រប់១៧សហ្តហ អាយយាបល់នាទី១២សហ្តហ៍)

កូនទី៖ _____ កាលបរិច្ឆទទេនកៃារពិនិត្យ៖_____ថ្ងៃទ្បី _____ខ្ែ_____ឆ្នាំ
អាយុគភ៌៖សបុដាហ៍ _____ សបុដាហ៍
កាលបរិច្ឆទទេពុយាករណ៍នកៃារសម្រាល៖_____ថ្ងៃទ្បី _____ខ្ែ_____ឆ្នាំ
កាលបរិច្ឆទទេកៃារមករដួរលើកចុងក្រាយ៖_____ថ្ងៃទ្បី _____ខ្ែ_____ឆ្នាំ

កំណត់ត្រាពិនិត្យមុនពលេសម្រាល

កម្ពស់ (cm) _____
ទម្ងន់ (kg) _____
សមុពាធឈាម (mmHg) _____
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទ្ី) _____
ទីបមានផ្ទៃពោះ២ខ្ែដំបូងមិនហាច់បំពញ
ជាតិសុករក្នុងទឹកនាម _____
ជាតិប្រូតអ៊ីនក្នុងទឹកនាម _____
អាការៈហើម _____
អាការៈរីកសសឈាម _____

ភ្នាក់ងារ Rh _____
បុរភទេឈាម _____
គាលិកាឈាមស (WBC) _____
គាលិកាឈាមក្រហម (RBC) _____
បុលាកតៃ (Plt) _____
អម៉ោគ្លូរីត (Hct) _____
ហាមែ (Hb) _____
បរិមាណគាលិកាក្រហមជាមធ្យម(MCV)
_____
ផ្សងេទ្បៀត _____

លទ្ធផលពិនិត្យមុនពលេសម្រាល

☐ គ្មានការបុរទេះឃើញជាពិសសេ
☐ ផ្នែកគ្រូបុរុងបុរយ័ត្នឬខុសបុរក្រតី

1._____☐ ត្រូវតាមដានជាចាំហាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្នែលាស់បុដ្ឋរជាចាំហាច់
2._____☐ ត្រូវតាមដានជាចាំហាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្នែលាស់បុដ្ឋរជាចាំហាច់
3._____☐ ត្រូវតាមដានជាចាំហាច់ ☐ ត្រូវបញ្ជូនផ្នែលាស់បុដ្ឋរជាចាំហាច់

សមុគាល់៖បុរសិនមានបីមានសុនាមរបួសមិនដឹងមូលហតេុឬសង្ស័យថាទទួលរងអំពីហិង្សាកុនុងគ្រួសារសូមធ្ើការរាយការណ៍ទ្បាតាមការកំណត់ពុរមទាំងបំពញតារាងវាយតមុលគ្រៃះថុនាក់នអែំពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតសុនិតតភៃាន់ (តារាង TIPVDA សូមមីលទំព័រទ២២៥)

初次產檢紀錄

初次產檢檢查紀錄
（妊娠第一期：妊娠未滿17週　建議週數：第12週以前）

醫護特別叮嚀：

☐ 11-14週可做第一孕期母血唐氏症篩檢（為自費，檢查結果記錄於第20頁）。
☐ 抽血檢驗德國麻疹抗體檢查、梅毒檢查(檢查結果記錄於第20頁。
☐ 抽血檢驗B型肝炎表面抗原(HBsAg)、B型肝炎e抗原(HBeAg)檢查，檢查時程請參閱第14頁(檢查結果記錄於第20頁)。
☐ 平均紅血球體積MCV為海洋性貧血篩檢的重要依據，請記得向醫師洽詢檢查結果。
若MCV檢驗平均值小於80，則配偶亦需檢查。
☐「對於有糖尿病高風險族群的孕婦建議與醫師討論，應於第一次產檢時加做空腹的血糖(Fasting plasma glucose, FPG)及糖化血色素(HbA1C)之檢驗(為自費)。
☐ 建議免費做孕婦愛滋病毒篩檢服務。

6-8週由超音波可見胎兒心跳。
9-12週五官及重要器官發展。
13-16週胎兒生長狀況：

◎ 胎兒已完全成形，皮膚呈透明帶粉紅色，胎兒開始會動。

衛教及指導事項

☐	產前檢查項目	(14頁)
☐	B型肝炎血液檢查結果	(92頁)
☐	德國麻疹抗體檢測結果	(94頁)
☐	戒菸資訊	(82頁)
☐	孕婦免費愛滋病毒篩檢服務	(106頁)
☐	產前遺傳診斷與補助	(108頁)
☐	女孩男孩一樣好	(118頁)
☐	孕期生活須知	(122頁)
☐	孕期不適處理方式	(126頁)
☐	孕期體重控制與飲食	(132頁)
☐	孕期感染與妊娠合併症	(138頁)
☐	須立即就醫之危險徵兆	(144頁)
☐	母乳哺育、母嬰親善宣導	(170、204頁)

產檢院所：_____
醫師簽名：_____
下次產檢日期：_____
準媽媽簽名：_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកដំបូងដោយខ្លួនឯង

បែបបទកត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកដំបូងដោយខ្លួនឯង
(មានផ្ទៃពោះពេលដំបូង:មានផ្ទៃពោះមិនទាន់គ្រប់១៧សប្តាហ៍ អាយយ៉ាប៊ែលនាទី១២សប្តាហ៍)

ដំបូនមានរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត

- ☐ សំបុដាហ៍ទី១១-១៤អាចធ្វើការពិនិត្យបុរាំជុំវាគសញ្ញាឈាមមុដាយនដៃណាក់កាលមានគភិទី១ (បង់ថ្លៃលេទ្ធផលនការពិនិត្យកត់ត្រានាទំព័រទី២១)។
- ☐ ជួសឈាមពិនិត្យអង់ទីសនៃជម្ងឺកញ្ជ្រិលនិងជម្ងឺសុវាយ (លទ្ធផលនការពិនិត្យកត់ត្រានាទំព័រទ២១)។
- ☐ ជួសឈាមពិនិត្យអង់ទីសនៃជម្ងឺរលាកថ្លើមបុរកទេ B(HBsAg) និងពិនិត្យអង់ទីសនៃ e ជម្ងឺរលាកថ្លើមបុរកទេ B (HBeAg)។កាលវិភាគនការពិនិត្យសូមយាងទៅតាមទំព័រទី១៥(លទ្ធផលនការពិនិត្យកត់ត្រានាទំព័រទ២១)។
- ☐ បរិមាណគាលិកាកុរហាមជាមធ្យម (MCV) គឺជាសចេកុដ៏យាងដ៏សំខាន់សមុរាប់ការពិនិត្យជម្ងឺកង្វះឈាមចូរចងចាំសុំលទ្ធផលពិនិត្យពីវេជ្ជបណ្ឌិត។បុរសិនបីកមុរិតមធ្យមនការពិនិត្យ MCV ទាបជាង៨០នាៈសុវាមីកំត្រូវចាំហាច់ធ្វើការពិនិត្យ។
- ☐ ចំពាៈសុដ្ឋីមានផ្ទៃពោះដលៃសុចិតកុនុងអមួបុរេជម្ងឺទឹកនាមធ្ងុអមៃគ្រាៈថ្ងនាក់ខុពស់សូមធ្វើការពិគ្រាៈជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដាយគបូបីធ្វើការពិនិត្យជាតិសុករកុនុងឈាម កុរាយពាៈទទរ (Fasting plasma glucose, FPG) និងការវិវឌ្ឍន៍ជាតិកុរហាមនឈាម (HbA1C) (គិតថ្លៃ)។
- ☐ ធ្វើការពិនិត្យវីរុសអដេស៍សមុរាប់សុដ្ឋីមានផ្ទៃពោះដាយឥតគិតថ្លៃ។

សបុដាហ៍ទី៦-៨អាចមីលឃើញចង្វាក់បេះដូងរបស់គភិដាយការពិនិត្យអុិលត្រាសាន

សបុដាហ៍ទី៩-១២វិវឌ្ឍន៍អវៈយវៈទាំង5ផ្នុនកែមុខនិងអវៈយវៈសំខាន់

សបុដាហ៍ទី១៣-១៦កូនកុនុងផ្ទៃសុថានភាពនការលូតលាស់របស់គភិ៖

◎ កូនកុនុងផ្ទៃគៃភិកីតជារូបរាងពញលញសូបកែថ្លានិងមានពណ៌ផ្កាឈូកកូនកុនុងផ្ទៃចៃេកមួរិក។

ការអប់រំសុខភាពនិងការណៃនាំ

- ☐ ការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពលេសមុរាល (ទំព័រទី១៥)
- ☐ លទ្ធផលពិនិត្យឈាមជម្ងឺរលាកថ្លើមបុរកទេ B (ទំព័រទី៩៣)
- ☐ លទ្ធផលពិនិត្យអង់ទីសនៃជម្ងឺកញ្ជ្រិល (ទំព័រទ៩៥)
- ☐ ពតិមានទាក់ទងនឹងការផ្ដាច់ហារ (ទំព័រទ៨៣)
- ☐ សវោកមុមពិនិត្យវីរុសអដេស៍ដាយឥតគិតថ្លៃសៃមុរាប់សុរដីមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រទ១០៧)
- ☐ ការពិគ្រាៈជម្ងឺតពូជមុនពលេសមុរាលនិងជំនួយឧបត្ថមុភ (ទំព័រទ១០៩)
- ☐ កូនសុរីកូនបុរសល្អដូចគ្នា (ទំព័រទ១១៩)
- ☐ ចំណាៈដឹងចាំហាច់កុនុងការរស់នៅពលេមានគភ (ទំព័រទ១២៣)
- ☐ វិធីដាៈសុវាយបញ្ហាមិនសួរលខុលួនកុនុងពលេមានគភិ (ទំព័រទ១២៧)
- ☐ ចំណីអាហារនិងការគុរប់គុរងទុមុង៉ន់កុនុងពលេមានគភ (ទំព័រទ១៣៣)
- ☐ ការឆ្លងនិងជម្ងឺបណ្ដាលមកពីការមានគភិកុនុងពលេមានគភិ (ទំព័រទ១៣៩)
- ☐ សញ្ញាគ្រាៈថ្ងនាក់ដលៃចាំហាច់ទៅពុយាហលជាប់នុទាន (ទំព័រទ១៤៥)
- ☐ ការឃាសនាការបំបៅទឹកដាៈមុដាយនឹងទំនាក់ទនងរវាងមុដាយនិងទារក (ទំព័រទី១៧១ ២០៥)

មនុទីរពិនិត្យផ្ទៃពោះ៖_____
ហតុថ្លលខោវេជ្ជបណ្ឌិត៖_____
កាលបរិចុ្ឆទេការពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកក្រាយ៖_____
ហតុថ្លលខោរបស់សុដ្ឋីជាមុដាយ៖_____

第二次產檢自我檢核紀錄

第二次產檢自我紀錄事項
（妊娠第一期：妊娠未滿17週　建議週數：第16週）
※請準媽媽於接受產前檢查前，務必將下列事項及自我檢核紀錄填寫完整

以下是記錄於____年____月____日（懷孕週數第____週）

1. 準媽媽記錄自覺項目：□出血　□腹痛　□頭痛　□痙攣
   □其他自覺徵狀：_____

2. 我已閱讀的衛教資訊

□ 產前檢查項目	(14頁)	□是	□否
□ 戒菸資訊	(82頁)	□是	□否
□ 先天性疾病	(88頁)	□是	□否
□ 孕婦免費愛滋病毒篩檢服務	(106頁)	□是	□否
□ 產前遺傳診斷與補助	(108頁)	□是	□否
□ 菸酒害防制	(112頁)	□是	□否
□ 早產防治	(120頁)	□是	□否
□ 孕期生活須知	(122頁)	□是	□否
□ 孕期不適處理方式	(126頁)	□是	□否
□ 孕期體重控制與飲食	(132頁)	□是	□否
□ 孕期感染與妊娠合併症	(138頁)	□是	□否
□ 須立即就醫之危險徵兆	(144頁)	□是	□否

3. 心情溫度計
   過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？ □是□否
   過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？ □是□否
   註：如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，強烈建議您告訴您的家人或醫師協助。

4. 心情點滴
   家人要叮嚀、鼓勵媽咪的話_____
   _____
   準媽媽要給寶寶的話_____
   _____

5. 此次產檢您想要向醫師詢問的問題或困擾，可記錄於此(如:飲食、運動、生活作息、菸、酒、營養)
   _____
   _____
   _____

註：如果您有勾選上述任何症狀，即可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和寶寶的安全(請參閱第214頁)

您有無吸菸？　□有(請參閱第82頁，**並請戒菸**)　□沒有

在過去一個禮拜內，您在家的時候，有沒有其他人在您的面前吸菸？
□有(請參閱第82頁，**並請家人戒菸**)　□沒有

準媽媽簽名：_____　家人簽名：_____

孕產婦關懷專線 0800-870870

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី២ដោយខ្លួនឯងឯខ្លួនឯង

បុរាណរកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី២ដោយខ្លួនឯង
(មានផ្ទៃពោះរវាងដំបូង:មានផ្ទៃពោះមិនទាន់គ្រប់១៧សប្តាហ៍ អាយយ៉ាប្លែនទី១៦សប្តាហ៍)
ត្រូវបំពេញអាយពញ្ជែលព្យួនបុរការខាងក្រោមនិងការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯង,មុនពេលជួរការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ។

ខាងក្រោមនេះ _____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ (មានផ្ទៃពោះ_____សប្តាហ៍)

១.អ្នកមានផ្ទៃពោះដឹងដោយខ្លួនឯង

☐ ចញ្ចេឈាម ☐ ឈឺពោះ ☐ ឈឺក្បាល ☐ ជំងឺរញ្ជួយខ្លួន
☐ អាការៈដលែខ្លួនយល់ឃើញដទទៃ្ទត:_____

២.ព័ត៌មានអប់រំសុខភាពដលែខ្ញុំហានអាន

☐ បុរការត្រួតពិនិត្យមុនពលេបុរសូត	(ទំព័រទី១៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ព័ត៌មានតមហរី	(ទំព័រទី៨៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ជម្ងឺពីកំណើត	(ទំព័រទី៨៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ សវាកម្មមត្រួតពិនិត្យជំងឺអដេស៍តតគិតថ្លៃសំរាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទី១០៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការត្រួតពិនិត្យនិងជំនួយជំងឺឆ្លងពីគ្រូកូលមុនពលេបុរសូត	(ទំព័រទី១០៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការបង្ការនគែ្រៈថ្នាក់អំពីសុភនិងហរ	(ទំព័រទី១១៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការពារកុំអាយបុរសូតមុនខ	(ទំព័រទី១២១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ គ្រុយល់ដឹងពីជីវភាពនៅពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទី១២៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ វិធីសំរួលនៅពលេមានផ្ទៃពោះមិនស្រួលខ្លួន	(ទំព័រទី១២៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ត្រួតទំងន់និងអាហារនៅពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទី១៣៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ឆ្លងជំងឺនៅពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន	(ទំព័រទី១៣៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ អាការៈគ្រុនថ្នាក់ដលែត្រូវទៅកាន់មន្ទីពទេ្យជាបន្ទាន់	(ទំព័រទី១៤៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ

៣.វាស់កំដៅចិត្ត

ខមែ្ទន,មានអារម្មណ៍មិនល្អអ,ពិបាកចិត្តឬមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអានាគតឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
ខមែ្ទន,តងែតគ្មានអារម្មណ៍កុន្ទុងរឿងផ្សងេៗឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
បទុង្ហមែៈសូមប្រាប់ក្រុមគ្រូសាអ្នកឬសុំជំនួយពីគ្រូពទេ្យ,បុរសិនបីអ្នកមានបញ្ហាទាំង២ដូចខាងលីនេះ។

៤.ចាក់ថ្នាំអារម្មណ៍

សំដីក្រុមគ្រូសាវដាស់ទ្បនលើកទឹកចិត្តអ្នកមុតាយ _____
លសំដីអ្នកមុតាយទៅកាន់កូន _____

៦.បញ្ហានិងកង្វល់ដលែអ្នកចង់សួរគ្រូពទេ្យនៅពលេត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកនេះ,អាចកត់ត្រានៅទីនេះ(ឧ អាហារ,កីឡា,ជីវភាព,រស់នៅ,ហរី,សុភ,ជីវជាតិ)

_____
_____
_____

កត់សំគាល់ : បុរសិនបីអ្នកមានអាការៈដូចខាងលី,បុរហលែជាអ្នកមានផ្ទៃពោះគ្រុនថ្នាក់,សូមសួរគ្រូពទេ្យហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ,ដើមបីសុត្រគិភាពខ្លួនឯងនិងកូន(សូមអានទំព័រទី២១៥)

តីអ្នកជក់ហរីដរែឬទេ? ☐ជក់ (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសូមផ្ទុជាច់ហរី**) ☐ មិនជក់

កុន្ទុងរយៈពលេ១សបុដាហ៍មុន ពលេអ្នកនៅជុទ្ះ តីមាននរណាជក់ហរីនៅមុខអ្នកដរែឬទេ?
☐ មាន (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសំណូមពរឲ្យពួកគជ្ញើជាច់ហរី**) ☐ គ្មាន

ហតុថលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____ ហតុថលខោអាណាពុយាហល_____

បណ្តាញទូរស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់សុរតីមានផ្ទៃពោះនិងបុរសូតកូន 0800-870870

第二次產檢紀錄

第二次產檢檢查紀錄
（妊娠第一期：妊娠未滿17週　建議週數：第16週）

檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週

產前檢查記錄

體重kg _____
血壓mmHg _____
宮底高度cm _____
胎心音(次/分) _____
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現　☐需注意或異常項目

1. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
2. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
3. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
4. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

醫護特別叮嚀：

☐ 15-20週可做第二孕期母血唐氏症篩檢或羊膜穿刺術(均為自費，衛生福利部提供之產前遺傳診斷補助，詳見108頁)(檢查結果記錄於第20頁)

17-20週胎兒生長狀況：

◎ 開始有胎動的感覺，頭部約佔總體長的1/3，骨骼快速發育，手臂與腳成比例，胎兒開始製造胎便。胎兒身長約25公分，體重約250-500公克。

衛教及指導事項

☐ 戒菸資訊 (82頁)
☐ 先天性疾病 (88頁)
☐ 產前遺傳診斷與補助 (108頁)
☐ 菸酒害防制 (112頁)
☐ 女孩男孩一樣好 (118頁)
☐ 早產防治 (120頁)
☐ 孕期不適處理方式 (126頁)
☐ 孕期體重控制與飲食 (132頁)
☐ 孕期感染與妊娠合併症 (138頁)
☐ 須立即就醫之危險徵兆 (144頁)

產檢院所：_____
醫師簽名：_____
下次產檢日期：_____
準媽媽簽名：_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី២

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី២
(មានផ្ទៃពោះរលោងដំបូង:មានផ្ទៃពោះមិនទាន់គ្រប់១៧សប្តាហ៍ អាយយាបល់នៅទី១៦សប្តាហ៍)

កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យ:____ថ្ងៃទី ____ខែ____ឆ្នាំ អាយុគភ៌:សប្តាហ៍ _____ សប្តាហ

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពេលបុរសូត

ទម្ងន់(kg) _____
សម្ពាធឈាម (mmHg) _____
បុរវៃងហាតសុបូន(cm) _____
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទី) _____
ជាតិស្ករក្នុងទឹកនាម _____
ជាតិប្រូតអ៊ីនក្នុងទឹកនាម _____
អាការៈហើម _____
អាការៈរីកសរសៃឈាម _____

លត្ថជលត្រួតពិនិត្យមុនពេលបុរសូត

☐ គ្មានអាការៈពិសេស
☐ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬបុរការមិនបុរក្សាដី
១. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនុទីពទ្យ
២. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនុទីពទ្យ
៣. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនុទីពទ្យ
៤. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនុទីពទ្យ

សម្គាល់៖ បុរសិនមានបីមាសុនាមរបួសមិនដឹងមូលហេតុ ឬសង្ស័យថាទទួលរងអំពីហិង្សាក្នុងគ្រួសារ សូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ពរមទាំងបំពញេតារាងវាយតមូលគ្រៃះថ្នាក់នៃអំពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតសុនិតតវៃាន់ (តារាង TIPVDA សូមមីលទំព័រទី២២៥)

ដាស់ទ្បីនពិសសេរបស់គ្រួពទ្យ

☐ ១៥ដល់ ២០សប្តាហ៍ គឺអាចធ្វើតសេ្តDown តាមរយៈសរ៉ូមមាតាឬចាៈទឹកភ្លាៈនៅក្នុងដំណាក់កាលទីពីរនៃការមានផ្ទៃពោៈ (បុរាក់ចំណាយតួរវចញេដាយខ្លួនឯង, នាយកដ្ឋានសង្គមកិច្ចអានាម័យផ្តល់សវាកម្មពិនិត្យមុនពេលសម្រាលកូនតប៉ែុណ្ណាៈសចេក្តីលំអិតសូមមីលទំព័រ១០៩) (លទ្ធផលនៃការធ្វើតសេ្តត្រូវហានរាយបញ្ជីនៅលីទំព័រ ២១)

សប្តាហ៍ទី១៧-២០កូនកុនុងផ្ទៃសេ្ថានភាពនៃការលូតលាស់របស់គភ៌ៈ

◎ កូនកុនុងផ្ទៃចៃះកមុរីកកុហាលមានបុរវៃង១/៣ផ្ទៃបំនឹងបុរវៃងខ្លួនសរុបឆ្អឹងលូតលាស់លឿនដនៃងជីងមានសមាមាត្រយគូនាចាប់ផ្តើមមានលាមក។កូនកុនុងផ្ទៃមានបុរវៃង២៥cm ទម្ងន់ ២៥០-៥០០g។

បុរការណានាំនិងសុខភាព

☐ ព័តមានតមហារី (ទំព័រទី៨៣)
☐ ជម្ងឺពីកំណើត (ទំព័រទី៨៩)
☐ ការត្រួតពិនិត្យនិងជំនួយជំងឺឆ្លងពីតុរកូលមុនពេលបុរសូត៥៧ (ទំព័រទី១០៩)
☐ ការបង្ការនគ្រៃះថ្នាក់អំពីសុវនិងហារី (ទំព័រទី១១)
☐ កូនបុរុសកូនស្រីលុអដូចគ្នា (ទំព័រទី១១៩)
☐ ការពារកុំអាយបុរសូតមុនខ៣៥ (ទំព័រទី១២១)
☐ វិធីសំរួលនាពលេមានផ្ទៃពោៈមិនសួរលខ្លួន (ទំព័រទី១២៧)
☐ តួរតពិនិត្យទំង់ន់និងរបបអាហារនាពលេមានផ្ទៃពោៈ (ទំព័រទី១៣៣)
☐ ឆ្លងងជំងឺនាពលេមានផ្ទៃពោៈជាមួយនិងកូន (ទំព័រទី១៣៩)
☐ អាការៈគ្រុនៈថ្នាក់ដលៃតួរទៅកាន់មនុទីពទ្យជាបនុទាន់ (ទំព័រទី១៤៥)

មនុទីពទ្យតួរតពិនិត្យផ្ទៃពោៈ_____
លត្ថជលខោតួរតទ្យ_____
ងតៃ្ងរតពិនិត្យលីកក្រាយ_____
ហត្ថជលខោអ្នកមានផ្ទៃពោៈ_____

第三次產檢自我檢核紀錄

第三次產檢自我紀錄事項
（妊娠第二期：妊娠17週未滿29週　建議週數：第20週）
※請準媽媽於接受產前檢查前，務必將下列事項及自我檢核紀錄填寫完整

以下是記錄於____年____月____日（懷孕週數第____週）

1. 準媽媽記錄自覺項目：☐出血　☐腹痛　☐頭痛　☐痙攣
   ☐其他自覺徵狀：_____
2. 我已閱讀的衛教資訊

☐ 戒菸資訊	(82頁)	☐是	☐否
☐ 胎兒超音波篩檢說明	(100頁)	☐是	☐否
☐ 早產防治、高危險妊娠	(120、214頁)	☐是	☐否
☐ 孕期不適處理方式	(126頁)	☐是	☐否
☐ 孕期體重控制與飲食	(132頁)	☐是	☐否
☐ 孕期感染與妊娠合併症	(138頁)	☐是	☐否
☐ 須立即就醫之危險徵兆	(144頁)	☐是	☐否
☐ 母乳哺育	(170頁)	☐是	☐否

3. 心情溫度計
   過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？ ☐是☐否
   過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？ ☐是☐否
   註：如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，強烈建議您告訴您的家人或醫師協助。
4. 心情點滴
   家人要叮嚀、鼓勵媽咪的話_____
   _____
   準媽媽要給寶寶的話_____
   _____
5. 此次產檢您想要向醫師詢問的問題或困擾，可記錄於此(如:飲食、運動、生活作息、菸、酒、營養)
   _____
   _____
   _____

註：如果您有勾選上述任何症狀，即可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和寶寶的安全(請參閱第214頁)

您有無吸菸？　☐有(請參閱第82頁，**並請戒菸**)　☐沒有

在過去一個禮拜內，您在家的時候，有沒有其他人在您的面前吸菸？
☐有(請參閱第82頁，**並請家人戒菸**)　☐沒有

準媽媽簽名：_____　家人簽名：_____

孕產婦關懷專線 0800-870870

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៣ដាយខ្លួនឯង

បុរការភ្ជាប់ត្រាតត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី២ដាយខ្លួនឯង
(អ្នកផ្ទៃពោះវគ្គទី២:មានផ្ទៃពោះ១៧ដល់២៩សប្តាហ៍ អាយុយ៉ាងតិច១៨ឆ្នាំ ឬ២០សប្តាហ៍)
※ត្រូវបំពេញអាយពញលញនូវបុរការខាងក្រោមនិងការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យដាយខ្លួនឯង,មុនពលេធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ។

ខាងក្រាមនេះ _____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ (មានផ្ទៃពោះ_____សប្តាហ៍)

១.អ្នកមានផ្ទៃពោះដឹងដាយខ្លួនឯង

☐ ចញឈាម ☐ ឈឺពោះ ☐ ឈឺក្បាល ☐ ជំងឺរួញខ្លួន
☐ អាការៈដលែខ្លួនយល់ឃើញដទទៃត:_____

២.ព័តមានអប់រំសុខភាពដលែខ្ញុំបានអាន

☐ ព័តមានតមហារី	(ទំព័រទី៨៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការឆ្លងពីពូជតុរកូល	(ទំព័រទ១០១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការពារកុំអាយបុរសូតមុនខ ស្បែតីមានផ្ទៃពោះដលែមានគ្រុៈថ្ងនាក់៥៥	(ទំព័រទី១២១ ២១៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ វិធីសំរួលនាពលេមានផ្ទៃពោះមិនសួលខ្លួន	(ទំព័រទ១២៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ តួរតទំងន់និងអាហារនាពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទ១៣៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ឆ្លងជំងឺនាពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន	(ទំព័រទ១៣៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ អាការៈគ្រុៈថ្ងនាក់ដលែតួរទៅកាន់មន្ទីពទ្យជាបន្ទាន់	(ទំព័រទ១៤៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ បំបៅដោះ	(ទំព័រទ១៧១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ

៣.វាស់កំដៅចិតត

ខមែុន,មានអារមុមណ៍ម៉ងលុអ,ពិបាកចិតតឬមានអារមុមណ៍ថាគ្មានអានាគតឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
ខមែុន,តងែតគ្មានអារមុមណ៍កុនុងរឿងផ្ទសងេៗឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
បនថ្ងមែ : សូមបុរាប់ក្រុមគ្រូសាអ្នកឬសុំជំនួយពីគ្រូពទ្យ,បុរសិនបីអ្នកមានបញ្ហាទាំង២ដូចខាងលីនេះ។

៤.ចាក់ថ្នាំអារមុមណ៍

សំដីក្រុមគ្រូសាវដាស់ទឹនលើកទឹកចិតតអ្នកមតាយ _____
លសំដីអ្នកមតាយទៅកាន់កូន _____

៦.បញ្ហានិងកង្វល់ដលែអ្នកចង់សួរគ្រូពទ្យនាពលេត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកនេះ,អាចកត់ត្រានាទីនេះ(ឧ អាហារ,កីឡា,ជីវភាព,រស់នៅ,ហារី,សុរា,ជីវជាតិ)

_____

_____

_____

កត់សំគាល់ : បុរសិនបីអ្នកមានអាការៈដូចខាងលើ,បុរហលែជាអ្នកមានផ្ទៃពោះគ្រុៈថ្ងនាក់,សូមសួរគ្រូពទ្យហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ,ដើមុបីសុវត្ថិភាពខ្លួននិងកូន(សូមអានទំព័រទី២១៥)

តីអ្នកជក់ហារីដរែឬទ? ☐ជក់ (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសូមផ្ដាច់ហារី**) ☐ មិនជក់

កុនុងរយៈពលេ១សបុដាហ៍មុន ពលេអ្នកនាផ្ទៃ: តីមាននរណាជក់ហារីនាមុខអ្នកដរែឬទ?
☐ មាន (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសំណូមពរឲ្យពួកគផ្ដាច់ដាច់ហារី**) ☐ គ្មាន

ហតុថលខាអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____ ហតុថលខាអាណាពយាបាល_____

បណ្តាញទូរស័ព្ទយកចិតតទុកដាក់សុរតីមានផ្ទៃពោះនិងបុរសូតកូន 0800-870870

第三次產檢紀錄

第三次產檢檢查紀錄
（妊娠第二期：妊娠17週未滿29週　建議週數：第20週）

檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週

產前檢查記錄

體重kg _____
血壓mmHg _____
宮底高度cm _____
胎心音(次/分) _____
胎位 _____
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現　☐需注意或異常項目

1. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
2. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
3. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
4. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

醫護特別叮嚀：

☐ 超音波檢查(因特殊情況無法檢查者可在懷孕第三期檢查）。(檢查報告黏貼於第24頁）。

21-24週胎兒生長狀況：

◎ 胎兒鼻孔會打開，開始練習呼吸。也會聽聲音了，可以跟他說話噢！

衛教及指導事項

☐戒菸資訊 (82頁)
☐胎兒超音波篩檢說明 (100頁)
☐早產防治、高危險妊娠 (120、214頁)
☐孕期不適處理方式 (126頁)
☐孕期體重控制與飲食 (132頁)
☐孕期感染與妊娠合併症 (138頁)
☐須立即就醫之危險徵兆 (144頁)
☐母乳哺育 (170頁)
☐要餵母乳 ☐需要母乳哺育教戰手冊 ☐需要母乳哺育諮詢
☐不餵母乳 ☐需要配方奶指導

產檢院所：_____
醫師簽名：_____
下次產檢日期：_____
準媽媽簽名：_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៣

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៣

(មានផ្ទៃពោះរវាងទី២:មានផ្ទៃពោះ១៧ដល់២៩សប្តាហ៍ អាយុយាប់ល់នាទី២០សប្តាហ៍)

កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យ៖_____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ អាយុគភ៌៖សប្តាហ៍ _____ សប្តាហ

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូត

ទម្ងន់(kg) _____
សម្ពាធឈាម (mmHg) _____
ប្រវែងហត់សុបូន(cm) _____
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទី) _____
កន្ទុលងៃទារក _____
ជាតិសុកក្នុងទឹកនាម _____
ជាតិប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនាម _____
អាការៈហើម _____
អាការៈរីកសរសៃឈាម _____

លត្ថផលត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូត

☐ គ្មានអាការៈពិសេស
☐ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬប្រការមិនប្រក្រតី
១. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួរមមន្ទីពទ្យ
២. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួរមមន្ទីពទ្យ
៣. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួរមមន្ទីពទ្យ
៤. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួរមមន្ទីពទ្យ

សម្គាល់៖ ប្រសិនមានបីមាសុនាមរបួសមិនដឹងមូលហេតុ ឬសង្ស័យថាទទួលរងអំពីហិង្សាក្នុងគ្រួសារ សូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ព្រមទាំងបំពេញតារាងវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃអំពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និតតវ៉ាន់ (តារាង TIPVDA សូមមើលទំព័រទី២២៥)

ដាស់ទ្បឹងពិសេសរបស់គ្រូពេទ្យ

☐ ការពិនិត្យអូលត្រាសាន (សូរដ៏ដែលមិនអាចធ្វើការពិនិត្យដោយសារតែកេរណ៍ពិសេស អាចធ្វើការពិនិត្យនៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣នៃការមានគភ៌)(រហាយការណ៍នៃការពិនិត្យបិទភ្ជាប់នៅទំព័រទី២៥)

សប្តាហ៍ទី២១-២៤កូនក្នុងផ្ទៃស្ថានភាពនៃការលូតលាស់របស់គភ៌

◎ កូនក្នុងផ្ទៃនៃធ្វើមុះរបស់កូនក្នុងផ្ទៃបើកចាប់ផ្តើមរៀនដកដង្ហើម។ក៏ចេះស្តាប់សម្លេងដែរ អាចនិយាយជាមួយកូនបានហើយ!

បុរការណ៍នៃាំនិងសុខភាព

☐ ព័តមានតមហារី (ទំព័រទី៨៣)
☐ បកស្រាយពីការត្រួតពិនិត្យសំលេងទារកក្នុងផ្ទៃ (ទំព័រទី១០១)
☐ ការពារកុំអាយបុរសូតមុនខ សូរតីមានផ្ទៃពោះដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ការបង្ការនៃគ្រោះថ្នាក់អំពីស្តានិងហារី (ទំព័រទី១២១ ២១៥)
☐ វិធីសំរួលនាពលេមានផ្ទៃពោះមិនស្រួលខ្លួន (ទំព័រទី១២៧)
☐ ត្រួតពិនិត្យទំងន់និងរបបអាហារនាពលេមានផ្ទៃពោះទំព័រទី៥១ (ទំព័រទី១៣៣)
☐ ឆ្លងងជំងឺនាពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន (ទំព័រទី១៣៩)
☐ អាការៈគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវទៅកាន់មន្ទីពទ្យជាបន្ទាន់ (ទំព័រទី១៤៥)
☐ បំបៅដោះ (ទំព័រទី១៧១)
☐ ចង់បំបៅដោះ ☐ចង់ហានសៀវភៅបង្រៀនបំបៅដោះ
☐ត្រូវការពត៌មានអំពីការបំបៅដោះ
☐មិនបំបៅដោះ តូរ ☐ណានៃាំអំពីមុសៅទឹកដោះគោ

មន្ទីពទ្យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ_____
លត្ថផលខោគ្រូពទ្យ_____
ងតៃ្រួតពិនិត្យលីកក្រាយ_____
ហត្ថលេខាអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____

第四次產檢自我檢核紀錄

第四次產檢自我紀錄事項
（妊娠第二期：妊娠17週未滿29週　建議週數：第28週）
※請準媽媽於接受產前檢查前，務必將下列事項及自我檢核紀錄填寫完整

以下是記錄於____年____月____日（懷孕週數第____週）

1. 準媽媽記錄自覺項目：☐出血　☐腹痛　☐頭痛　☐痙攣
   ☐其他自覺徵狀：_____
2. 我已閱讀的衛教資訊

☐ 戒菸資訊	(82頁)	☐是	☐否
☐ 胎兒超音波篩檢說明	(100頁)	☐是	☐否
☐ 早產防治、高危險妊娠	(120、214頁)	☐是	☐否
☐ 孕期生活須知	(122頁)	☐是	☐否
☐ 孕期不適處理方式	(126頁)	☐是	☐否
☐ 孕期體重控制與飲食	(132頁)	☐是	☐否
☐ 孕期感染與妊娠合併症	(138頁)	☐是	☐否
☐ 須立即就醫之危險徵兆	(144頁)	☐是	☐否
☐ 產前運動	(154頁)	☐是	☐否
☐ 母乳哺育	(170頁)	☐是	☐否

3. 心情溫度計
   過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？ ☐是☐否
   過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？ ☐是☐否
   註：如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，強烈建議您告訴您的家人或醫師協助。
4. 心情點滴
   家人要叮嚀、鼓勵媽咪的話_____
   _____
   準媽媽要給寶寶的話_____
   _____
5. 此次產檢您想要向醫師詢問的問題或困擾，可記錄於此(如:飲食、運動、生活作息、菸、酒、營養)
   _____
   _____
   _____

註：如果您有勾選上述任何症狀，即可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和寶寶的安全(請參閱第214頁)

您有無吸菸？　☐有(請參閱第82頁，**並請戒菸**)　☐沒有

在過去一個禮拜內，您在家的時候，有沒有其他人在您的面前吸菸？
☐有(請參閱第82頁，**並請家人戒菸**)　☐沒有

準媽媽簽名：_____　家人簽名：_____

孕產婦關懷專線 0800-870870

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៤ដោយខ្លួនឯងឯងយខ្លួនឯង

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៤ដោយខ្លួនឯង
(មានផ្ទៃពោះរលោទី២:មានផ្ទៃពោះ១៧ដល់២៩សប្ដាហ៍ អាយយោបលនាទី២០សប្ដាហ៍)
※ត្រូវបំពេញអាយពញលញនូវបុរការខាងក្រោមនិងការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យដាយខ្លួនឯង,មុនពលធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ។

ខាងក្រោមនេះ _____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ (មានផ្ទៃពោះ_____សប្ដាហ៍)

១.អ្នកមានផ្ទៃពោះដឹងដាយខ្លួនឯង

☐ ចញឈាម ☐ ឈឺពោះ ☐ ឈឺក្បាល ☐ ជំងឺរញខ្លួន
☐ អាការៈដលែខ្លួនយល់ឃើញដទទៀតៈ_____

២.ព័តមានអប់រំសុខភាពដលែខ្ញុំបានអាន

☐ ព័តមានតមហារ៍	(ទំព័រទី៨៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ បកស្រាយពីការត្រួតពិនិត្យសំលងេទារកក្នុងផ្ទៃ	(ទំព័រទី១០១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការពារកុំអាយប្រុសូតមុនខ សែ្អតីមានផ្ទៃពោះដលែមានគ្រោះថ្នាក់៥៥	(ទំព័រទី១២១ ២១៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ គួរយល់ដឹងពីជីវភាពនៅពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទ១២៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ វិធីសំរួលនៅពលេមានផ្ទៃពោះមិនស្រួលខ្លួន	(ទំព័រទី១២៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ត្រួតពិនិត្យទំងន់និងរបបអាហារនៅពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទី១៣៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ឆ្លងងជំងឺនៅពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន	(ទំព័រទ១៣៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ អាការៈគ្រោះថ្នាក់ដលែត្រូវទៅកាន់មនុទីពទ្យជាបនទ្ទាន់	(ទំព័រទី១៤៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការឆ្លងងពីពូជគ្រុកូល	(ទំព័រទី១៥៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ បំហៅដោៈ	(ទំព័រទី១៧១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ

៣.វាស់កំដៅចិត្ត

ខមែុន,មានអារមុមណ៍មិនលុអ,ពិបាកចិត្តឬមានអារមុមណ៍ថាគ្មានអានាគតឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
ខមែុន,តងែតគ្មែានអារមុមណ៍កុន្ទងរឿងផ្ទសងេៗឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
បន្ថមែ : សូមប្រាប់កុរុមគ្រូសាអ្នកឬសុំជំនួយពីគ្រូពទ្យ,បុរសិនបីអ្នកមានបញ្ហាទំង២ដូចខាងលីនេះ។

៤.ចាក់ផ្ដុំអារមុមណ៍

សំដីកុរុមគ្រូសាវដាស់ទឹនលើកទឹកចិត្តអ្នកមុតាយ _____
លសំដីអ្នកមុតាយទៅកាន់កូន _____

៦.បញ្ហានិងកង្វល់ដលែអ្នកចង់សួរគ្រូពទ្យនៅពលេត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកនេះ,អាចកត់ត្រានៅទីនេះ(ឧ អាហារ,កីឡា,ជីវភាព,រស់នៅ,ហារ៍,សុរា,ជីវជាតិ)

_____

_____

_____

កត់សំគាល់ : បុរសិនបីអ្នកមានអាការៈដូចខាងលើ,បុរហលែជាអ្នកមានផ្ទៃពោះគ្រោះថ្នាក់,សូមសួរគ្រូពទ្យហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ,ដើមុបីសុរតុតិភាពខ្លួននិងកូន(សូមអានទំព័រទី២១៥)

តីអ្នកជក់ហារ៍ដរែឬទេ? ☐ជក់ (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសូមផ្ដាច់ចារ៍**) ☐ មិនជក់

កុនុងរយៈពលេ១សប្ដាហ៍មុន ពលេអ្នកនៅផ្ទះ តីមាននរណាជក់ហារ៍នៅមុខអ្នកដរែឬទេ?
☐ មាន (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសំណូមពរឲ្យពួកគផ្ដាច់ចារ៍**) ☐ គ្មាន

ហតុថលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____ ហតុថលខោអាណាពុយាហល_____

បណ្ដាញទូរស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់សុរតីមានផ្ទៃពោះនិងប្រសូតកូន 0800-870870

第四次產檢紀錄

第四次產檢檢查紀錄
（妊娠第二期：妊娠17週未滿29週　建議週數：第28週）

檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週

產前檢查記錄

體重kg _____
血壓mmHg _____
宮底高度cm _____
胎心音(次/分) _____
胎位 _____
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現　☐需注意或異常項目
1. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
2. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
3. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
4. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

醫護特別叮嚀：

☐ 24-28週需要時可做妊娠糖尿病篩檢(自費，檢查結果記錄於第20頁，資訊參閱第30頁)
☐「產前教育課程」。

25-28週胎兒生長狀況：

◎ 皮膚呈紅色皺摺，皮下脂肪開始沉積，有睡眠與活動交替現象，對外界聲音有反應。若在此時生產，因身體發育尚未成熟，故不容易照料。

衛教及指導事項

☐ 戒菸資訊 (82頁)
☐ 胎兒超音波篩檢說明 (100頁)
☐ 早產防治、高危險妊娠 (120、214頁)
☐ 孕期生活須知 (122頁)
☐ 孕期不適處理方式 (126頁)
☐ 孕期體重控制與飲食 (132頁)
☐ 孕期感染與妊娠合併症 (138頁)
☐ 須立即就醫之危險徵兆 (144頁)
☐ 產前運動 (154頁)
☐ 母乳哺育 (170頁)

產檢院所：_____
醫師簽名：_____
下次產檢日期：_____
準媽媽簽名：_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៤

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៤

(មានផ្ទៃពោះរលោទី២:មានផ្ទៃពោះ១៧ដល់២៩សប្ដាហ៍ អាយុយាបល់នាទី២០សប្ដាហ៍)

កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យ៖_____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ អាយុគភ៌៖សប្ដាហ៍ _____ សប្ដាហ

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូត

ទម្ងន់(kg) _____
សម្ពាធឈាម (mmHg) _____
ប្រវែងបាតស្បូន(cm) _____
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទី) _____
កន្លែងទៃរាក _____
ជាតិស្ករក្នុងទឹកនាម _____
ជាតិប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនាម _____
អាការៈហើម _____
អាការៈរីកសរសៃឈាម _____

លត្ថជលត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូត

☐ គ្មានអាការៈពិសេស
☐ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬប្រការមិនប្រក្រដី
១. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវជ្រើមមនុទីពទ្យ
២. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវជ្រើមមនុទីពទ្យ
៣. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវជ្រើមមនុទីពទ្យ
៤. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវជ្រើមមនុទីពទ្យ

សមុគាល់៖ បុរសិនមានបីមាសុនាមរបួសមិនដឹងមូលហេតុ ឬសង្ស័យថាទទួលរងអំពីហិង្សាក្នុងគ្រួសារ សូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ព្រមទាំងបំពេញតារាងវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃអំពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និតតវ៉ាន់ (តារាង TIPVDA សូមមើលទំព័រទី២២៥)

ដាស់ទ្បីនពិសេសរបស់គ្រួពទេយ

☐ សប្ដាហ៍ទី២៤-២៨ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យជម្ងឺទឹកនាមជ្រុះមៃពលេមានគភ៌បុរសិនបីចាំហាច់(បង់ថ្លៃ)។ លទ្ធផលនៃការពិនិត្យកត់ត្រានៅទំព័រទី២១។ ពត៌មានដទៃសូមអានទំព័រទី៣១)
☐ “កម្មវិធីអប់រំមុនពេលសម្រាល”

សប្ដាហ៍ទី២៥-២៨កូនក្នុងផ្ទៃស្ថេរភាពនៃការលូតលាស់របស់គភ៌៖

◎ បកែមានពណ៌ក្រហមជ្រួញចាប់ផ្ដើមមានកំនកខ្លាញ់ក្រាមសុបកែមានការជ្រលាស់បុដ្ឋរវាងដំណកនិងការធ្វើសកម្មភាពនិងមានប្រតិកម្មចំពោះសម្លេងពីខាងក្រៅ។បុរសិនបីសម្រាលក្នុងពេលនេះទារកនឹងពិបាកមីលថែរក្សារាងកាយលូតលាស់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់។

បុរការណៃនាំនិងសុខភាព

☐ ព៌តមានតមហារី (ទំព័រទី៨៣)
☐ បកស្រាយពីការត្រួតពិនិត្យសំលេងទារកក្នុងផ្ទៃ (ទំព័រទី១០១)
☐ ការពារកុំអោយប្រសូតមុនខែ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះដលៃមានគ្រោះថ្នាក (ទំព័រទី១២១ ២១៥)
☐ គ្រួយល់ដឹងពីជីវភាពនៅពេលមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រទី១២៣)
☐ វិធីសុំរួលនៅពេលមានផ្ទៃពោះមិនសុរួលខ្លួន (ទំព័រទី១២៧)
☐ តួរតពិនិត្យទំងន់និងរបបអាហារនៅពេលមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រទី១៣៣)
☐ ឆ្លងជំងឺនៅពេលមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន (ទំព័រទី១៣៩)
☐ អាការៈគ្រោះថ្នាក់ដលៃតួរទៅកាន់មនុទីពទ្យជាបនុទាន់ (ទំព័រទី១៤៥)
☐ ការឆ្លងពីពូជតុកូលី (ទំព័រទី១៥៥)
☐ បំបៅដោះ (ទំព័រទី១៧០)

មនុទីពទ្យតួរតពិនិត្យផ្ទៃពោះ:_____
លត្ថជលខោគ្រួពទេ_____
ងតៃ្ររតពិនិត្យលីកកុរាយ_____
ហត្ថជលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ:_____

第2次孕婦產前健康照護衛教指導記錄表(第29週-第40週)

(懷孕週數，第_____週)【本項服務由菸品健康福利捐補助】　病歷號

基本資料

由準媽媽填寫

姓名		出生日期	_____年____月____日		
身分證字號 (外籍人士護照號碼)					
聯絡地址					
聯絡方式	手機:_____	住家:(　　)-_____			
身高_____公分	懷孕前體重_____公斤	目前體重_____公斤	血色素_____ gm/dl (請填寫第1次產檢的檢驗數值)		

註明：如已接受第一次衛教指導，以上欄位免填

目前是否有接受社會福利補助情況:(可複選)

□0.否，□1.中低收入戶補助，□2.低收入戶補助，□3.特殊境遇家庭補助，□4.兒少生活補助（項目：____；人數：__），□5.其他_____

有下列情況之懷孕婦女:

□1.未婚懷孕婦女，□2.身心障礙懷孕婦女，□3.其他_____

健康行為

1.您目前是否吸菸?

□0.否，□1.偶爾或應酬才吸，□2.平均一天約吸一包菸（20支）以下，□3.平均一天約吸一包菸以上

2.您是否特別注意遠離二手菸的環境？

□0.否，□1.是，□2.週遭環境沒有二手菸

3.您目前是否喝酒?

□0.否，　□1.偶爾或應酬才喝，□2.經常喝

4.您是否嚼檳榔?：

□　0.否，　□1.偶爾或應酬才嚼，□2.經常嚼

5.您是否曾使用毒品?：

□0.否，□1.是

6.心情溫度計：

□是，□否　1.過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？

□是，□否　2.過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？

※本資料將用於衛生福利政策評估，供衛生保健及社政單位關懷訪視服務使用。

□1.同意，□2.不同意。

孕產醫療史

過去是否有相關孕產醫療史

□0.否，□1.是（請於下列□進行勾選）。

□(1)妊娠期高血壓疾病，□(2)前置胎盤，□(3)羊水過多或過少，□(4)胎兒生長限制，□(5)胎盤功能異常，□(6)胎兒體重過重(大於4200gm)，□(7)孕婦本人及一等親屬罹患遺傳疾病，□(8)嚴重合併症：（請於下列□進行勾選）

□8-1心臟病；□8-2腎臟疾病；□8-3血液系統疾病；□8-4肝臟疾病；□8-5活動性肺結核；□8-6妊娠糖尿病；□8-7甲狀腺功能亢進症；□8-8精神病或神經系統疾病；□8-9妊娠合併免疫系統疾病；□8-10卵巢或子宮腫瘤；□8-11孕期感染性疾病；□8-12性傳染病（含愛滋病）；□8-13其他嚴重內外科疾病

□(9)骨盆異常，□(10)子宮、產道異常，□(11)其他

※如有上述孕產醫療史情形，請就診院所提供醫療服務或轉介至中、重度級急救責任醫院。

តារាងកំណត់ត្រាលំណៅនាំការថែទាំសុខភាពមុនពេលសម្រាលរបស់ស្ត្រីមានគភ៌លើកទី២(សប្ដាហ៍ទី២៩-៤០)

(មានផ្ទៃពោះ____សប្ដាហ៍) សរសេរកម្មនេះឧបត្ថម្ភដោយមន្ទីរសុខភាពនិងរបបឧបត្ថម្ភផ្ទាំងដែលខេត្តអ្នកទទួលការពិនិត្យ

ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន

នាមត្រកូល		ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត	______ថ្ងៃទី_____ខែ______ឆ្នាំ
លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (លេខលិខិតឆ្លងដែនដែនបរទេស)			
អសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង:			
វិធីទំនាក់ទំនង	លេខទូរស័ព្ទដៃ:__________________ លេខទូរស័ព្ទផ្ទះ(　　)-__________________		
កំពស់____________ cm	ទម្ងន់មុនពេលមានផ្ទៃពោះ______ kg	ទម្ងន់សព្វថ្ងៃ__________kg	អេម៉ូក្លូប៊ីន ________gm/dl (សូមសរសេរបំពេញចំនួនការពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទីមួយ)

ព័ត៌មានអំពីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

សំគាល់:ប្រសិនបើលោកបានទទួលការណែនាំអត្តគុទេសការអប់រំសុខាភាពរួចមិនបាច់បំពេញនៅក្រលានខាងលើទេ
ស្ថានភាពសព្វថ្ងៃតើមានជំនួយពីក្រសួងសង្គមកិច្ចដែរឬទេ : (អាចជ្រើសរើសដូចគ្នា)
☐ 0.អត់, ☐ ១.ជំនួយចំពោះគ្រួសារចំណូលខ្ពស់មធ្យម, ☐ ២.ជំនួយចំពោះគ្រួសារចំណូលខ្ពស់,
☐ ៣.ជំនួយចំពោះគ្រួសារដែលមាមលក្ខណៈជាពិសេស,☐ ៤. ជំនួយក្នុងជីវភាពរស់នៅយុវវ័យកុមារ, (ប្រភេទ:______; ចំនួនមនុស្ស:__), ☐ ៥ ផ្សេងទៀត____
ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែរមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម:
☐ ១.ស្ត្រីមិនទាន់រៀបការមានផ្ទៃពោះ:, ☐ ២.ស្ត្រីមានភាពពិការមានផ្ទៃពោះ, ☐ ៣.ផ្សេងទៀត_______

ទម្លាប់ជីវភាព

១.សព្វថ្ងៃតើអ្នកមានជក់បារីដែរឬទេ?
☐ 0.អត់, ☐១.យូរម្ដងរីជប់លៀងទីបជក់, ☐ ២.តាមធម្មតាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ (២០ដើម) ចុះទៅ
☐ ៣.តាមធម្មតាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ឡើងទៅ
២.តើអ្នកមានកំណត់សំគាល់ប្រយ័ត្នជៀសវាងបរិស្ថានមានស្រូបផ្សែងបារីដែរឬទេ?
☐ 0.អត់, ☐ ១.មាន, ☐ ២.បរិស្ថានជុំវិញខ្លួនមានស្រូបផ្សែងបារី
៣. សព្វថ្ងៃតើអ្នកមានផឹកស្រាដែរឬទេ?
☐ 0.អត, ☐ ១.យូរម្ដងរីជប់លៀងទីបផឹក, ☐ ២.ឧស្សាហ៍ផឹក
៤.តើអ្នកមានទំពារស្លាម្លូរដែរឬទេ?
☐ 0.អត់, ☐ ១.យូរម្ដងរីជប់លៀងទីបទំពារ, ☐ ២.ឧស្សាហ៍ទំពារ
៥ តើអ្នកមានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដែរឬទេ?
☐ 0.អត់, ☐ ១.មាន
6. ការត្រួតពិនិត្យជំងឺស្ត្រេស
☐ មាន, ☐ អត់ ១.មួយខែទៅម្ដងតើឧស្សាហ៍មានអារម្មណ៍ធ្លាប់ធ្លាក់ទឹកចិត្តស្រួទេសមានអារម្មណ៍គ្មានក្ដីសង្ឃឹមទៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេ?
☐ មាន, ☐ អត ២.មួយខែទៅម្ដងតើឧស្សាហ៍អត់អារម្មណ៍ចំនូលចិត្តឬគ្មានភាពរីករាយក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែរឬទេ?

※ព័តមាននេះនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីវាយតម្លៃគោលនយោបាយសុខុមាលភាពសុខភាពនិងផ្ដល់សេវាចំពោះក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងសង្គមកិច្ចរដ្ឋបនានាតាមតំបន់អោយប្រើប្រាស់។ ☐១.យល់ព្រម ☐២.មិនយល់ព្រម

ប្រវត្តិជំងឺ និងប្រវត្តិសម្ភព

កាលពីមុនផ្លាប់មានប្រវត្តិដែលទាក់ទងការត្រួតពិនិត្យពេលមានផ្ទៃពោះដែរឬទេ
☐0.អត់, ☐១.មាន (សូមនៅខាងក្រោមនេះគូសធីក ☐).
☐(១) មានជំងឺលើសឈាមក្នុងរយៈពេលពពោះ ☐(២) មាត់ស្បូនស្បូន
☐(៣)ទឹកភ្លោះច្រើនពេកឬតិចពេក ☐(៤)ការដាក់កម្រិតការរីកលូតលាស់របស់ទារកក្នុងផ្ទៃ
☐(៥)សុកស្បូនខុសពីធម្មតា ☐(៦) ទារកក្នុងផ្ទៃធ្ងន់លើសទំងន់ (ធំជាង៤២00gm)
☐(៧) ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងសាច់ញាត្តិមានជំងឺចំលងបន្តត្រកូល
☐(៨) ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដោយមានជំងឺបន្ទាប់បន្សំ ☐សូមនៅខាងក្រោមនេះគូសធីក
☐៨-១ ជំងឺបេះដូង ☐៨-២ជំងឺតម្រងនោម ☐៨-3៣ជំងឺឈាម ☐៨-៤ជំងឺថ្លើម
☐៨-៥ជំងឺរបេងសកម្ម ☐៨-៦ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ
☐៨-៧ជំងឺទីរ៉អ ☐៨-៨ជំងឺរិកលចរិកើឈឺប្រព័ន្ធប្រសាទ
☐៨-៩ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះធ្វើអោយប្រព័ន្ធប្រសាទច្របូកច្របល់
☐៨-១០ ជំងឺដុសសាច់ក្រពេញអ៊ូរ៉ែឬស្បូន ☐៨-១១ ពេលមានផ្ទៃពោះមានជំងឺឆ្លងប្រដាប់ភេទ
☐៨-១២ឆ្លងជំងឺកាមរោគ (រួមទាំងជំងឺអេដស៍) ☐៨-១៣ជំងឺរ:កាត់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត
☐(៩) ឆ្អឹងត្រគៀកមិនប្រក្រតី ☐(១០) ស្បូនប្រឡាយកំណើតមិនប្រក្រតេ ☐(១១)ផ្សេងទៀត

※ បើមានស្ថានភាពពេលដែលមានផ្ទៃពោះដូចដែលមានរៀបរាប់ខាងលើសូមត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យឬគ្លីនិចសម្ភពអោយទទួលបន្ទុកធានារ៉ាប់រងពិនិត្យជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ។

衛教主題	重點	準媽媽自我評估 清楚	準媽媽自我評估 不清楚	醫事人員指導重點
1.維持母胎安全(參閱手冊-讓寶寶安全的成長)	早產徵兆	☐	☐	☐ 知道懷孕末期若出現早產之徵兆（陰道出血、腹部悶痛、持續子宮收縮、破水）時，應立即就醫。選擇設有新生兒加護病房的醫院待產或生產。
		☐	☐	☐ 知道本身的健康資料、疾病史及孕產醫療史狀況，如有醫師告知：出現孕產醫療史1至11項之一者，請選擇至就近的中、重度級急救責任醫院接受診治或安胎。
	危害物質	☐	☐	☐ 遠離菸(含二手菸)對母嬰健康之危害(流產、早產、出生低體重)
		☐	☐	☐ 知道酒對母嬰健康之危害(流產、早產、死產、出生低體重、中樞神經異常)。
		☐	☐	☐ 知道檳榔對母嬰健康之危害(流產、早產、死產、出生低體重)。
		☐	☐	☐ 本次懷孕吸菸者，轉介戒菸門診之成效。
2.孕期營養(參閱手冊-吃出健康)	體重控制	☐	☐	☐ 知道孕期體重增加要依孕前體重做適度調整，以增加10-14公斤為宜，並注意增加的速度。
	均衡飲食	☐	☐	☐ 知道優先攝取天然食物，避免攝取加工食品、高油高熱量及空熱量食物(如:含糖飲料)。
3.生產準備計畫(參閱手冊-寶寶的誕生)	多元友善生產	☐	☐	☐ 依準媽媽健康狀況，評估及規劃合宜的生產方式。
		☐	☐	☐ 不選擇無醫療適應症之剖腹生產。
		☐	☐	☐ 知道懷孕生產是正常的生理過程，經由參加產前教育可以協助做生產的準備與因應生產過程的陣痛。
		☐	☐	☐ 知道接近生產期之徵象如：輕鬆感、落紅或現血、陣痛或腰酸、破水(由陰道流出多量液體)、強烈便意感及陣痛之因應
4.母乳哺育(參閱手冊-最貼心的哺育方式)	母乳哺育指導	☐	☐	☐ 知道母乳提供新生兒和嬰兒最佳的營養。 哺餵母乳對母嬰健康有助益(對母親好處為：產後出血少、維持身材、減少罹患卵巢癌及乳癌、自然避孕效果好、降低骨質疏鬆風險； 對嬰兒好處為：營養完整，容易吸收減少腸胃炎，增強免疫力與智力，寶寶不易胖。)
		☐	☐	☐ 知道產後即刻母嬰皮膚接觸及親子同室，可促進乳汁分泌及子宮收縮，減少產後出血及母嬰感染；增進早期親子關係的建立，讓寶寶體溫及情緒穩定，有助於腦部發展。
		☐	☐	☐ 無法哺餵母乳的媽媽，不要給自己太大的壓力，所有的媽媽都願意為寶寶付出，愛寶寶方式有很多種，哺餵母乳是其中的一種，只要能給予充分的愛都是好媽媽。
5.孕期心理適應(參閱手冊-認識產後憂鬱症及防治	孕期心理適應指導	☐	☐	☐ 新手媽媽照顧新生兒時，需利用嬰兒睡眠時，多讓自己的身體獲得適度休息，不要過度疲憊或睡眠不足。
		☐	☐	☐ 可商請其他家人協助分擔家事清潔等勞力工作，及情況許可下每天撥一小段時間外出散步，給自己喘息休息的機會。
		☐	☐	☐ 適度向家人或親朋好友說出感受，尋求幫忙或與其他產後媽媽分享彼此經驗與心情。

※紅框內之欄位，請醫護人員協助準媽媽們於衛教指導前先行填寫，以供醫事人員參考。
※返家後，若有孕產諮詢需求，請多加運用全國免付費孕產婦關懷專線0800-870870或孕產婦關懷網站 http://mammy.hpa.gov.tw。

醫療院所/助產所名稱及代碼	醫師/助產人員簽章： 指導日期____年____月____日	孕婦簽名：

備註：

1. 本衛教指導內容由衛生福利部國民健康署及臺灣婦產科醫學會、臺灣母胎醫學會、臺灣周產期醫學會、臺灣護理學會、臺灣助產學會、及中華民國營養師公會全國聯合會共同研擬。
2. 本次衛教指導之建議指導懷孕週數為29週以上，依孕婦健康需求執行，可搭配第5次（含）至第10次孕婦產檢任一次（補助時程為第3孕期）執行指導，請參閱孕婦健康手冊內容予以衛教。



អនាម័យ ប្រធានបទ	ចំណុចសំខាន់	ការវាយតម្លៃខ្លួនឯងរបស់ម្ដាយ: ច្បាស់លាស់	ការវាយតម្លៃខ្លួនឯងរបស់ម្ដាយ: មិនច្បាស់លាស់	ចំណុចសំខាន់ចង្អុលបង្ហាញដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាល
១. រក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ម្ដាយនិងទារក (ឯកសារយោង- នាំឲ្យទារកធំធាត់ដោយសុវត្ថិភាព)	លក្ខខណ: សម្រាលកូនមុនពេលកំណត់	☐	☐	☐ ប្រសិនបើដឹងថានៅពេលដែលជិតឆ្លងទន្លេមានមុនសញ្ញាអាការៈកើតមុនពេលៗទ្វារមាសហូរឈាមពោះឈឺរលៀឈឺហៀតដល់បីកស្បូនបកែទឹកភ្លោះៗគួរតែយកទៅពេទ្យភ្លាម។ជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យឬគ្លីនិច្ចសម្ភពការថែរក្សាទារកលក្ខខណៈពិសេស។
		☐	☐	☐ ដឹងពីឯកសារសុខភាពរបស់ខ្លួនប្រវត្តិនកៅរឈឺនិងប្រវត្តិស្ថានភាពនៅពេលមានផ្ទៃពោះប្រសិនបីគ្រូពេទ្យប្រាប់ថា :ប្រវត្តិជំងឺរបស់មាតាមានក្នុងចំណោម ១ដល់១១ ចំនុចសូមជ្រើសរើសទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យឬគ្លីនិច្ចសម្ភពដលែនៅជិតលាកអ្នកដីម្បីសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតទារក។
	សារធាតុគ្រោះថ្នាក់	☐	☐	☐ នៅឱ្យឆ្ងាយពីផ្សែងហារី (រួមបញ្ចូលទាំងការហិតផ្សែងហារីដោយការទេះឥទ្ធិពល) មានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពតានិងទារក (រលូតកូនសម្រាលកូនមុនពេលកំណត់កីតមកមានទម្ងន់ស្រាល)
		☐	☐	☐ ដឹងថាស្រាផ្ដើអោយមានគ្រោះថ្នាក់លីសុខភាពមាតានិងទារក ((រលូតកូនសម្រាលកូនមុនពេលកំណត់ទារកស្លាប់កីតមកមានទម្ងន់ស្រាលមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ)។
		☐	☐	☐ ដឹងថាស្លាផ្ដើអោយមានគ្រោះថ្នាក់លីសុខភាពមាតានិងទារក (រលូតកូនសម្រាលកូនមុនពេលកំណត់ទារកស្លាប់កីតមកមានទម្ងន់ស្រាលមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ)។
		☐	☐	☐ អ្នកមានផ្ទៃពោះជាអ្នកជក់ហារីត្រូវប្រឹក្សាទៅផ្នែកពេទ្យាហាលផ្តាច់ហារី។
២. សារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ (សូមមើលសៀវភៅប្រកាន់ដៃ - បរិភោគអាយមានសុខភាពល្អ)	កំណត់ទំងន់	☐	☐	☐ ដឹងថាពេលដលែចាប់មានផ្ទៃពោះដំបូងការឡើងទម្ងន់វាបន្ថែមសមស្របទៅតាមទម្ងន់មុនពេលមានផ្ទៃពោះដោយកីនឡើងតាមរយៈសមស្របគឺ១០ទៅ១៤គីឡូក្រាម និងយកចិត្តទុកដាក់អត្រានកៅរកីនឡើងនេះ។
	របបអាហារមានតុល្យភាព	☐	☐	☐ ដឹងថាត្រូវទទួលទានអាហារបស់ធម្មជាតិជាចំបងជៀសវាងការទទួលទានអាហារកច្ចៃនកៅឡូរីខ្ពស់និងអាហារដលែមានកាឡូរីប្រងេខ្ពស់ទទេ (ឧទាហរណ៍: ភសេជ្ជៈដលែមានជាតិស្ករ)។
៣.ផនែការៀបចំផ្តល់កំណើតកីត (សូមមើលសៀវភៅប្រកាន់ដៃ -ការចាប់កំណើតទារក)	ផ្តល់កំណើតកីតដោយរីករាយនឹងរបៀបធម៌ចំរុះ	☐	☐	☐ ជ្រើសរើសវិធីកីតដោយមើលអាស្រ័យលីសុខភាពម្តាយ។
		☐	☐	☐ មិនជ្រើសផ្នកែវះកាត់ដោយមិនមានការចាំបាច់ពីពេទ្យ។
		☐	☐	☐ ដឹងថាពេលកំពុងមានផ្ទៃពោះរហូតដក់កីតវាមានទៅប្រតិកម្មតាមធម្មជាតិដោយឆ្លងកាត់ការចូលរួមអប់រំមុនសម្រាលកូនអាចជួយសំរួលកាត់បន្ថយក្នុងផ្ទៃការឈឺចាប់នៅពលេសំរាលកូន។
		☐	☐	☐ ដើងដំណាក់កាលដលែជិតកីតមានដូចជាៈអារម្មណ៍នកៅរងោយស្រួលហូរឈាមចុកចង្កេះរើឈឺអូចៗបកែទឹកភ្លោះ(មានហូរទឹកកំអលែចញពីទ្វារមាស) មានអារម្មណ៍ឈឺមិនស្រួលខ្លួនជាខ្លាំង
៤.ការបង្ហាញពីការណែនាំបំបៅដោះកូន(សូមមើលសៀវភៅដៃ - រៀបបំបៅជិតស្និទ្ធបំផុត)	ការបង្ហាញពីការណែនាំបំបៅដោះ កូន	☐	☐	☐ ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់នទឹកដោះម្តាយសំរាប់ទារក។ ការបំបៅដោះកូនមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពមាតានិងទារក (ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ត្រីជាម្តាយៈក្រោយឆ្លងទន្លេរួចការហូរឈាមតិច, ដីម្បីរក្សារាង, ការកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកក្រពេញអូវែនិងជំងឺមហារីកសុដន់, ឥទ្ធិពលនយោដ៏មានប្រសិទ្ធភាពកំណើតធម្មជាតិ, ការកាត់បន្ថយជំងឺពុកឆ្អឹងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ទារកៈវិតាមីនប្រូតអើនពេញលិញ, ស្សរបយកបានយ៉ាងងាយស្រួលកាត់បន្ថយការលោកក្រពះព្វៀនបង្កីនភាពឆ្លាតវៃនិងអង់ទិគ័រការពារខ្លួនទារកនេះមិនការងោយធាត់។)
		☐	☐	☐ ដឹងពីក្រោយឆ្លងទន្លេរួចភ្លាមម្តាយនិងទារកដាក់ចូលបន្ទប់គងេតម្លៃយគ្នា ផ្ដើអោយlactation និងស្បូនកន្ត្រាក់និងកាត់បន្ថយការហូរឈាមក្រោយឆ្លងទន្លេរួចនិងការឆ្លងមរោគមាតា; ផ្ដើអោយមានភាពស្និតស្នាលរវាងឪពុកម្តាយកុមារដូចនេះហើយសីតុណ្ហាភាពរាងកាយទារកនិងស្ថិរភាពអារម្មណ៍, រួមចំណកែជំនួយដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាល។
		☐	☐	☐ មិនអាចបំបៅដោះកូនម្តាយមិនបានផ្តល់ឱ្យដោយខ្លួនឯងជាសម្ពាធខ្លាំងពគេម្តាយទាំងអស់គឺមានឆន្ទៈដីម្បីចំណាយសម្រាប់ទារកមាននិធីជាច្រើនដីម្បីស្រឡាញ់កូនរបស់អ្នក, ការបំបៅដោះកូនគឺជាផ្នកែមួយនព្វែកគដោយរមកហើយដូចជាសចេក្ដីស្រឡាញ់គឺដីម្បីផ្តល់ឱ្យម្ដាយល្អគ្រប់គ្រាន់។
៥. មានផ្ទៃពោះ (សូមមើលសៀវភៅដៃ - តានតឹងក្រោយឆ្លងទន្លេរួចការយាគយល់និងការទប់ស្កាត់	ការមានផ្ទៃពោះការណែនាំការសម្របផ្លូវចិត្ត	☐	☐	☐ ម្តាយថ្មីការថទៅាំសម្រាប់ទារកទីបនឹងកីតដលែចាំហាច់ត្រូវប្រើការគងេរបស់ទារក, អនុញ្ញាតឱ្យរាងកាយរបស់អ្នកឱ្យបានសមរម្យបន្ថមែទៀត, មិនអស់កម្លាំងឬកង្វះនកៅរគងេហូសហេតុ។
		☐	☐	☐ អ្នកអាចស្វសមោជិកគ្រួសារដទទៀតដីម្បីជួយសម្រួលដល់ការចកែរំលកែការងារផ្ទះនិងការងារពលកម្មសមាតនិងកាលៈទេសៈអនុញ្ញាតឱ្យគ្រាន់តច្ចៃរយៈពលេខ្លីមួយចញេសម្រាប់ការដីរជារៀងរាល់ថ្ងៃ, ផ្តល់ឱ្យខ្លួនអ្នកផ្ទាល់នូវឱកាសដីម្បីបំបកែសម្រាកនេះ។
		☐	☐	☐ គួរតទៅប្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភក្តិរបស់អ្នកអោយបានសមស្រប, ស្វងែរកជំនួយឬការចកែរំលកែបទពិសោធន៍និងរបស់អ្នកម្តាយដ៏ទទៀតក្រោយឆ្លងទន្លេរួច។

*ក្រឡានៅក្នុងតារាងពណ៌ក្រហមសូមបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួយស្ដជ្រើជាម្ដាយក្នុងការបំពេញមុនពលេទទួលយកការអប់រំសុខភាពដីម្បីជាពត៌មានយោងសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល។
*ក្រោយពលេត្រលប់មកគហេដ្ឋានវិញប្រសិនបីមានតម្រូវការផ្នកែប្រឹក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការមានផ្ទៃពោះសូមទំនាក់ទំនងខុសទ្វៃរស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់ស្ដជ្រើមានផ្ទៃពោះទូទាំងប្រទេសឥតគិតថ្លៃ 0800-870870 ឬគហេទំព័រhttp://mammy.hpa.gov.tw

ឈ្មោះនិងលខេកូដមន្ទីរពេទ្យ/មន្ទីរសម្ភព	ហត្ថលខោនិងត្រាវជ្ជេបណ្ឌិត/ឆ្មប	ហត្ថលខោស្ដជ្រើមានផ្ទៃពោះ
	កាលបរិច្ឆទេនកៅរបង្រៀនឆ្នាំខថ្ងៃទី ______ថ្ងៃទី ______ខែ______ឆ្នាំ	

ចំណាំ:
១. ការអប់រំសុខភាពមាតិកាការណនៅាំពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពនិងនាយកដ្ឋានសុខភាពជាតិតវៃាន់ស្ត្រីនិងសមាគមពទ្យេរាគស្ត្រី, ការតវៃាន់ពទ្យេមាតា-ទារកសមាគមperinatal តវៃាន់ពទ្យេសមាគមវិទ្យាស្ថាននកៅរថទៅាំតវៃាន់, ឆ្មបសង្គមនកៅះតវៃាន់និងសាធារណរដ្ឋបសមាគមជាតិនអ្នែកឯកទសេខាងចំណីអាហារសហភាពសហបរិយាយ។
២. មគ្គុទសេក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ថាការអប់រំសុខភាពនាំផ្លូវចំនួននសែប្តាហ៍នកៅរមានផ្ទៃពោះ ២៩ សប្តាហ៍ឬច្រើនអាស្រ័យលីការអនុវត្តនតែម្រូវការសុខភាពរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ, វាអាចត្រូវបានប្រើជាមួយនឹងការលីកទី ៥ (រួមបញ្ចូល) ដីម្បីលីកទី ១០ របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការសំរាលកូននៅពលេណាមួយ (ពលេដំណើរការជំនួយឥតសំណងសម្រាប់ត្រីមាសទី3៣) ការប្រតិបត្តិនាំផ្លូវ, មីលសុខភាពរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដលែត្រូវបានសៀវភៅដអ្នែកអប់រំសុខភាព។

第五次產檢自我檢核紀錄

第五次產檢自我紀錄事項
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第32週）
※請準媽媽於接受產前檢查前，務必將下列事項及自我檢核紀錄填寫完整

以下是記錄於____年____月____日（懷孕週數第____週）

1. 準媽媽記錄自覺項目：□出血　□腹痛　□頭痛　□痙攣
   □其他自覺徵狀：_____

2. 我已閱讀的衛教資訊

□	戒菸資訊	(82頁)	□是 □否
□	早產防治、高危險妊娠	(120、214頁)	□是 □否
□	孕期不適處理方式	(126頁)	□是 □否
□	孕期體重控制與飲食	(132頁)	□是 □否
□	孕期感染與妊娠合併症	(138頁)	□是 □否
□	須立即就醫之危險徵兆	(144頁)	□是 □否
□	認識產後憂鬱症	(146頁)	□是 □否
□	產前運動	(154頁)	□是 □否
□	母乳哺育	(170頁)	□是 □否
□	產前用品準備	(186頁)	□是 □否

3. 心情溫度計
   過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？ □是□否
   過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？ □是□否
   註：如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，強烈建議您告訴您的家人或醫師協助。

4. 心情點滴
   家人要叮嚀、鼓勵媽咪的話_____
   _____
   準媽媽要給寶寶的話_____
   _____

5. 此次產檢您想要向醫師詢問的問題或困擾，可記錄於此(如:飲食、運動、生活作息、菸、酒、營養)
   _____
   _____
   _____

註：如果您有勾選上述任何症狀，即可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和寶寶的安全(請參閱第214頁)

您有無吸菸？　□有(請參閱第82頁，**並請戒菸**)　□沒有

在過去一個禮拜內，您在家的時候，有沒有其他人在您的面前吸菸？
□有(請參閱第82頁，**並請家人戒菸**)　□沒有

準媽媽簽名：_____　家人簽名：_____

孕產婦關懷專線 0800-870870

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៥ដោយខ្លួនឯង

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៥ដោយខ្លួនឯង
(មានផ្ទៃពោះរំលោភ:មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍ អាយុយាប់លើនាទី៣២សប្តាហ៍)
ត្រូវបំពេញអាយពញ្ចេលញ្ចើនបុរការខាងក្រោមនិងការកត្ត្រាត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯង,មុនពេលជួការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ។

ខាងក្រោមនេះ _____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ (មានផ្ទៃពោះ_____សប្តាហ៍)

១.អ្នកមានផ្ទៃពោះដឹងដោយខ្លួនឯង

☐ ចញ្ចេឈាម ☐ ឈឺពោះ ☐ ឈឺក្បាល ☐ ជំងឺរញ្ជួយខ្លួន
☐ អាការៈដទៃខ្លួនយល់ឃើញដទៃទៀត៖_____

២.ព័តមានអប់រំសុខភាពដទៃខ្ញុំហានអាន

☐ ព័តមានតមហារី	(ទំព័រទី៨៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការពារកុំអាយបុរសួតមុនខស្ទែរតីមានផ្ទៃពោះដទៃមានគ្រុៈថ្នាក	(ទំព័រទី១២៣ ២១៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ វិធីសំរួលនាពលេមានផ្ទៃពោះមិនស្រួលខ្លួន	(ទំព័រទី១២៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ត្រួតទំងន់និងអាហារនាពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទី១៣៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ឆ្លងជំងឺនាពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន	(ទំព័រទី១៣៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ អាការៈគ្រុៈថ្នាក់ដលែត្រូវទៅកាន់មន្ទីពទេយជាបន្ទាន	(ទំព័រទ១៤៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ តានតឹងក្រាយឆ្លងទន្លេរួចការយាគយល	(ទំព័រទី១៤៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការឆ្លងពីពូជតុរកូល	(ទំព័រទី១៥៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ បំហៅដារៈ	(ទំព័រទី១៧១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ រៀបចំតវ៉ាន់ប្រីបក្រាស់មុនពលេបុរសួត	(ទំព័រទី១៨៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ

៣.វាស់កំដៅចិត្តត

ខមែុន,មានអារមុមណ៍មិនលុអ,ពិបាកចិត្តឬមានអារមុមណ៍ថាគ្មានអានាគតឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
ខមែុន,តងែតគ្មានអារមុមណ៍កុនុងរឿងផ្សងេៗឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
បន្ទមែ ៖ សូមបុរាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកឬសុំជំនួយពីគ្រូពទេយ,បុរសិនបីអ្នកមានបញ្ហាទាំង២ដូចខាងលើនេះ។

៤.ចាក់ជូនាំអារមុមណ៍

សំដីកុរុមគ្រួសារដាស់ទឿនលើកទឹកចិត្តអ្នកមុតាយ _____
លសំដីអ្នកមុតាយទៅកាន់កូន _____

៦.បញ្ហានិងកង្វល់ដលែអ្នកចង់សួរគ្រូពទេយនាពលេត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកនេះ,អាចកត់ត្រានាទីនេះ(ឧ អាហារ,ក៏ឡា,ជីវភាព,រស់នៅ,ហារី,សុរា,ជីវជាតិ)

_____
_____
_____

កត់សំគាល់ : បុរសិនបីអ្នកមានអាការៈដូចខាងលើ,បុរហលែជាអ្នកមានផ្ទៃពោះគ្រុៈថ្នាក់,សូមសួរគ្រូពទេយហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ,ដើមុបីសុរត្ថិភាពខ្លួននិងកូន(សូមអានទំព័រទី២១៥)
តីអ្នកជក់ហារីដរែឬទេ? ☐ជក់ (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសូមផ្ដាច់ចារ**ី) ☐ មិនជក់
កុនុងរយៈពលេ១សប្ដាហ៍មុន ពលេអ្នកនាផ្ទៃ: តីមាននរណាជក់ហារីនាមុខអ្នកនដរែឬទេ?
☐ មាន (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសំណូមពរឲ្យពួកគផ្ដេាច់ចារ**ី) ☐ គ្មាន
ហតុចលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____ ហតុចលខោអាណាពុយាហាល_____

បណ្តាញទូរស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់សុរតីមានផ្ទៃពោះនិងបុរសួតកូន 0800-870870

第五次產檢紀錄

第五次產檢檢查紀錄
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第32週）

檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週

產前檢查記錄

體重kg _____
血壓mmHg _____
宮底高度cm _____
胎心音(次/分) _____
胎位 _____
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現　☐需注意或異常項目
1. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
2. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
3. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
4. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

醫護特別叮嚀：

☐ 抽血檢驗梅毒檢查(檢查結果記錄於第20頁)
☐ 未於妊娠第一期抽血檢驗B型肝炎表面抗原(HBsAg)、B型肝炎e抗原(HBeAg)時，應於本次檢查，檢查時程請參閱第14頁(檢查結果記錄於第20頁)。

29-32週胎兒生長狀況：

◎ 皮膚較少皺摺，長出指甲，眼瞼可張開，胎兒的活動力更強。

衛教及指導事項

☐ 戒菸資訊 (82頁)
☐ 早產防治、高危險妊娠 (120、214頁)
☐ 孕期不適處理方式 (126頁)
☐ 孕期體重控制與飲食 (132頁)
☐ 孕期感染與妊娠合併症 (138頁)
☐ 須立即就醫之危險徵兆 (144頁)
☐ 認識產後憂鬱症 (146頁)
☐ 產前運動 (154頁)
☐ 母乳哺育 (170頁)
☐ 產前用品準備 (186頁)

產檢院所：_____
醫師簽名：_____
下次產檢日期：_____
準媽媽簽名：_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៤

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៤
(មានផ្ទៃពោះរវាលទី៣:មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍ អាយុយាបល់នាទី១៦សប្តាហ៍)

កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យ៖_____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ អាយុគភ៌៖សប្តាហ៍ _____ សប្តាហ

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពេលបុរសូត

ទម្ងន់(kg) _____
សម្ពាធឈាម (mmHg) _____
បុរវែងហាតសុបូន(cm) _____
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទី) _____
កន្ទុលងៃទារក _____
ជាតិស្ករកន្លងទឹកនាម _____
ជាតិប្រូតអ៊ីនកន្លងទឹកនាម _____
អាការៈហើម _____
អាការៈរីកសរសៃឈាម _____

លត្ថផលត្រួតពិនិត្យមុនពេលបុរសូត

☐ គ្មានអាការៈពិសេស
☐ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬបុរការមិនបុរក្រដី
១. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនទ្ទីពទ្យ
២. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនទ្ទីពទ្យ
៣. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនទ្ទីពទ្យ
៤. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនទ្ទីពទ្យ

សម្គាល់៖ បុរសិនមានបីមាសុនាមរបួសមិនដឹងមូលហាតុ ឬសង្ស័យថាទទួលរងអំពីហិង្សាក្នុងគ្រួសារ សូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ព្រមទាំងបំពេញតារាងវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃអំពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និតតវ៉ាន់ (តារាង TIPVDA សូមមើលទំព័រទី២២៥)

ដាស់ឡឹនពិសេសរបស់គ្រួរទេយ

☐ ជួសឈាមពិនិត្យជម្ងឺសុវ៉ាយ(លទ្ធផលនៃការពិនិត្យកត់ត្រានាទំព័រទី២១)
☐ បុរសិនបីកុន្លងដំណាក់កាលមានគភ៌ទី១មិនទាន់ហានជួសឈាមពិនិត្យ អង់ទីសនៃផ្ទៃនៃដៃម្ងឺរលាកថ្លើមបុរភទេ B (HBsAg) និង អង់ទីសនៃe នដៃម្ងឺរលាកថ្លើមបុរភទេ B(HBeAg) នាៈគបុបីធ្វើការពិនិត្យកុន្លងលីកនៈ។ កាលវិភាគនៃការពិនិត្យសូមអានទំព័រទី១៥ (លទ្ធផលនៃការពិនិត្យកត់ត្រានាទំព័រទី២១)។

២៩-៣២ ស បុតា ហ៍ ទារក កុន្លង ផ្ទៃៈសុថានភាព ការ លូតលាស់

◎ បកែ ជ្រួញ តិច ជាង មុន , ការីកលូតលាស់កុរចកដៃ តុរបកភ្លឺនកែ អាច បីក ទារក កុន្លងផ្ទៃសែកម្ងមភាព របស់ ទារក រឹង មាំ ។

បុរការណៃនាំនិងសុខភាព

☐ ព័តមានតមហារ (ទំព័រទី៨៣)
☐ ការពារកុំអាយបុរសូតមុនខៃ សុរតីមានផ្ទៃពោះដលៃមានគុរៈថ្នាក (ទំព័រទី១២១ ២១៥)
☐ វិធីសំរួលនាពលេមានផ្ទៃពោះមិនស្ទួលខុលួន (ទំព័រទី១២៧)
☐ តួរតពិនិត្យទំងន់និងរបបអាហារនាពលេមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រទី១៣៣)
☐ ឆុលងជំងឺនាពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន (ទំព័រទ១៣៩)
☐ អាការៈគុរៈថ្នាក់ដលៃតួរទៅកាន់មនុទ្ទីពទ្យជាបនុទាន់ (ទំព័រទី១៤៥)
☐ តានតឹងកុរាយឆុលងទន្ទលដួចការយោគយល (ទំព័រទី១៤៧)
☐ ការឆុលងពីពូជតុរកូល (ទំព័រទី១៥៥)
☐ បំបៅដោ: (ទំព័រទី១៧១)
☐ រៀបចំតវ៉ាន់បុរីបុរាស់មុនពេលបុរសូត (ទំព័រទី១៨៧)

មនុទ្ទីពទ្យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ_____
លត្ថលខោគ្រួរទេ_____
ងតៃ្រួតពិនិត្យលីកកុរាយ_____
ហត្ថលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____

第六次產檢自我檢核紀錄

第六次產檢自我紀錄事項
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第34週）
※請準媽媽於接受產前檢查前，務必將下列事項及自我檢核紀錄填寫完整

以下是記錄於____年____月____日（懷孕週數第____週）

1. 準媽媽記錄自覺項目：☐出血　☐腹痛　☐頭痛　☐痙攣
   ☐其他自覺徵狀：_____

2. 我已閱讀的衛教資訊

☐ 戒菸資訊	(82頁)	☐是	☐否
☐ 早產防治、高危險妊娠	(120、214頁)	☐是	☐否
☐ 孕期體重控制與飲食	(132頁)	☐是	☐否
☐ 孕期感染與妊娠合併症	(138頁)	☐是	☐否
☐ 須立即就醫之危險徵兆	(144頁)	☐是	☐否
☐ 認識產後憂鬱症	(146頁)	☐是	☐否
☐ 產前運動	(154頁)	☐是	☐否
☐ 母乳哺育	(170頁)	☐是	☐否
☐ 產前用品準備	(186頁)	☐是	☐否

3. 心情溫度計
   過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？ ☐是☐否
   過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？ ☐是☐否
   註：如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，強烈建議您告訴您的家人或醫師協助。

4. 心情點滴
   家人要叮嚀、鼓勵媽咪的話_____
   _____
   準媽媽要給寶寶的話_____
   _____

5. 此次產檢您想要向醫師詢問的問題或困擾，可記錄於此(如:飲食、運動、生活作息、菸、酒、營養)
   _____
   _____
   _____

註：如果您有勾選上述任何症狀，即可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和寶寶的安全(請參閱第214頁)

您有無吸菸？　☐有(請參閱第82頁，**並請戒菸**)　☐沒有

在過去一個禮拜內，您在家的時候，有沒有其他人在您的面前吸菸？
☐有(請參閱第82頁，**並請家人戒菸**)　☐沒有

準媽媽簽名：_____　家人簽名：_____

孕產婦關懷專線 0800-870870

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៦ដាយខ្លួនឯង

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៦ដាយខ្លួនឯង
(មានផ្ទៃពោះរលោមមានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍ អាយុយ៉ាប៉ាលនាទី៣៥សប្តាហ៍)
ត្រូវបំពេញអាយពញ្ចេលញ្ចើនបុរការខាងក្រាមនិងការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យដាយខ្លួនឯង,មុនពលេជួការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ។

ខាងក្រាមនេះ _____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ (មានផ្ទៃពោះ_____សប្តាហ៍)

១.អ្នកមានផ្ទៃពោះដឹងដាយខ្លួនឯង

☐ ចញ្ចេឈាម ☐ ឈឺពោះ ☐ ឈឺក្បាល ☐ ជំងឺរួញខ្លួន
☐ អាការៈដលែខ្លួនយល់ឃើញដទទៀតៈ_____

២.ព័តមានអប់រំសុខភាពដលែខ្ញុំបានអាន

☐ ព័តមានតមហារី	(ទំព័រទី៨៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការពារកុំអាយបុរសួតមុនខែ សួរតីមានផ្ទៃពោះដលែមានគុរៈថ្លៃនាក់	(ទំព័រទី១២១ ២១៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ត្រួតពិនិត្យទំង់និងរបបអាហារនាពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទី១៣៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ឆ្លងជំងឺនាពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន	(ទំព័រទី១៣៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ អាការៈគុរៈថ្លៃនាក់ដលែត្រូវទៅកាន់មន្ទីរទេ្យជាបន្ទាន់	(ទំព័រទី១៤៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ តានតឹងក្រាយឆ្លងទន្លេរួចការយោគយល់	(ទំព័រទី១៤៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការឆ្លងពីពូជតុ្រកូលទ	(ទំព័រទី១៥៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ បំបៅដោៈ	(ទំព័រទី១៧១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ រៀបចំតាំង់ប្រីបុ្រាស់មុនពលេបុរសួត	(ទំព័រទី១៨៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ

៣.វាស់កំដៅចិត្តត

ខមែុន,មានអារមុមណ៍មិនលុអ,ពិបាកចិត្តតឬមានអារមុមណ៍ថាគុមានអានាគតឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
ខមែុន,តងែតគុមានអារមុមណ៍កុនុងរឿងផ្ទុសងេ្វឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
បនុច់មែសូមបុរាប់កុរុមគ្រួសារអ្នកឬសុំជំនួយពីគ្រូពទេ្យ,បុរសិនបីអ្នកមានបញ្ហាទាំង២ដូចខាងលើនេះ។

៤.ចាក់ថ្នាំអារមុមណ៍

សំដីកុរុមគ្រួសារដាស់ទឿនលើកទឹកចិត្តអ្នកមុតាយ _____
លសំដីអ្នកមុតាយទៅកាន់កូន _____

៦.បញ្ហានិងកង្វល់ដលែអ្នកចង់សួរគ្រូពទេ្យនាពលេត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកនេះ,អាចកត់ត្រានាទីនេះ(ឧ អាហារ,កីឡា,ជីវភាព,រស់នៅ,ហារី,សុរា,ជីវជាតិ)

_____
_____
_____

កត់សគាល់ : បុរសិនបីអ្នកមានអាការៈដូចខាងលើ,បុរហលែជាអ្នកមានផ្ទៃពោះគុរៈថ្លៃនាក់,សូមសួរគ្រូពទេ្យហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ,ដើមុបីសុរតុតិភាពខុលួននិងកូន(សូមអានទំព័រទី២១៥)

តីអ្នកជក់ហារីដរែឬទេ? ☐ជក់ (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសូមផ្ទុជាច់ហារី**) ☐ មិនជក់

កុនុងរយៈពលេ១សប្តាហ៍មុន ពលេអ្នកនៅផ្ទះ តីមាននរណាជក់ហារីនៅមុខអ្នកដរែឬទេ?
☐ មាន (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសំណូមពរឲ្យពួកគផ្ទេជាច់ហារី**) ☐ គុមាន

ហតុថលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____ ហតុថលខោអាណាពុយាហល_____

បណ្តាញទូរស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់សុរតីមានផ្ទៃពោះនិងបុរសួតកូន 0800-870870

第六次產檢紀錄

第六次產檢檢查紀錄
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第34週）

檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週

產前檢查記錄

體重kg _____
血壓mmHg _____
宮底高度cm _____
胎心音(次/分) _____
胎位 _____
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現　☐需注意或異常項目
1. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
2. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
3. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
4. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

醫護特別叮嚀：

☐ 您做過超音波檢查了嗎？（因特殊情況無法檢查者可在懷孕第三期檢查）。（檢查報告黏貼於第24頁）

☐ 您做過免費孕婦愛滋病毒篩檢嗎?如果沒有，可以免費接受篩檢。

胎兒生長狀況：

◎ 八個月大的胎兒手腳更有力了，時常會在媽媽的肚子裡拳打腳踢。此外，胎兒大致已是頭部朝下的姿勢。

衛教及指導事項

☐戒菸資訊 (82頁)
☐早產防治、高危險妊娠 (120、214頁)
☐孕期體重控制與飲食 (132頁)
☐孕期感染與妊娠合併症 (138頁)
☐須立即就醫之危險徵兆 (144頁)
☐認識產後憂鬱症 (146頁)
☐產前運動 (154頁)
☐產前用品準備 (186頁)
☐母乳哺育 (170頁)
☐要餵母乳 ☐需要母乳哺育教戰手冊 ☐已有上述手冊 ☐需要母乳哺育諮詢
☐不餵母乳 ☐需要配方奶指導

產檢院所：_____
醫師簽名：_____
下次產檢日期：_____
準媽媽簽名：_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៦

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៦
(មានផ្ទៃពោះរលោទី៣:មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍ អាយយាបល់នាទី៣៤សប្តាហ៍)

កាលបរិច្ឆទទេនការពិនិត្យ:_____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ អាយុគភ៌:សប្តាហ៍ _____ សប្តាហ

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពលេបុរសូត

ទម្ងន់(kg) _____
សម្ពាធឈាម (mmHg) _____
បុរវែងហាតសូបូន(cm) _____
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទី) _____
កន្ទុលងៃទារក _____
ជាតិស្ករកុនុងទឹកនាម _____
ជាតិប្រូតអ៊ីនកុនុងទឹកនាម _____
អាការ:ហើម _____
អាការ:រីកសរសៃឈាម _____

លត្ថផលត្រួតពិនិត្យមុនពលេបុរសូត

☐ គ្មានអាការ:ពិសេស
☐ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬបុរការមិនបុរក្រដី
១. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួរមមនុទីពទ្យ
២. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួរមមនុទីពទ្យ
៣. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួរមមនុទីពទ្យ
៤. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួរមមនុទីពទ្យ

សម្គាល់: បុរសិនមានបីមាសុនាមរបួសមិនដឹងមូលហតុ ឬសង្ស័យថាទទួលរងអំពីហិង្សាកុនុងគ្រួសារ សូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ពុរមទាំងបំពញតារាងវាយតមូលគ្រោះថ្នាក់នៃអំពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតសុនិតតវ៉ាន់ (តារាង TIPVDA សូមមីលទំព័រទី២២៥)

ដាស់ឡនពិសសេរបស់គ្រូពទ្យ

☐ តីអ្នកធ្លាប់ពិនិត្យអ្នលតុ្រាសានដរែឬទ?
(សុដ្ឋរមិនអាចធ្វើការពិនិត្យដាយកណើពិសសេ អាចធ្វើការពិនិត្យកុនុងដំណាក់កាលទី៣ននការមានគភ៌)។(របាយការណ៍ននការពិនិត្យបិទតុជាប់នាទំព័រទី២៥)
☐ អ្នកហានធ្វើការតាមដានមរោគអដេស៍ដាយសមីនសែតុរីមានផ្ទៃពោះ?
បុរសិនបីមិនហាន, អ្នកអាចទទួលហានការចាក់បញ្ចាំងដាយឥតគិតថ្លៃ។

ទារកកុនុងផ្ទៃស្ថិតានភាពការីកលូតលាស់

◎ ទារក បុរាំបី ខែ ទារក កុនុង ផ្ទៃដៃជើងធ្លើចលនា កាន់ តែ ចុរិន ហើយ ជា ញឹកញាប់ ទាត់ កុនុង ពះ មុដាយ ។លើស ពី នះ ទៀត ទារក កុនុង ផ្ទៃ តែ្រវ ហាន គេ ទីតាំង បុរហែល ដើម ចុះ ។

បុរការណ៍នាំនិងសុខភាព

☐ ព័តមានតមហារី (ទំព័រទី៨៣)
☐ ការពារកុំអាយបុរសូតមុនខែ សុរតីមានផ្ទៃពោះដលែមានគុភ:ចុនាក់ (ទំព័រទី១២១ ២១៥)
☐ តួរតពិនិត្យទំង់និងរបបអាហារនាពលេមានផ្ទៃពោះ: (ទំព័រទី១៣៣)
☐ ឆុលងជំងឺនាពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន (ទំព័រទី១៣៩)
☐ អាការ:គុភ:ចុនាក់ដលែតួរទៅកាន់មនុទីពទ្យជាបនុទាន (ទំព័រទី១៤៥)
☐ តានតឹងកុភាយឆុលងទនុលរួចការយោគយល់ (ទំព័រទី១៤៧)
☐ ការឆុលងពីពូជតុរកូល (ទំព័រទី១៥៥)
☐ រៀបចំតាង់ប្ុរីបុភាស់មុនពលេបុរសូត (ទំព័រទី១៨៧)
☐ បំហៅដា: (ទំព័រទី១៧១)

☐ចង់បំហៅដា: ☐សៀវតៅបងៀនបំហៅដា:
☐មានសៀវតៅដូចខាងលីហើយ
☐តួរការពត៌មានបំហៅដា:
☐មិនបំហៅដា: ☐តួរការការណៃនាំអំពីមុសាទឹកដា:គា

មនុទីពទ្យតួរតពិនិត្យផ្ទៃពោះ:_____
លត្ថផលខោតួរពទ្យ_____
ងតៃ្ររតពិនិត្យលីកកុភាយ_____
ហតុផលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ:_____

第七次產檢自我檢核紀錄

第七次產檢自我紀錄事項
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第36週）
※請準媽媽於接受產前檢查前，務必將下列事項及自我檢核紀錄填寫完整

以下是記錄於____年____月____日（懷孕週數第____週）

1. 準媽媽記錄自覺項目：□出血　□腹痛　□頭痛　□痙攣
   □其他自覺徵狀：_____

2. 我已閱讀的衛教資訊

□ 戒菸資訊	(82頁)	□是	□否
□ 孕婦乙型鏈球菌篩檢說明	(96頁)	□是	□否
□ 早產防治、高危險妊娠	(120、214頁)	□是	□否
□ 孕期體重控制與飲食	(132頁)	□是	□否
□ 孕期感染與妊娠合併症	(138頁)	□是	□否
□ 須立即就醫之危險徵兆	(144頁)	□是	□否
□ 認識產後憂鬱症	(146頁)	□是	□否
□ 產前運動	(154頁)	□是	□否
□ 新生兒篩檢	(160頁)	□是	□否
□ 母乳哺育	(170頁)	□是	□否
□ 產前用品準備	(186頁)	□是	□否
□ 認識生產方式	(188頁)	□是	□否

3. 心情溫度計
   過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？ □是□否
   過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？ □是□否
   註：如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，強烈建議您告訴您的家人或醫師協助。

4. 心情點滴
   家人要叮嚀、鼓勵媽咪的話_____
   _____
   準媽媽要給寶寶的話_____
   _____

5. 此次產檢您想要向醫師詢問的問題或困擾，可記錄於此(如:飲食、運動、生活作息、菸、酒、營養)
   _____
   _____
   _____
   註：如果您有勾選上述任何症狀，即可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和寶寶的安全(請參閱第214頁)

您有無吸菸？　□有(請參閱第82頁，**並請戒菸**)　□沒有

在過去一個禮拜內，您在家的時候，有沒有其他人在您的面前吸菸？
□有(請參閱第82頁，**並請家人戒菸**)　□沒有

準媽媽簽名：_____　家人簽名：_____

孕產婦關懷專線 0800-870870

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៧ដាយខ្លួនឯង

បុរការកត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៧ដាយខ្លួនឯង
(មានផ្ទៃពោះរំលោភ:មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍ អាយុយាប់លើសពីទី៣៤សប្តាហ៍)
ត្រូវបំពេញអាយពញ្ចេលញ្ចើនរបុរការខាងក្រាមនិងការកត្ត្រាការត្រួតពិនិត្យដាយខ្លួនឯង,មុនពលេជួការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ។

ខាងក្រាមនេះ _____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ (មានផ្ទៃពោះ_____សប្តាហ៍)

១.អ្នកមានផ្ទៃពោះដឹងដាយខ្លួនឯង

☐ ចញ្ចេឈាម ☐ ឈឺពោះ ☐ ឈឺក្បាល ☐ ជំងឺរួញខ្លួន
☐ អាការៈដលែខ្លួនយល់ឃើញដទទៃតៈ_____

២.ព័តមានអប់រំសុខភាពដលែខ្ញុំបានអាន

☐ ព័តមានតមហារី	(ទំព័រទី៨៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ សចេក្តីនែនាំសុតីអំពីហាក់តធីបុរេតទេទី២ដលែបណ្តាលអាយសុត្តីមានផ្ទៃពោះឆ្ងលងជំងឺ	(ទំព័រទី៩៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការពារកុំអាយបុរសូតមុនខ ែសុរតីមានផ្ទៃពោះដលែមានគ្រៈថ្ងនាក	(ទំព័រទី១២១ ២១៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ត្រួតពិនិត្យទំងន់និងរបបអាហារនៅពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទី១៣៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ឆ្ងលងជំងឺនៅពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន	(ទំព័រទី១៣៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ អាការៈគ្រៈថ្ងនាក់ដលែត្រូវទៅកាន់មនុទីពទ្យេជាបនុទាន់	(ទំព័រទី១៤៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ តានតឹងក្តាយឆ្ងលងទនុលរួចការយាគយល់	(ទំព័រទី១៤៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការឆ្ងលងពីពូជតុរកូល	(ទំព័រទី១៥៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ត្រួតពិនិត្យទារកថ្មី	(ទំព័រទី១៦១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ បំបៅដោះ	(ទំព័រទី១៧១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ រៀបចំតវាន់បុរីបុរាស់មុនពលេបុរសូត	(ទំព័រទី១៨៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ សុគាល់ពិធីបង្កើត	(ទំព័រទី១៨៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ

៣.វាស់កំដៅចិត្តត

ខមែុន,មានអារមុមណ៍មិនលុអ,ពិហាកចិត្តឬមានអារមុមណ៍ថាគុមានអានាគតឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
ខមែុន,តងែតគែមានអារមុមណ៍កុនុងរឿងផ្តសងេៗឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
បនុថមែ : សូមបុរាប់កុរុមគ្រួសារអ្នកឬសុំជំនួយពីគ្រូពទេ្យ,បុរសិនបីអ្នកមានបញ្ហាទាំង២ដូចខាងលើនេះ។

៤.ចាក់ថ្នាំអារមុមណ៍

សំដីកុរុមគ្រួសារដាស់ទឿនលើកទឹកចិត្តអ្នកមុតាយ _____
លសំដីអ្នកមុតាយទៅកាន់កូន _____

៦.បញ្ហានិងកង្វល់ដលែអ្នកចង់សួរគ្រូពទេ្យនៅពលេត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកនេះ,អាចកត់ត្រានៅទីនេះ(ឧ អាហារ,កីឡា,ជីវភាព,រស់នៅ,ហារី,សុរា,ជីវជាតិ)

_____
_____
_____

កត់សំគាល់ : បុរសិនបីអ្នកមានអាការៈដូចខាងលើ,បុរហលែជាអ្នកមានផ្ទៃពោះគ្រៈថ្ងនាក់,សូមសួរគ្រូពទេ្យហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ,ដើមុបីសុរតុតិភាពខ្លួននិងកូន(សូមអានទំព័រទី២១៥)

តីអ្នកជក់ហារីដរែឬទេ? ☐ជក់ (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសូមផ្ទុំដាច់ហារី**) ☐ មិនជក់

កុនុងរយៈពលេ១សប្តដាហ៍មុន ពលេអ្នកនៅផ្ទះ តីមាននរណាជក់ហារីនៅមុខអ្នកដរែឬទេ?

☐ មាន (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសំណូមពរឲ្យពួកគផ្ទុំដាច់ហារី**) ☐ គ្មាន

ហតុថលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____ ហតុថលខោអាណាពុយាហាល_____

បណ្តាញទូរស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់សុ្តីមានផ្ទៃពោះនិងបុរសូតកូន 0800-870870

第七次產檢記錄

第七次產檢檢查紀錄
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第36週）

檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週

產前檢查記錄

體重kg _____
血壓mmHg _____
宮底高度cm _____
胎心音(次/分) _____
胎位 _____
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現　☐需注意或異常項目
1. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
2. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
3. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
4. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

醫護特別叮嚀：

☐ 35-37週可做孕婦乙型鏈球菌篩檢(檢查結果紀錄於20頁)

33-36週胎兒生長狀況：

◎體重增加速率大於身長，胎毛逐漸消失，胎兒的循環、呼吸、消化等器官發育成熟。

衛教及指導事項

☐戒菸資訊 (82頁)
☐孕婦乙型鏈球菌篩檢說明 (96頁)
☐早產防治、高危險妊娠 (120、214頁)
☐孕期體重控制與飲食 (132頁)
☐孕期感染與妊娠合併症 (138頁)
☐須立即就醫之危險徵兆 (144頁)
☐認識產後憂鬱症 (146頁)
☐產前運動 (154頁)
☐新生兒篩檢 (160頁)
☐母乳哺育 (170頁)
☐產前用品準備 (186頁)
☐認識生產方式 (188頁)

產檢院所：_____
醫師簽名：_____
下次產檢日期：_____
準媽媽簽名：_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៦

ប្រការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៦

(មានផ្ទៃពោះវលោទី៣:មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍ អាយយាបល់នៅទី៣៤សប្តាហ៍)

កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យ៖_____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ   អាយុគភ៌៖សប្តាហ៍ __________ សប្តាហ

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូត

ទម្ងន់(kg) __________

សម្ពាធឈាម (mmHg) __________

ប្រវែងហាតស្បូន(cm) __________

ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទី) __________

កន្លែងទារក __________

ជាតិស្ករក្នុងទឹកនោម __________

ជាតិប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនោម __________

អាការៈហើម __________

អាការៈរីកសរសៃឈាម __________

លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូត

☐ គ្មានអាការៈពិសេស

☐ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬប្រការមិនប្រក្រតី

១. ______ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមន្ទីរពេទ្យ

២. ______ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមន្ទីរពេទ្យ

៣. ______ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមន្ទីរពេទ្យ

៤. ______ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមន្ទីរពេទ្យ

សម្គាល់៖ ប្រសិនមានបីមាស្នាមរបួសមិនដឹងមូលហេតុ ឬសង្ស័យថាទទួលរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ សូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ព្រមទាំងបំពេញតារាងវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃអំពើហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និតតវ៉ៃន់ (តារាង TIPVDA សូមមើលទំព័រទី២២៥)

ដាស់តឿនពិសេសរបស់គ្រូពេទ្យ

☐ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពី៣៥សប្ដាហ៍ដល់៣៧សប្ដាហ៍អាចធ្វើតេស្ត Streptococcusតាមប្រភេទខ (លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យកត់ត្រានៅទំព័រទី២១)

៣៣-៣៦ ស ប្តា ហ៍ ទារក ក្នុងផ្ទៃស្ថែថានភាពការ លូតលាស់

◎ ទំងន់កើនឡើងចរិនជាងអត្រានៃការលូតលាស់ រាមកំណើតនឹងជួរៈហាត់ទារកក្នុងផ្ទៃល្វើដង្ហើមនិងផ្នែកកែរំលាយអាហារនសៃរាង្គផ្សេងទៀតដលែមានភាពចាស់ទុំហាន។

ប្រការណនៅនិងសុខភាព

☐ ព័តមានតមហារី	(ទំព័រទី៨៣)
☐ សចេក្តីនៃនាំស្តីអំពីហាក់តវើប្រភេទទី២ដលែបណ្តាលអាយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឆ្លងជំង	(ទំព័រទី៩៧)
☐ ការពារកុំអាយប្រសូតមុនខែ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដលែមានគ្រោះថ្នាក់	(ទំព័រទី១២១、២១៥)
☐ ត្រួតពិនិត្យទំងន់និងរបបអាហារនៅពេលមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទី១៣៣)
☐ ឆ្លងជំងឺនៅពេលមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន	(ទំព័រទី១៣៩)
☐ អាការៈគ្រោះថ្នាក់ដលែត្រូវទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់	(ទំព័រទី១៤៥)
☐ តានតឹងក្រោយឆ្លងទន្លេរួចការយោគយល់	(ទំព័រទី១៤៧)
☐ ការឆ្លងពីពូជត្រកូល	(ទំព័រទី១៥៥)
☐ ត្រួតពិនិត្យទារកថ្មី	(ទំព័រទី១៦១)
☐ បំបៅដោះ	(ទំព័រទី១៧១)
☐ រៀបចំឥវ៉ាន់ប្រើប្រាស់មុនពេលប្រសូត	(ទំព័រទី១៨៧)
☐ ស្គាល់ពីវិធីបង្កើត	(ទំព័រទី១៨៩)

មន្ទីរពេទ្យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ__________

លត្ថលេខាគ្រូពេទ្យ__________

ថ្ងៃត្រួតពិនិត្យលើកក្រោយ__________

ហត្ថលេខាអ្នកមានផ្ទៃពោះ__________

第八次產檢自我檢核紀錄

第八次產檢自我紀錄事項
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第38週）
※請準媽媽於接受產前檢查前，務必將下列事項及自我檢核紀錄填寫完整

以下是記錄於____年____月____日（懷孕週數第____週）

1. 準媽媽記錄自覺項目：□出血　□腹痛　□頭痛　□痙攣
   □其他自覺徵狀：_____

2. 我已閱讀的衛教資訊

□ 戒菸資訊	(82頁)	□是	□否
□ 孕期體重控制與飲食	(132頁)	□是	□否
□ 孕期感染與妊娠合併症	(138頁)	□是	□否
□ 須立即就醫之危險徵兆	(144頁)	□是	□否
□ 認識產後憂鬱症	(146頁)	□是	□否
□ 產前運動	(154頁)	□是	□否
□ 新生兒篩檢	(160頁)	□是	□否
□ 母乳哺育	(170頁)	□是	□否
□ 產前用品準備	(186頁)	□是	□否
□ 認識生產方式	(188頁)	□是	□否
□ 準備與因應生產陣痛	(190頁)	□是	□否
□ 母嬰親善醫療院所	(204頁)	□是	□否

3. 心情溫度計
   過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？　□是□否
   過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？　□是□否
   註：如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，強烈建議您告訴您的家人或醫師協助。

4. 心情點滴
   家人要叮嚀、鼓勵媽咪的話_____
   _____
   準媽媽要給寶寶的話_____
   _____

5. 此次產檢您想要向醫師詢問的問題或困擾，可記錄於此(如:飲食、運動、生活作息、菸、酒、營養)
   _____
   _____
   _____

註：如果您有勾選上述任何症狀，即可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和寶寶的安全(請參閱第214頁)

您有無吸菸？　□有(請參閱第82頁，**並請戒菸**)　□沒有

在過去一個禮拜內，您在家的時候，有沒有其他人在您的面前吸菸？
□有(請參閱第82頁，**並請家人戒菸**)　□沒有

準媽媽簽名：_____　家人簽名：_____

孕產婦關懷專線 0800-870870

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៨ដាយខ្លួនឯង

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៨ដាយខ្លួនឯង
(មានផ្ទៃពោះរលោង:មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សហ្តាហ៍ អាយយាបល់នៅទី៣៥សហ្តាហ៍)
ត្រូវបំពេញអាយពញលញនូវបុរការខាងក្រាមនិងការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យដាយខ្លួនឯង,មុនពលេជួរីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ។

ខាងក្រាមនេះ _____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ (មានផ្ទៃពោះ_____សហ្តាហ៍)

១.អ្នកមានផ្ទៃពោះដឹងដាយខ្លួនឯង

☐ ចញឈាម ☐ ឈឺពោះ ☐ ឈឺក្បាល ☐ ជំងឺរញខ្លួន
☐ អាការៈដលែខ្លួនយល់ឃើញដទទៀតៈ_____

២.ព័តមានអប់រំសុខភាពដលែខ្ញុំហានអាន

☐ ព័តមានតមហារ	(ទំព័រទី៨៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ត្រួតពិនិត្យទំងន់និងរបបអាហារនៅពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទី១៣៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ឆ្លងជំងឺនៅពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន	(ទំព័រទី១៣៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ អាការៈគ្រុនថ្លាក់ដលែត្រូវទៅកាន់មន្ទីពទ្យជាបន្ទាន់	(ទំព័រទី១៤៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ តានតឹងក្រាយឆ្លងទន្លយួចការយាគយល់	(ទំព័រទី១៤៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការឆ្លងពីពូជត្រកូល	(ទំព័រទី១៥៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ត្រួតពិនិត្យទារកថ្មី	(ទំព័រទី១៦១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ បំបាដាៈ	(ទំព័រទី១៧១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ រៀបចំឥវ៉ាន់បូរីបុរាស់មុនពលេបុរសូត	(ទំព័រទី១៨៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ សុគាល់ពិធីបង្កើត	(ទំព័រទី១៨៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ រៀបចំនិងការឈឺក្នុងការបង្កើតកូន	(ទំព័រទី១៩១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ មនទីពទ្យមីលថមែ្ងតាយនិងកូន	(ទំព័រទី២០៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ

៣.វាស់កំដៅចិត្ត

ខមែុន,មានអារមែ្មណ៍មិនលុអ,ពិបាកចិត្តឬមានអារមែ្មណ៍ថាគ្មានអានាគតឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
ខមែុន,តងែតគ្មានអារមែ្មណ៍ក្នុងរឿងផ្សងេៗឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
បន្ថមែ : សូមបា្រប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកឬសុំជំនួយពីគ្រូពទ្យ,បុរសិនបីអ្នកមានបញ្ហាទាំង២ដូចខាងលីនេះ។

៤.ចាក់ថ្នាំអារមែ្មណ៍

សំដីកុ្រមគ្រួសារដាស់ទឿនលើកទឹកចិត្តអ្នកមកតាយ _____
លសំដីអ្នកមកតាយទៅកាន់កូន _____

៦.បញ្ហានិងកង្វល់ដលែអ្នកចង់សួរគ្រូពទ្យនៅពលេត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកនេះ,អាចកត់ត្រានៅទីនេះ(ឧ អាហារ,កីឡា,ជីវភាព,រស់នៅ,ហារី,សុរា,ជីវជាតិ)

_____
_____
_____

កត់សំគាល់ : បុរសិនបីអ្នកមានអាការៈដូចខាងលើ,បុរហលែជាអ្នកមានផ្ទៃពោះគ្រុនថ្លាក់,សូមសួរគ្រូពទ្យហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ,ដើមបីសុវត្ថិភាពខ្លួននិងកូន(សូមអានទំព័រទី២១៥)
តីអ្នកជក់ហារីដរែឬទេ? ☐ជក់ (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសូមផ្ដាច់ហារី**) ☐ មិនជក់
កុ្នងរយៈពលេ១សបា្ដហ៍មុន ពលេអ្នកនៅផ្ទះ: តីមាននរណាជក់ហារីនៅមុខអ្នកដរែឬទេ?
☐ មាន (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសំណូមពរឲ្យពួកគផ្ទៃផ្ដាច់ហារី**) ☐ គ្មាន
ហតុផលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____ ហតុផលខោអាណាពុយោហល_____

បណ្តាញទូរស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់សុរតីមានផ្ទៃពោះនិងបុរសូតកូន 0800-870870

第八次產檢紀錄

第八次產檢檢查紀錄
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第38週）

檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週

產前檢查記錄

體重kg _____
血壓mmHg _____
宮底高度cm _____
胎心音(次/分) _____
胎位 _____
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現　☐需注意或異常項目
1. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
2. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
3. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
4. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

醫護特別叮嚀：

☐ 您做好生產的準備了嗎？

胎兒生長狀況：

◎ 九個月大的胎兒頭髮已相當濃密，指甲也長至指尖，皮膚漸光滑圓潤。

衛教及指導事項

☐ 戒菸資訊 (82頁)
☐ 孕期體重控制與飲食 (132頁)
☐ 孕期感染與妊娠合併症 (138頁)
☐ 須立即就醫之危險徵兆 (144頁)
☐ 認識產後憂鬱症 (146頁)
☐ 產前運動 (154頁)
☐ 新生兒篩檢 (160頁)
☐ 母乳哺育 (170頁)
☐ 產前用品準備 (186頁)
☐ 認識生產方式 (188頁)
☐ 準備與因應生產陣痛 (190頁)
☐ 母嬰親善醫療院所 (204頁)

產檢院所：_____
醫師簽名：_____
下次產檢日期：_____
準媽媽簽名：_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៦

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៦

(មានផ្ទៃពោះរលោទី៣:មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍ អាយយាបល់នាទី៣៤សប្តាហ៍)

កាលបរិច្ឆទទេនការពិនិត្យ៖_____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ អាយុគភ៌៖សប្តាហ៍ _____ សប្តាហ

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូត

ទម្ងន់(kg) _____
សម្ពាធឈាម (mmHg) _____
ប្រវែងហាតសុបូន(cm) _____
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទី) _____
កន្ទុលងៃទារក _____
ជាតិស្ករកនុងទឹកនាម _____
ជាតិប្រូតអ៊ីនកនុងទឹកនាម _____
អាការៈហើម _____
អាការៈរីកសរសៃឈាម _____

លត្ថផលត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្រសូត

☐ គ្មានអាការៈពិសេស
☐ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬបុរការមិនប្រក្រដី
១. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនទីពទ្យ
២. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនទីពទ្យ
៣. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនទីពទ្យ
៤. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តួមមនទីពទ្យ

សម្គាល់៖ បុរសិនមានបីមាសុនាមរបួសមិនដឹងមូលហតុ ឬសង្ស័យថាទទួលរងអំពីហិង្សាកនុងគ្រួសារ សូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ព្រមទាំងបំពញតារាងវាយតមូលគ្រោះថ្នាក់នៃអំពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និតតវ៉ាន់ (តារាង TIPVDA សូមមីលទំព័រទី២២៥)

ដាស់ទ្បីនពិសសេរបស់គ្រូពទ្យ

☐ អុនករៀបចំខ្លួនហើយឬនូវកនុងការបុរសូត?

ទារកកនុងផ្ទៃស្ថិថានភាពការីកលូតលាស់

◎ ទារក កនុង ផ្ទៃ បុរាំបួន ខែ ទារក កនុង ផ្ទៃពិតជា មាន សក់ ក្រាស់ , ក្រចក កិន ឡើង ដល់ ចុងម្រាមដៃ, សុបកែ បន្តិច មុតង រលូន ។

បុរការណនៃាំនិងសុខភាព

☐ ព័តមានតមហារ (ទំព័រទី៨៣)
☐ ត្រួតពិនិត្យទំងន់និងរបបអាហារនាពលេមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រទី១៣៣)
☐ ឆ្លងជំងឺនាពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន (ទំព័រទី១៣៩)
☐ អាការៈគ្រុនាក់ដលៃត្រូវទៅកានមនទីពទ្យជាបនទាន់ (ទំព័រទី១៤៥)
☐ តានតឹងកុរាយឆ្លងទនុលធ្ងចការយោគយល់ (ទំព័រទី១៤៧)
☐ ការឆ្លងពីពូជគ្រុកូល (ទំព័រទី១៥៥)
☐ ត្រួតពិនិត្យទារកចុម (ទំព័រទី១៦១)
☐ បំបៅដោះ (ទំព័រទី១៧១)
☐ រៀបចំតវ៉ាន់បុរីបុរាស់មុនពេលប្រសូត (ទំព័រទី១៨៧)
☐ សុគាល់ពិធីបង្កកីត (ទំព័រទី១៨៧៩)
☐ រៀបចំនិងការឈឺកនុងការបង្កកីតកូន (ទំព័រទី១៩១)
☐ មនទីពទ្យមីលថម្ងៃតាយនិងកូន (ទំព័រទី២០៥)

មនទីពទ្យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ:_____
លត្ថផលខោគ្រូពទ្យ_____
ងត្រៃត្រួតពិនិត្យលីកកុរាយ_____
ហតុផលខោអុនកមានផ្ទៃពោះ:_____

第九次產檢自我檢核紀錄

第九次產檢自我紀錄事項
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第39週）
※請準媽媽於接受產前檢查前，務必將下列事項及自我檢核紀錄填寫完整

以下是記錄於____年____月____日（懷孕週數第____週）

1. 準媽媽記錄自覺項目：□出血　□腹痛　□頭痛　□痙攣
   □其他自覺徵狀：_____

2. 我已閱讀的衛教資訊

□	戒菸資訊	(82頁)	□是 □否
□	孕期體重控制與飲食	(132頁)	□是 □否
□	孕期感染與妊娠合併症	(138頁)	□是 □否
□	須立即就醫之危險徵兆	(144頁)	□是 □否
□	認識產後憂鬱症	(146頁)	□是 □否
□	產前運動	(154頁)	□是 □否
□	新生兒篩檢	(160頁)	□是 □否
□	母乳哺育	(170頁)	□是 □否
□	產前用品準備	(186頁)	□是 □否
□	認識生產方式	(188頁)	□是 □否
□	準備與因應生產陣痛	(190頁)	□是 □否
□	產後健康管理	(200頁)	□是 □否
□	母嬰親善醫療院所	(204頁)	□是 □否
□	保母托育	(220頁)	□是 □否

3. 心情溫度計
   過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？ □是□否
   過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？ □是□否
   註：如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，強烈建議您告訴您的家人或醫師協助。

4. 心情點滴
   家人要叮嚀、鼓勵媽咪的話_____
   _____
   準媽媽要給寶寶的話_____
   _____

5. 此次產檢您想要向醫師詢問的問題或困擾，可記錄於此(如:飲食、運動、生活作息、菸、酒、營養)
   _____
   _____
   _____
   註：如果您有勾選上述任何症狀，即可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和寶寶的安全(請參閱第214頁)

您有無吸菸？　□有(請參閱第82頁，**並請戒菸**)　□沒有
在過去一個禮拜內，您在家的時候，有沒有其他人在您的面前吸菸？
□有(請參閱第82頁，**並請家人戒菸**)　□沒有

準媽媽簽名：_____　家人簽名：_____

孕產婦關懷專線 0800-870870

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៩ដោយខ្លួនឯង

បុរការកត់ត្រាតួត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៩ដោយខ្លួនឯង
(មានផ្ទៃពោះរំលោភ:មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍ អាយុយាប់លើសពី៣៩សប្តាហ៍)
តួរបំពេញអាយពញ្ចេលញ្ចើនបុរការខាងក្រោមនិងការកត្តាតួរត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯង,មុនពេលជួរការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ។

ខាងក្រោមនេះ _____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ (មានផ្ទៃពោះ_____សប្តាហ៍)

១.អ្នកមានផ្ទៃពោះដឹងដោយខ្លួនឯង

☐ ចញ្ចេឈាម ☐ ឈឺពោះ ☐ ឈឺក្បាល ☐ ជំងឺរួញខ្លួន

☐ អាការៈដទៃខ្លួនយល់ឃើញដទៃទៀត៖_____

២.ព័ត៌មានអប់រំសុខភាពដទៃខ្ញុំហានអាន

☐ ព័ត៌មានតមហារ	(ទំព័រទី៨៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ តួរតពិនិត្យទំងន់និងរបបអាហារនៅពលេមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទ១៣៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ឆ្លងជំងឺនៅពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន	(ទំព័រទី១៣៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ អាការៈគួរៈថ្ងនាក់ដលែតួរវទៅកានមុនទីពទ្យែជាបនទ្ទាន	(ទំព័រទី១៤៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ តានតឹងក្រាយឆ្លងទន្លេធ្ងចការយាគយល	(ទំព័រទី១៤៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការឆ្លងជំពូជតុរកូល	(ទំព័រទី១៥៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ តួរតពិនិត្យទារកថ្មី	(ទំព័រទ១៦១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ បំបៅដោះ	(ទំព័រទី១៧១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ រៀបចំតង់ប្បីបុរស់មុនពលេបុរសូត	(ទំព័រទី១៨៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ សុគាល់ពិធីបង្កកីត	(ទំព័រទ១៨៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ រៀបចំនិងការឈឺកុនុងការបង្កកីតកូន	(ទំព័រទ១៩១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ មនុទីមលថស្ថែខភាពកុរយពលេបុរសូត	(ទំព័រទី២០១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ មនុទីពទ្យមីលថមែតាយនិងកូន	(ទំព័រទី២០៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ មនុទីមដោះ	(ទំព័រទី២២១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ

៣.វាស់កំដៅចិត្តគ

ខមែុន,មានអារមែុមណ៍មិនលុអ,ពិបាកចិត្តឬមានអារមែុមណ៍ថាគ្មានអានាគតឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ

ខមែុន,តងែតគ្មែនអារមែុមណ៍កុនុងរឿងផ្ទសងេៗឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ

បនុថមែ : សូមបុរាប់កុរុមគ្រួសារអ្នកឬសុំជំនួយពីគ្រួពទេយ,បុរសិនបីអ្នកមានបញ្ហាទាំង២ដូចខាងលីនេះ។

៤.ចាក់ថ្នាំអារមែុមណ៍

សំដីកុរុមគ្រួសារដាស់ទឿនលើកទឹកចិត្តអ្នកនមែតាយ _____

លសំដីអ្នកនមែតាយទៅកាន់កូន _____

៦.បញ្ហានិងកង្វល់ដលែអ្នកចង់សួរគ្រួពទេយនៅពលេតួរតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកនេះ,អាចកត់ត្រានៅទីនេះ(ឧ អាហារ,កីឡា,ជីវភាព,រស់នៅ,ហារី,សុរា,ជីវជាតិ)

_____

_____

_____

កត់សំគាល់ : បុរសិនបីអ្នកមានអាការៈដូចខាងលើ,បុរហលែជាអ្នកមានផ្ទៃពោះគុរៈថ្ងនាក់,សូមសួរគ្រួពទេយហើយធ្វើការតួរួតពិនិត្យ,ដើមុបីសុរតុភាពខ្លួននិងកូន(សូមអានទំព័រទី២១៥)

តីអ្នកជក់ហារីដរែឬទេ? ☐ជក់ (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសូមផ្ដាច់ហារី**) ☐ មិនជក់

កុនុងរយៈពលេ១សបុ្ដាហ៍មុន ពលេអ្នកនៅជុទេ៖ តីមាននរណាជក់ហារីនៅមុខអ្នកដរែឬទេ?

☐ មាន (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសំណូមពរឲ្យពួកគផ្ដេាច់ហារី**) ☐ គ្មាន

ហតុថលេខាអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____ ហតុថលេខាអាណាពុយាហាល_____

បណ្តាញទូរស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់សុរតីមានផ្ទៃពោះនិងបុរសូតកូន 0800-870870

第九次產檢紀錄

第九次產檢檢查紀錄
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第39週）

檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週

產前檢查記錄

體重kg _____
血壓mmHg _____
宮底高度cm _____
胎心音(次/分) _____
胎位 _____
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現　☐需注意或異常項目
1. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
2. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
3. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
4. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

醫護特別叮嚀：

☐ 生產時請記得攜帶孕婦健康手冊及疾病管制署印製之孕婦「孕婦B型肝炎前檢查登錄表」。

37-40週胎兒生長狀況：

◎ 皮膚光滑圓潤，顱骨堅硬，手指腳趾有指甲發育完成

衛教及指導事項

☐ 戒菸資訊 (82頁)
☐ 孕期體重控制與飲食 (132頁)
☐ 孕期感染與妊娠合併症 (138頁)
☐ 須立即就醫之危險徵兆 (144頁)
☐ 認識產後憂鬱症 (146頁)
☐ 產前運動 (154頁)
☐ 新生兒篩檢 (160頁)
☐ 產前用品準備 (186頁)
☐ 認識生產方式 (188頁)
☐ 準備與因應生產陣痛 (190頁)
☐ 產後健康管理 (200頁)
☐ 母乳哺育 (170頁)
☐ 要餵母乳 ☐需要母乳哺育教戰手冊 ☐已有上述手冊 ☐需要母乳哺育諮詢
☐ 不餵母乳 ☐需要配方奶指導

產檢院所：_____
醫師簽名：_____
下次產檢日期：_____
準媽媽簽名：_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៩

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី ៩
(មានផ្ទៃពោះរលោទី៣:មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍ អាយយាបល់នៅទី៣៩សប្តាហ៍)

កាលបរិច្ឆេទទៃការពិនិត្យ:_____ថ្ងៃទៃ _____ខៃ_____ឆ្នាំ អាយុគភ៌:សប្តាហ៍ _____ សប្តាហ

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពលេបុរសូត

ទម្ងន់(kg) _____
សម្ពាធឈាម (mmHg) _____
បុរវៃងហាតសុបូន(cm) _____
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទី) _____
កន្ទុលងៃទារក _____
ជាតិស្ករកុនុងទឹកនាម _____
ជាតិប្រូតអ៊ីនកុនុងទឹកនាម _____
អាការៈហើម _____
អាការៈរីកសរសៃឈាម _____

លត្ថជលត្រួតពិនិត្យមុនពលេបុរសូត

☐ គ្មានអាការៈពិសេស
☐ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬបុរការមិនបុរកុរដី
១. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តល់ូវមមនទ្ធីពទ្យ
២. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តល់ូវមមនទ្ធីពទ្យ
៣. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តល់ូវមមនទ្ធីពទ្យ
៤. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តល់ូវមមនទ្ធីពទ្យ

សម្គាល់៖ បុរសិនមានបីមាសុនាមរបួសមិនដឹងមូលហតុ ឬសង្ស័យថាទទួលរងអំពីហិង្សាកុនុងគ្រួសារ សូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ពុរមទាំងបំពញតារាងវាយតមូលគ្រៈថ្នាក់នៃអំពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតសុនិតតវ៉ាន់ (តារាង TIPVDA សូមមីលទំព័រទ២២៥)

ដាស់ទឿនពិសេសរបស់គ្រូពទ្យ

☐ ពលេសមុាលត្រូវរកជាបមកជាមួយសៀវភៅសុខភាពសុរដីមានគភ៌ និង "តារាងកំណត់ត្រាការពិនិត្យជម្ងឺរលាកថ្លើមបុរភេទ B មុនពលេសមុាលរបស់សុរដីមានគភ៌" ដលៃហៈពុមពដាយទីសុនាក់ការគ្រប់គ្រងជម្ងឺ។

៣៧-៤០ ស បុតា ហ៍ ទារក កុនុង ផ្ទៃសុៃថានភាព ការ លូតលាស់

◎ សូបុរៃកមានភាពទន់រលាងលលាដ៍ ឆ្អឹងរឹងមាំ,មុាម ដដៃង លូតលាស់ ហាន ពញលញ ។

បុរការណនៃាំនិងសុខភាព

☐ ព៌តមានតមហារ (ទំព័រទី៨៣)
☐ ត្រួតពិនិត្យទំងន់និងរបបអាហារនៅពលេមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រទ១៣៣)
☐ ឆ្លងជំងឺនៅពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន (ទំព័រទី១៣៩)
☐ អាការៈគុរៈថ្លនាក់ដលៃត្រូវទៅកានមន្ទីពទ្យជាបនទាន់ (ទំព័រទី១៤៥)
☐ តានតឹងកុរាយឆ្លងទន្ទុលរួចការយាគយល (ទំព័រទី១៤៧)
☐ កការឆ្លងពិពុជគុរកូល (ទំព័រទី១៥៥)
☐ ត្រួតពិនិត្យទារកថ្ងៃមី (ទំព័រទី១៦១)
☐ រៀបចំគ្រាន់បរិបាកសុមុនពលេបុរសូត (ទំព័រទី១៨៧)
☐ សុគាល់ពីវិធីថ្លងកីត (ទំព័រទី១៨៩)
☐ រៀបចំនិងការលើកនុងការបងកីតកូន (ទំព័រទ១៣៩)
☐ មុនទីមីលថសុៃខភាពកុរាយពលេបុរសូត (ទំព័រទី២០១)
☐ បំបាដា: (ទំព័រទី១៧១)
☐ចង់បំបាដា: ☐សៀវភៅបងៀនបំបាដា:
☐មានសៀវភៅដូចខាងលើហើយ
☐ត្រូវការពត៌មានបំបាដា:
☐មិនបំបាដា: ☐ត្រូវការការណនៃាអំពីមុសាីទឹកដា:គា

មនុទីពទ្យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ_____
លត្ថជលខោគ្រូរទ_____
ងតៃ្រួតពិនិត្យលើកក្រាយ_____
ហតុថលើខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____

第十次產檢自我檢核紀錄

第十次產檢自我紀錄事項
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第40週）
※請準媽媽於接受產前檢查前，務必將下列事項及自我檢核紀錄填寫完整

以下是記錄於____年____月____日（懷孕週數第____週）

1. 準媽媽記錄自覺項目：□出血　□腹痛　□頭痛　□痙攣
   □其他自覺徵狀：_____

2. 我已閱讀的衛教資訊

□	戒菸資訊	(82頁)	□是 □否
□	孕期體重控制與飲食	(132頁)	□是 □否
□	孕期感染與妊娠合併症	(138頁)	□是 □否
□	認識產後憂鬱症	(146頁)	□是 □否
□	產前運動	(154頁)	□是 □否
□	新生兒篩檢	(160頁)	□是 □否
□	母乳哺育	(170頁)	□是 □否
□	產前用品準備	(186頁)	□是 □否
□	認識生產方式	(188頁)	□是 □否
□	準備與因應生產陣痛	(190頁)	□是 □否
□	產後健康管理	(200頁)	□是 □否
□	避孕方法	(202頁)	□是 □否
□	母嬰親善醫療院所	(204頁)	□是 □否
□	保母托育	(220頁)	□是 □否

3. 心情溫度計
   過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？ □是□否
   過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？ □是□否
   註：如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，強烈建議您告訴您的家人或醫師協助。

4. 心情點滴
   家人要叮嚀、鼓勵媽咪的話_____
   _____
   準媽媽要給寶寶的話_____
   _____

5. 此次產檢您想要向醫師詢問的問題或困擾，可記錄於此(如:飲食、運動、生活作息、菸、酒、營養)
   _____
   _____
   _____
   註：如果您有勾選上述任何症狀，即可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和寶寶的安全(請參閱第214頁)

您有無吸菸？　□有(請參閱第82頁，**並請戒菸**)　□沒有
在過去一個禮拜內，您在家的時候，有沒有其他人在您的面前吸菸？
□有(請參閱第82頁，**並請家人戒菸**)　□沒有

準媽媽簽名：_____　家人簽名：_____

孕產婦關懷專線 0800-870870

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៩ដោយខ្លួនឯង

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី៩ដោយខ្លួនឯង
(មានផ្ទៃពោះពេលមានផ្ទៃពោះលើសពី៣៩សប្តាហ៍ អាយុយាបល់ថ្មីទី៣៩សប្តាហ៍)
ត្រូវបំពេញអោយពេញលេញនូវបុរការខាងក្រោមនិងការកត្ត្រាត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯង,ម៉ុនពេលជួរការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ។

ខាងក្រោមនេះ _____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ (មានផ្ទៃពោះ_____សប្តាហ៍)

១.អ្នកមានផ្ទៃពោះដឹងដោយខ្លួនឯង

☐ ចញ្ចេឈាម ☐ ឈឺពោះ ☐ ឈឺក្បាល ☐ ជំងឺរញ្ជួយខ្លួន
☐ អាការៈដទៃខ្លួនយល់ឃើញដទៃទៀត៖_____

២.ព័ត៌មានអប់រំសុខភាពដទៃខ្ញុំហានអាន

☐ ព័ត៌មានតមហ៊ី	(ទំព័រទី៨៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ត្រួតពិនិត្យទំងន់និងរបបអាហារនៅពេលមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទី១៣៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ឆ្លងជំងឺនៅពេលមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន	(ទំព័រទី១៣៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ តានតឹងក្រាយឆ្លងទន្លុះរួចការយោគយល់	(ទំព័រទី១៤៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ការឆ្លងពីពូជត្រកូល	(ទំព័រទី១៥៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ត្រួតពិនិត្យទារកថ្មី	(ទំព័រទី១៦១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ប៊ីបៅដារ	(ទំព័រទី១៧១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ រៀបចំវ៉ាន់ប្អូរីបុរាស់មុនពេលប្រសូត	(ទំព័រទី១៨៧)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ សុភាល់ពិធីបង្កើត	(ទំព័រទី១៨៩)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ រៀបចំនិងការឈឺក្នុងការបង្កើតកូន	(ទំព័រទី១៩១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ ម៉ូនទីមលថ្មសុខភាពក្រាយពេលប្រសូត	(ទំព័រទី២០១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ វិធីការពារកុំអោយមានផ្ទៃពោះ	(ទំព័រទី២០៣)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ មនទីពេទ្យមីលថម្ដែតាយនិងកូន	(ទំព័រទី២០៥)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ
☐ មនុំទីមដោះ	(ទំព័រទី១២១)	☐ មនែ	☐ មិនមនែ

៣.វាស់កំដៅចិត្តគ

ខមែុន,មានអារម្មណ៍មិនល្អអ,ពិបាកចិត្តឬមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអានាគតឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
ខមែុន,តងែតគ្មានអារម្មណ៍កុនុងរឿងផ្សងេៗឬ? ☐ មនែ ☐ មិនមនែ
បនទ្ថម : សូមបុរាប់ក្រុមគ្រួសាអ្នកឬសុំជំនួយពីគ្រូពេទ្យ,បុរសិនបីអ្នកមានបញ្ហាទាំង២ដូចខាងលីនេះ។

៤.ចាក់ថ្នាំអារម្មណ៍

សំដីក្រុមគ្រួសារដាស់ទឿនលើកទឹកចិត្តអ្នកមុតាយ _____
លសំដីអ្នកមុតាយទៅកាន់កូន _____

៦.បញ្ហានិងកង្វល់ដលែអ្នកចង់សួរគ្រូពេទ្យនៅពេលត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកនេះ,អាចកត់ត្រានៅទីនេះ(ឧ អាហារ,កីឡា,ជីវភាព,រស់នៅ,ហារី,សុរា,ជីវជាតិ)

_____

_____

_____

កត់សំគាល់ : បុរសិនបីអ្នកមានអាការៈដូចខាងលើ,បុរហែលជាអ្នកមានផ្ទៃពោះគ្រុៈថ្នាក់,សូមសួរគ្រូពេទ្យហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យ,ដើមបីសុរត្ថិភាពខ្លួននិងកូន(សូមអានទំព័រទី២១៥)

តីអ្នកជក់ហារីដរែឬទេ? ☐ជក់ (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសូមផ្ដាច់ហារី**) ☐ មិនជក់

កុនុងរយៈពេល១សបុ្ដាហ៍មុន ពេលអ្នកនៅផ្ទះ: តីមាននរណាជក់ហារីនៅមុខអ្នកដរែឬទេ?

☐ មាន (សូមអានទំព័រទី៨៣ **និងសំណូមពរឲ្យពួកគផ្ទេជាច់ហារី**) ☐ គ្មាន

ហតុថលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____ ហតុថលខោអាណាពុយាហាល_____

បណ្តាញទូរស័ព្ទយកចិត្តទុកដាក់សុរតីមានផ្ទៃពោះនិងបុរសូតកូន 0800-870870

第十次產檢紀錄

第十次產檢檢查紀錄
（妊娠第三期：妊娠29週以上　建議週數：第40週）

檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週

產前檢查記錄

體重kg _____
血壓mmHg _____
宮底高度cm _____
胎心音(次/分) _____
胎位 _____
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現　☐需注意或異常項目
1. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
2. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
3. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介
4. _____ ☐需追蹤 ☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

醫護特別叮嚀：

☐ 生產時請記得攜帶孕婦手冊及疾病管制署印製之「孕婦B型肝炎前檢查登錄表」。

胎兒生長狀況：

◎ 十個月大的胎兒變大，子宮內的空間越來越小，胎動會減少。胎兒的頭朝下，膝蓋緊挨著鼻子，大腿貼著身體。

衛教及指導事項

☐ 戒菸資訊 (82頁)
☐ 孕期體重控制與飲食 (132頁)
☐ 孕期感染與妊娠合併症 (138頁)
☐ 認識產後憂鬱症及防治 (146頁)
☐ 產前運動 (154頁)
☐ 新生兒篩檢 (160頁)
☐ 母乳哺育 (170頁)
☐ 產前用品準備 (186頁)
☐ 認識生產方式 (188頁)
☐ 準備與因應生產陣痛 (196頁)
☐ 產後健康管理 (200頁)
☐ 避孕方法 (202頁)

產檢院所：_____
醫師簽名：_____
下次產檢日期：_____
準媽媽簽名：_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី១០

បុរការកត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកទី១០

(មានផ្ទៃពោះរលោទី៣:មានផ្ទៃពោះលើសពី២៩សប្តាហ៍ អាយុយាបល់នាទី៤០សប្តាហ៍)

កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យ៖_____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ អាយុគភ៌៖សប្តាហ៍ _____ សប្តាហ

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពេលបុរសូត

ទម្ងន់(kg) _____
សម្ពាធឈាម (mmHg) _____
បុរងៃហាតស្ពូន(cm) _____
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទី) _____
កន្ទុលងៃទារក _____
ជាតិស្ករក្នុងទឹកនាម _____
ជាតិប្រូតអ៊ីនក្នុងទឹកនាម _____
អាការៈហើម _____
អាការៈរីកសរសៃឈាម _____

លត្ថជលត្រួតពិនិត្យមុនពេលបុរសូត

☐ គ្មានអាការៈពិសេស
☐ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬបុរការមិនបុរក្រដី
១. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តល់មមនទ្ធីពទ្យ
២. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តល់មមនទ្ធីពទ្យ
៣. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តល់មមនទ្ធីពទ្យ
៤. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្តល់មមនទ្ធីពទ្យ

សម្គាល់៖ បុរសិនមានបីមាសុនាមរបួសមិនដឹងមូលហេតុ ឬសង្ស័យថាទទួលរងអំពីហិង្សាកុនុងគ្រួសារ សូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ព្រមទាំងបំពញតារាងវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃអំពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និតតាំង (តារាង TIPVDA សូមមើលទំព័រទី២២៥)

ដាស់ទ្បីនពិសសេរបស់គ្រួពទ្យ

☐ ពលេសម្ភាលត្រូវរ្រកជាប់មកជាមួយសៀវភៅសុខភាពសុរដ្ឋីមានគភ៌ និង "តារាងកំណត់ត្រាការពិនិត្យជម្ងឺរលាកថ្លើមបុរភេទ B មុនពលេសម្ភាលរបស់សុរដ្ឋីមានគភ៌" ដលៃហៈពុមពដាយទីស្នាក់ការគ្រប់គ្រងជម្ងឺ។

ទារក កុនុង ផ្ទៃស្ថានភាព ការរីក លូតលាស់

◎ ទារក កុនុង ផ្ទៃដ្ប់ ខ ទារក កុនុង ផ្ទៃ កុនុង សុបូន នាៈមាន ទំហំ តូច ន , ចល់នា របស់ ទារក នឹង ត្រូវ ហន កាត់ បន្ថយ ។ទារក កុនុង ផ្ទៃក្បាល របស់ ទារក បង្វរៃចុះ ជង្គង់ ជាប់ នឹង ច្រមុះ ជើង ជិត ទៅ នឹង រាងកាយ ។

បុរការណនៃាំនិងសុខភាព

☐ ព៌តមានតមហារី (ទំព័រទី៨៣)
☐ ត្រួតពិនិត្យទំង់និងរបបអាហារនៅពលេមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រទី១៣៣)
☐ ឆ្លងជំងឺនៅពលេមានផ្ទៃពោះជាមួយនិងកូន (ទំព័រទី១៣៩)
☐ ការឆ្លងពីពូជគុរកូល (ទំព័រទី១៤៧)
☐ យល់ដឹងនិងបង្កាជំងឺផ្លូវចិត្ត (ទំព័រទី១៥៥)
☐ ត្រួតពិនិត្យទារកថ្មី (ទំព័រទី១៦១)
☐ បំបៅដោះ (ទំព័រទី១៧១)
☐ រៀបចំតាង់បុរីបុរាស់មុនពលេបុរសូត (ទំព័រទ១៨៧)
☐ សុគាល់ពិធីបង្កកិត (ទំព័រទី១៨៩)
☐ រៀបចំនិងការឈឺកុនុងការបង្កកីតកូន (ទំព័រទី១៩៧)
☐ មនទីមីលថសុែខភាពកុរាយពលេបុរសូត (ទំព័រទី២០១)
☐ វិធីការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រទី២០៣)

មនទ្ធីពទ្យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ_____
លត្ថជលខោត្រួពទ្យ_____
ងតៃ្បត្រួតពិនិត្យលីកកុរាយ_____
ហត្ថជលខោអ្នកមានផ្ទៃពោះ_____

其他產檢紀錄

檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週

準媽媽記錄自覺項目：

☐出血　☐腹痛
☐頭痛　☐痙攣

此次產檢您想要向醫師詢問的問題可記錄於此：

產前檢查記錄

體重kg _____
血壓mmHg _____
宮底高度cm _____
胎心音(次/分) _____
胎位 _____
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現　☐需注意或異常項目
1. _____　☐需追蹤　☐需轉介
2. _____　☐需追蹤　☐需轉介
3. _____　☐需追蹤　☐需轉介
4. _____　☐需追蹤　☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

產檢院所：

下次產檢日期：

檢查日期：　　年　　月　　日　　懷孕週數：　　週

準媽媽記錄自覺項目：

☐出血　☐腹痛
☐頭痛　☐痙攣

此次產檢您想要向醫師詢問的問題可記錄於此：

產前檢查記錄

體重kg _____
血壓mmHg _____
宮底高度cm _____
胎心音(次/分) _____
胎位 _____
尿糖 _____
尿蛋白 _____
浮腫 _____
靜脈曲張 _____

產前檢查結果

☐無特殊發現　☐需注意或異常項目
1. _____　☐需追蹤　☐需轉介
2. _____　☐需追蹤　☐需轉介
3. _____　☐需追蹤　☐需轉介
4. _____　☐需追蹤　☐需轉介

註：如有不明傷痕，或疑似家庭暴力等情事請依規定通報，並填寫臺灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA量表）（參閱第224頁）

產檢院所：

下次產檢日期：

កត់ត្រាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះដទៃ

កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យ៖_____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ អាយុគភ៌៖សប្តាហ៍ _____ សប្តាហ៍
១.អ្នកមានផ្ទៃពោះដឹងដាយខ្លួនឯង ☐ ចញ្ចេឈាម ☐ ឈឺពោះ ☐ ឈឺក្បាល ☐ ជំងឺរួញខ្លួនconvulsions
អ្នកអាចកត់ត្រាសំនួរដលែអ្នកចង់សួរគ្រូពទេ្យនាពលេត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅទីនេះ
_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពលេបុរសូត		លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យមុនពលេបុរសូត
ទម្ងន់(kg)	_____	☐ គ្មានអាការៈពិសេស
សម្ពាធឈាម (mmHg)	_____	☐ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬបុរការមិនបុរកុរដី
បុរវៃងហាតសុបូន(cm)	_____	១. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមនុទីពទេ្យ
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទី)	_____	២. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមនុទីពទេ្យ
ជាតិសុករកុនុងទឹកនាម	_____	៣._____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមនុទីពទេ្យ
ជាតិប្រូតអើនកុនុងទឹកនាម	_____	៤. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមនុទីពទេ្យ
អាការៈហើម	_____	
អាការៈវីកសរសៃឈាម	_____	សមគ្គាល់៖ បុរសិនមានបីមានសុនាមរបួសមិនដឹងមូលហាតេ្បសង្ស័យថាទទួលរងអំពីហិង្សាកុនុង គ្រូសារសូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ ពុរមទាំងបំពញេតារាងវាយតមលគ្រៃះថ្នាក់នដែ អំពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និតតវៃាន (តារាង TIPVDA សូមមីលទំព័រទី២២៥)
		មនុទីពទេ្យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ_____
		ថ្ងៃត្រៃត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលីកកុរាយ_____

កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យ៖_____ថ្ងៃទី _____ខែ_____ឆ្នាំ អាយុគភ៌៖សប្តាហ៍ _____ សប្តាហ៍
១.អ្នកមានផ្ទៃពោះដឹងដាយខ្លួនឯង ☐ ចញ្ចេឈាម ☐ ឈឺពោះ ☐ ឈឺក្បាល ☐ ជំងឺរួញខ្លួនconvulsions
អ្នកអាចកត់ត្រាសំនួរដលែអ្នកចង់សួរគ្រូពទេ្យនាពលេត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅទីនេះ
_____

កត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យមុនពលេបុរសូត		លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យមុនពលេបុរសូត
ទម្ងន់(kg)	_____	☐ គ្មានអាការៈពិសេស
សម្ពាធឈាម (mmHg)	_____	☐ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬបុរការមិនបុរកុរដី
បុរវៃងហាតសុបូន(cm)	_____	១. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមនុទីពទេ្យ
ចង្វាក់បេះដូងរបស់គភ៌(ដង/នាទី)	_____	២. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមនុទីពទេ្យ
ជាតិសុករកុនុងទឹកនាម	_____	៣._____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមនុទីពទេ្យ
ជាតិប្រូតអើនកុនុងទឹកនាម	_____	៤. _____ ☐ ត្រូវតាមដាន ☐ ត្រូវផ្ទេរមមនុទីពទេ្យ
អាការៈហើម	_____	
អាការៈវីកសរសៃឈាម	_____	សមគ្គាល់៖ បុរសិនមានបីមានសុនាមរបួសមិនដឹងមូលហាតេ្បសង្ស័យថាទទួលរងអំពីហិង្សាកុនុង គ្រូសារសូមធ្វើការរាយការណ៍ទៅតាមការកំណត់ ពុរមទាំងបំពញេតារាងវាយតមលគ្រៃះថ្នាក់នដែ អំពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និតតវៃាន (តារាង TIPVDA សូមមីលទំព័រទី២២៥)
		មនុទីពទេ្យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ_____
		ថ្ងៃត្រៃត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលីកកុរាយ_____

生產紀錄

（請醫護人員協助填寫）

分娩時間	年　月　日　時　分			
妊娠週數	週（　月）			
生產方式	☐ 1. 陰道生產　☐ 2. 產鉗 ☐ 3. 真空吸引　☐ 4. 剖腹產　☐5. 其他			
	特別事項記錄			
出生狀況	性別		胎數	
	體重	公克	身長	公分
	頭圍	公分		
	特別狀況記錄			
出生處所	名稱：			
	地址：			

出院的叮嚀

已指導的事項：☐避孕方法(202頁) ☐預防嬰幼兒感染百日咳（164頁）。
☐母乳哺育(170頁) ☐認識產後憂鬱症及防治（146頁）。
☐產後4-6週接受產後檢查 ☐產後3個月後子宮頸抹片檢查（158頁）

其他叮嚀事項：

1. 新生嬰兒健保單一窗口作業

   各地產科醫療院所為辦理新生兒通報，將會徵詢父母新生嬰兒依附投保及申請健保卡意見。嗣後新生嬰兒於戶政事務所出生登記後，健保署會主動完成新生嬰兒投保手續及通知投保單位，並將健保卡寄送被保險人。想了解更多，請上健保署網頁：「一般民眾」/「投保服務」/「新生嬰兒通報登記投保單一窗口作業」。

2. 在臺灣地區出生的外國籍新生嬰兒，於取得居留證明文件後，自出生日在臺連續居留滿6個月或曾出境一次未超過30日，其實際居住期間扣除出境日數後，併計滿6個月之日起參加全民健康保險。

準媽媽請記得接受健康諮詢喔！

កត់ត្រាការប្រសូត
(សូមគ្រូពេទ្យជួយបំពេញ)

វេលាប្រសូត	ថ្ងៃខែឆ្នាំម៉ោងនាទី			
មានផ្ទៃពោះសហគ៌	សប្បដា(ខែ)			
វិធីប្រសូត	☐ ១,ប្រសូតដាយធម្មជាតិ ☐ ២,ក្បាច ☐ ៣,ហូម ☐ ៤,រះពោះ ☐ ៥,ដទៃ			
	កត់ត្រាបុរកាពិសេស			
លក្ខណៈនៅពេលប្រសូត	ភេទ		ទារកទី	
	ទំងន់	កុរាម	បុរវែង	សម
	ទំហំក្បាល	សម		
	កត់ត្រាលក្ខណៈពិសេស			
មន្ទីរប្រសូត	មាៈ			
	អាស័យដ្ឋាន			

យាបល់របស់មន្ទីពេទ្យ

បុរការដលែធ្លាប់ណានាំ

☐វិធីការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រទ២០៣) ☐ បង្កាកុអកយថ្ងៃងនៃទារក(ទំព័រទី១៦៥)
☐ បំបៅដោះ (ទំព័រទ១៧១) ☐ យល់ដឹងនិងបង្កាជំងឺផ្លូវចិត្ត(ទំព័រទី១៤៧)
☐ ត្រួតពិនិត្យកុរាយពលេបុរសូតហាន៤-៦សប្បដា
☐ ការពិនិត្យកាសិកាកស្បូន (Pap smear) កុរាយពលេសមុរាល៣ខ(ទំព័រទី១៤៧)

កំណត់ចំនាំផ្សេងទៀត:

១.ការ ថ ទាំ សុខភាព ទារក ទីបនឹង កីត បុរតិ ប តុដិ ការ បង្អុច តៃ មួយវិទ្យាស្ថាន វជ្រេជ សា សុរត ផ្នែក សមុភព នា ជុំវិញ សន្ទនិសីទ ចំណាច ទាញ ដលែ ទីប នឹង កីត នឹង ពិគ្រាៈ ជា ឪពុក ម្តាយ នៃ ការ ធានា រ៉ាប់រង ទារក និង អនុវត្ត សមុរាប់ មតិយោបល់ ដលែ ហាន តុជាប់ កាត ធានារ៉ាប់រង សុខភាព ។នាយកដ្ឋាន នេះ នឹង ធ្វើ ផ្តួ ច ផ្តើ ម ដីមូបី បញ្ចប់ ការ ថ ទាំ សុខ ភាព សមុរាប់ នីតិវិធី ធានា រ៉ាប់រង ទារក ដលែ ទីបនឹង កីត និង ការ ជួន ដំណឹង ដល់ អង្គភាព គាល ន់ យា ហាយ , កាត ធានារ៉ាប់រង សុខភាព និង បញ្ជូន ទៅ ធានា រ៉ាប់ រង នេះ ។ដីមូបី សុរង្គែយល់ បន្ទូថមែ សូម ទស្សនា វ ប សាយ របស់ កុរស្ទង ញ្ជី របស់ : / "ការ ផ្តល់ សវា ធានា រ៉ាប់ រង លី " "សាធារណៈ ជន ទូទៅ " "ការងារ ចុះ ឈ្មោៈ នៃ ទារក ដលែ ទីបនឹង កីត ហាន ធានា រ៉ាប់ រង ទំនាក់ ទំនង បង្អុច តូ្រ មួយ ។" /

២.ទារក ដលែ មាន សញ្ជាតិ បរទេសដលែ ទីបនឹង កីត ដលែ កីត នៅ កុនុង កាៈ តវ៉ាន់ ដីមូបី ទទួល ហាន ការ សុនាកនា បន្ទូទាប់ ពី ឯកសារ គាំទ្រ ពី កាល បរិច្ឆទេ កំណើត នៃ លំនៅ ដ្ឋាន ជា បន្ទុត នៅ កុនុង បុរទេសតវ៉ាន់ ជាង បុរាំមួយ ខែ ឬ នៅ ពលេ ដលែ ពលេ វលោ ដលែ ការ ចាក ចញ នេះ មិន លើស ពី ៣០ ថ្ងៃ បន្ទុទាប់ ពី ការ ដក នៃ លំនៅ ដ្ឋាន ពិត បុរាកដ កុនុង អំឡុង ពលេ ការ ចញ ដំណើរ របស់ ពួក គេ អស់ រយៈពលេ ជាច្រើន ថ្ងៃ មក ហើយផុតកំណត់ ៦ ខែ ពី កាល បរិច្ឆទេ នៃ ការ ចូលរួម កុនុង ធានារ៉ាប់រង សុខភាព ជាតិ ។

សូមអ្នកមុតាយចងចាំសីបសូរសុខភាពណា!

戒菸轉介同意書

衛生福利部國民健康署

戒菸服務合約醫事機構轉介戒菸專線服務中心

同意書

0800-63-63-63 戒菸專線服務中心

「戒菸專線服務中心（以下簡稱本中心）」為衛生福利部國民健康署為協助有意戒菸的朋友，委託財團法人張老師基金會透過專業諮詢人員，提供一對一的電話戒菸諮詢與諮商服務。

為確保所提供服務之品質，讓服務能更符合您的需要，本中心將於獲得您的簽署同意後，先以電話與您聯繫，徵詢您的需要後，免費提供您所需的「電話諮詢」、「電話輔導」、「活動通知」、「戒菸手冊」等服務。

若您同意接受本中心的服務，本中心將秉持專業保密原則，妥善處理包括您的姓名、背景與相關的個人資料，這些資料也絕不會洩漏或用於其他用途，請放心。

感謝您的支持與協助，並祝您身體健康！

衛生福利部國民健康署委辦「戒菸專線服務中心」 敬啟

我已詳細地閱讀本同意書，我同意接受_____機構的轉介，接受戒菸專線服務中心的諮詢、諮商及相關服務；我完全瞭解接受此項服務是自願的，而且可隨時在告知戒菸專線服務中心後，停止接受各項服務。

姓名：_____（請簽名）

聯絡電話：_____（手機）、_____（市話）

中華民國　　年　　月　　日

※ 戒菸服務合約醫事機構請將資料造冊並以e-mail方式寄至「戒菸專線服務中心」，紙本資料請院所自行保留。相關流程以及格式，請參考本中心網站（www.tsh.org.tw）之「轉介同意書下載」→「轉介流程說明」。

※ 如有疑問，請洽(02)2886-6363轉502

※ 服務時間：週一至週六 早上9:00－晚上9:00

លិខិតយល់ព្រមផ្តួរមន្ទីពេទ្យតមហារី

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពបុរជាពលរដ្ឋ

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពបុរជាពលរដ្ឋ

0800-63-63-63 戒菸專線服務中心

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពបុរជាពលរដ្ឋ

លិខិតយល់ព្រម

(មជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់តាមទូរស័ព្ទ)ជាមន្ទីសុខាភិបាលមន្ទីសុខភាពដ៏មានប្រយោជន៍តែមានបំណងចង់តមហារី,មន្ទីបានអាយសុទ្ធតែកាន់អ្នកឯកទេសនៃមូលនិធិគ្រូចាង,បើសេវាកម្មបណ្តាញទូរស័ព្ទពិគ្រោះពិបញ្ហាតមហារី។

ដើម្បីគុណភាពនៃសេវាកម្មដែលបានផ្តល់អាយ,អាយសេវាកម្មកាន់តែស្រួលទៅតាមដំរូវការរបស់លោកអ្នក,មជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំក្តាយពលេទទួលបានហត្ថលេខាយល់ព្រមរបស់អ្នក,និងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអ្នកជាមុន,ក្តាយពីសុរងែយល់ពីដំរូវការលោកអ្នក,ផ្តួលន្លូវសេវាកម្មមួតគិតថ្លៃដែលអ្នកសេវាកម្ម(ពិគ្រោះតាមរយៈទូរស័ព្ទ),(បង្រៀនតាមរយៈទូរស័ព្ទ),(ជួនដំណឹងកម្មវិធី),ផ្តញ្ជីរ(សៀវភៅតមហារី)។ល។

បុរស្ថិនបីលោកអ្នកយល់ព្រមទទួលសេវាកម្មមនមែជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំ,មជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំនឹងកាន់តុប្តាប់គាលការណ៍ឯកទេសរក្សាអាថ៌កំបាំង,រក្សាឯកសារទាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះរបស់អ្នក,ប្រវត្តិនិងឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក,ឯកសារទាំងនេះបុរាកដជាមិនលចេចញេទៅខាងក្រៅឬបុរិបុរាស់លីអ្វីផ្តួសងេទ,សូមទុកចិត្តត។

ថ្លងែអំណរអគុណទៅដល់ការគាំទ្រនិងជំនួយរបស់លោកអ្នក,ហើយជូនពរលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ!

វីឡែងដាយ(មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបណ្តាញទូរស័ព្ទតមហារី)នកៃ
ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពបុរជាពលរដ្ឋ

ខ្ញុំហានអានលិខិតយល់ព្រមនេះលុអ៊ិតលុអន់ហើយ,ខ្ញុំយល់ព្រមទទួលផ្តួរតាមរយៈមន្ទីពេទ្យ_____,ទទួលសេវាកម្មទាក់ទងទៅនឹងការពិគ្រោះពីភាក្សាពីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំណាដាញទូរស័ព្ទតមហារី,ខ្ញុំហានយល់ដឹងដាយច្បាស់លាស់ហើយយល់ព្រមទទួលសេវាកម្មមនេះដាយខ្លួនឯង,ហើយអាចបដិសេធមិនទទួលសេវាកម្មរាល់បុរការហានគ្រប់ពលេវលោ,ក្នុងពលេបុរាប់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តាញតមហារី។

ឈ្មោះ_____ សូមចុះហត្ថលេខា
ទូរស័ព្ទ៖_____(ទូរស័ព្ទដៃ),_____(ទូរស័ព្ទកុនុងតំបន់)
ថ្ងៃទីខែឆ្នាំតវ៉ាន់ _____(ឆ្នាំ)_____(ខែ)_____(ថ្ងៃ)

※ ក្រសួងសុខាភិបាលនិងការមានបំរីសេវាបញ្ឈប់ការជក់ហារីសូមផ្ញើឯកសារទៅតាមe-mailអាយ"មជ្ឈមណ្ឌលពុយាហាលបញ្ឈប់ការជក់ហារី", ឯកសារជាកុរដាសសូមមនុទីរពទេយរក្សាទុកដាយខ្លួនឯង។ទមុរង់ និងដំណើរការដលែពាក់ព័នុធផ្តួសងេៗសូមយាងទៅតាម "កិចុចពុរមពុរៀងនតៃារបញ្ជូនផ្តួលាស់បុដ្ឋូរ" → "សចេកុដីបញ្ជាក់នតៃារបញ្ជូនផ្តួលាស់បុដ្ឋូរ" នតៃេហាទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំ (www.tsh.org.tw)
※ បុរស្ថិនបីមានចម្ងល់ សូមទំនាក់ទំនង (02)2886-6363 ភ្ជាប់ 502
※ វលោបើរសេវាកម្ម-ថ្ងៃច័នុទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពុរឹកម៉ាង9:00ដល់យប់ម៉ាង9:00

轉介單

戒菸服務合約醫事機構戒菸專線服務中心申請書

（由戒菸服務合約醫事機構自行存檔備查）

轉介單位				轉介日期		
機構代號				聯絡電話		
轉介聯絡人				傳真電話		
基本資料	姓名		性別	□男 □女	出生	年 月 日
	身分證字號		身分	□一般 □孕婦(懷孕 週)		
	聯絡方式	電話				
		手機				
		地址	（ ）郵遞區號			

抽菸狀況	1. 起床後多久抽第一支菸？	□5分鐘內 (3) □5-30分鐘 (2) □31-60分鐘 (1) □60分鐘後 (0)
	2. 在禁菸區不能吸菸會讓你難忍受嗎？	□是 (1) □否 (0)
	3. 哪根菸是您最難放棄的？	□早晨的第一支菸 (1) □其他 (0)
	4. 您一天最多抽幾支菸？	□31支以上 (3) □21-30支 (2) □11-20支 (1) □10支或更少 (0)
	5. 起床後幾小時內是你一天中抽最多支菸的時候嗎？	□是 (1) □否 (0)
	6. 當您嚴重生病，幾乎整天臥床時還吸菸嗎？	□是 (1) □否 (0)
	總 分	共＿＿＿＿＿＿分

លិខិតផ្ដូរទីកន្លែង

លិខិតស្នើសុំខុសសែផៅក្រសួងស្ថាប័នដែលទាក់ទងនឹងការមានបើសផៅបញ្ឈប់ការជក់បារី

(ដាយទុកឯកសារយោងទៅអនាគតដាយក្រសួងស្ថាប័នដែលទាក់ទងនឹងការមានបើសផៅបញ្ឈប់ការជក់បារី)

ទីកន្លែងផ្ដូរ				ផ្នែកផ្ដូរទីកន្លែង		
លេខអង្គការ				ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ		
អ្នកទំនាក់ទំនងផ្ដូរទីកន្លែង				ទូរលេខទូរស័ព្ទ		
ឯកសារមូលដ្ឋាន	ឈ្មោះ		ភេទ	☐ ប្រុស ☐ ស្រ្តី	កើត	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
	អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខ		ខ្លួន	☐ ធម្មតា ☐ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ (មានផ្ទៃពោះ សប្តាហ៍)		
	វិធីទំនាក់ទំនង	ទូរស័ព្ទទត្ថ				
		ទូរស័ព្ទដៃ				
		រលោងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង	( )លេខប្រៃសណីយ			

ស្ថានភាពជក់បារីមានពិន្ទុសរុប	១.ជក់បារីទី១ក្រោយពេលប៉ុន្មាននាទីពីពេលភ្ញាក់ពីដំណេក?	☐ 5នាទី (3) ☐ 5-30នាទី (2) ☐ 31-60នាទី (1) ☐ ក្រោយពេល60នាទី (0)
	២.តើអ្នកពិបាកទ្រាំទនៅពេលដែលមិនអាចជក់បារីនៅទីហាមមិនអោយជក់បារី?	☐ មែន (1) ☐ មិនមែន (0)
	៣.បារី១ណាដែលអ្នកពិបាកបោះបង់ជាងគេ?	☐ បារីទី១នៅពេលព្រឹម (1) ☐ ផ្សេងៗ (0)
	៤.អ្នកជក់បារីប៉ុន្មានដើមក្នុង១ថ្ងៃ?	☐ ច្រើនជាង31ដើម (3) ☐ 21-30ដើម (2) ☐ 11-20ដើម (1) ☐ 10ដើមឬតិចជាងនេះ (0)
	៥.ក្រោយពេលភ្ញាក់ពីដំណេក,ក្នុងរយះពេលប៉ុន្មានម៉ោងណាជាពេលដែលអ្នកជក់បារីច្រើនជាងគេក្នុង១ថ្ងៃ?	☐ មែន (1) ☐ មិនមែន (0)
	៦.នៅពេលដែលអ្នកឈឺធ្ងន់,ដេកលើគ្រែពេញ១ថ្ងៃតើអ្នកជក់បារីទេ?	☐ មែន (1) ☐ មិនមែន (0)
	ពិន្ទុសរុប	សរុប______ពិន្ទុ

贏在起跑點

懷孕期間媽媽的心境變化，會影響到胎兒，因此懷孕期間，隨時保持平靜愉快的心情，是非常重要的。

Q&A

Q：透過產前檢查，可以知道寶寶的狀況嗎？

A：懷孕6-8週可以由超音波看到心跳。懷孕12週以上，就可以用都卜勒儀器由準媽媽腹部聽到胎兒的心跳聲。第一胎的話，18-20週就可以感受到胎兒的移動，第二胎更早，可能16週就可以感受到嘍！

Q：胎位於何時方有意義？

A：在懷孕七個月以前，羊水較多，胎兒較小，胎位時有變更。七個月後，胎位固定大部分頭部朝下，以利生產。

ឈ្នះក្នុងចំនុចចាប់ផ្តើមវត់

នៅពេលមានទំងន់ទឹកចិត្តមុតាយប្រែប្រួល អាចជះឥទ្ធិពលដល់កូនក្នុងផ្ទៃយ៉ាងទៀតភាពរីករាយក្នុងពេលពពោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។

Q&A

Q សំនួរៈឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យមុនកើត អាចដឹងពីសារភាពកូនដល៏ទេ?

A ៦-៨ ស បុតា ហ៍ នៃ ការ មាន ផ្ទៃពោះ អាច ត្រួ ហាន មីល ឃីញ ដាយ អក្ខ ដីម្បី ងា ក់ បៈ ដួង ហាន ។មាន មនុស្ស ជាង ១២ ស បុតា ហ៍ នៃ ការ មាន ផ្ទៃពោះ , អ្នក អាច ប្រឹ ឧបករណ៍ ដាប់ បុលឺ ដាយ មុតាយ ងា ក់ បៈ ដួង របស់ ទារក ហាន ពួ ពោះ នេះ ។កូន ដំបូង ,បន្ទាប់ មក , ១៨-២០ មួយ ស បុតា ហ៍ អ្នក អាច មាន អារម្មណ៍ ចលនា ទារក កុន្នុង ផ្ទៃ, កូន ទី ពីរ កាល ពី ពេល ប្រាំមួយ ស បុតា ហ៍ប្រហៃលៃ ជា គាត់ អាច មាន អារម្មណ៍ ចលនា ទារក !

Q សំនួរៈចំណុចនផ្ទៃពោះពេលណាមានន័យ?

A ចំលើយៈការពពោះមុខរយៈ៧ខៃ ទឹកភ្លាៈមានច្រើន ទារកតូចជាង ផ្ទៃពោះពេលខ្លៈរីកធំ។ក្នុាយ ពេលហានរយៈពេល៧ទៅ ផ្ទៃរៃបស់មុតាយកំណត់កន្លងៃ ភាគច្រើនផ្ទៃកែកុហាលរបស់ទារកចុះទៅក្រាម ដីម្បីងាយស្រួលក្នុងការកើត។

遠離先天性疾病

☆ 海洋性貧血

臺灣常見的單基因遺傳性疾病之一，大約有6%的人為帶因者，身體狀況通常與一般人類似。分為甲型或乙型，夫妻若為同型帶因者，則每次懷孕，其胎兒有1/4機會罹患重型海洋性貧血，會危及準媽媽或胎兒之生命及健康，甲型重型患者於胎兒時期便會出現胎兒水腫(hydrops fetalis)，而乙型重型患者將須終生輸血、施打排鐵劑來維持生命。

因此，孕婦在第一次產檢時，應接受「孕婦海洋性貧血篩檢」，透過產檢中常規血液檢查，發現「平均紅血球體積」較小的準媽媽及準爸爸，並安排接受後續的帶因者確診；若夫婦為同型海洋性貧血帶因者，則應進一步接受胎兒的產前遺傳診斷及遺傳諮詢。(孕婦海洋性貧血篩檢流程請參閱第90頁)

☆ 唐氏症

唐氏症是一種最常見的染色體異常疾病，也是導致智能障礙的最主要病因；平均每800位孕婦，就可能有一位會懷有唐氏症胎兒。唐氏症篩檢則是一種用來估計胎兒罹患唐氏症風險的檢測，若篩檢結果為高風險者，則建議應接受絨毛取樣或羊膜穿刺檢查，以確定胎兒是否為唐氏症患者。

現行的唐氏症篩檢有兩種方式，分別為：第一孕期(11-14週)母血唐氏症篩檢，以超音波檢查胎兒頸部透明帶和鼻樑骨，並抽取孕婦血液進行血清標誌分析，此項檢查可檢出82%-87%的唐氏兒；第二孕期(15-20週)母血唐氏症篩檢，則是完全抽取孕婦血液進行血清標誌分析，此項檢查可檢出60%-83%的唐氏兒。

專家建議年齡滿34足歲之孕婦，曾生產過染色體異常胎兒，或家族成員有染色體異常者，可直接接受羊膜穿刺術檢查以診斷胎兒是否為唐氏症患者；而34歲以下的孕婦則可先接受兩種唐氏症篩檢之一，唐氏症篩檢結果若為高風險者，則應進一步接受絨毛取樣或羊膜穿刺檢查，以確定胎兒染色體是否異常。

若您對唐氏症與唐氏症篩檢有任何不明白之處，請與您的主治醫師討論，並遵從專業的醫療建議及指示。

ឃ្លាតឆ្ងាយពីការឆ្លងជំងឺពីកំណើត

រាគខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហម

តាំងពីគឺជាតំបន់បុរេភព១នម្ងៃលហាតេនជំងឺឆ្លង មានអ្នកផ្ទុកជំងឺបុរមាណ៦% មានសុខភាពមីលទាំដូចមនុស្សធម្មតាយ៉ាងអញ្ចឹង។វាបង្កែចកែជាបុរេភទទី១និងទី២ បុរសិនបីបុគ្គលិនិងបុរេពនុឋមានជំងឺនេះបុរេភទេដូចគ្នា នារាល់ការពេពាះរបស់គនើងមានភាគរយ ១/៥ដលែអាចឆ្លងជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហម អាចប៉ះពាល់ដល់សុតុរីដលែតៀមកុលាយជាម្តាយទៅរកកុនុងផ្ទៃបោន ចំនកែអ្នកផ្ទុកជំងឺបុរេភទេទី២វិញ គឺតូរ្វធ្វើការចាក់បញ្ចូលគ្រាប់ឈាមអស់មួយជីវិត និងធ្វើការចាក់បញ្ចូលសាធាតុជុសដេ្ឋងដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិត។

ដូចនេះសុតុរីពពាះទាំងអស់គួរធ្វើការទទួលយកការពិនិត្យរាគខ្វះគ្រាប់ឈាមនាពលេដលែធ្វើការពិនិត្យការឆ្លងទន្ទលេីកដំបូង ឆ្លងតាមការពិនិត្យគ្រាប់ឈាមអ្នកដលែជិតកុលាយជាឪពុកមីម្តាយឃើញមានបញ្ហាខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមនា: គួរធ្វើការពិនិត្យសនុនិដ្ឋានជំងឺមុតងទៀត បុរសិនបីបុគ្គលិបុរេពនុឋមានលក្ខណៈបុរេភទេជំងឺខ្វះឈាមក្រហមដូចគ្នា គួរធ្វើការពិនិត្យការឆ្លងជំងឺនាៈទៅកាន់ទារកនិងសុរែងយល់ពីពឥមានលំអិតមុនពលេកីត។(ដំណាក់កាល ការពិនិត្យជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមតាមលំដាប់លំដាយ សូមអានទំព័រលេខ 91)

ជំងឺDown's syndrome

ជំងឺDown's syndrome គឺជាជំងឺនភោពមិនបុរក្រតីនក្រៃមូសូម ក៏ជាមូលហាតេុដលែបណ្តាលអាយមានឧបសគ្គនភោពបញ្ញាផងដរែ ជាមធ្យមកុនុងចំណាមសុតុរី៨០០នាក់គឺមានសុតុរីមុនាក់មានកូនដលែមានជំងឺ Down's syndrome នាកុនុងផ្ទៃ។ជំងឺ Down's syndrome ការពិនិត្យតាមដ្ឋានជំងឺ Down's syndrome ក៏ជាផ្នកែមួយកុនុងការយ៉ាន់សុមាននការេទទួលរងគ្រាៈនគែ្រាៈថ្នាក់ដលែបណ្តាលមកពីជំងឺ Down's syndrome នេះផងដរែ បុរសិនបីពិនិត្យទៅមានអាការៈធ្ងងន់ធ្ងរ សូមមតេ្តាធ្វើការពិនិត្យរាមទន់និងសុបួនសុតុរីអាយហានទាន់ពលេ ដីម្បីអាយចុបាស់ថាទារកកុនុងផ្ទៃមានឆ្លងជំងឺនាៈដរែឬទេ។

ការពិនិត្យជំងឺ Down's syndrome ឥទ្ធរែនេះអាចធ្វើការបង្កែចកែជា២របៀបគឺៈការពិនិត្យជំងឺលីកទី១ (ចាប់ពី១១ទៅ១៤សបុតាហ៍) ដាយធ្វើការពិនិត្យអក្លេជ្ននកែក និងឆ្អឹងចុរមុៈទារកកុនុងផ្ទៃ ហើយធ្វើការបូមឈាមសុតុរីជាម្តាយដីម្បីធ្វើការវិនិចុ្ឆយ ការពិនិត្យបបែននេះគឺអាចពិនិត្យឃើញពី៨២ទៅ៨៧ភាគរយ ការពិនិត្យជំងឺ Down's syndrome (ពី១៥ទៅ២០សបុតាហ៍) ហើយធ្វើការពិនិត្យតាមការបូមឈាមសុតុរីមុតាយតម្លែយមុខគត់ ការពិនិត្យនេះអាចបញ្ចហាញជំងឺ Down's syndrome ហានពី៦០ទៅ៨៣ភាគរយ។babies with Down syndrome.

អ្នកឯកគុតទសេហានបុរាប់ថាសុរតីដលែមានអាយុគ្រប់៣៥ ដលែធ្លាប់មានកូនមានអាការៈក្រូមូសូមនិងបុរក្រតី រឺមានសមាជិកគ្រួសារមានបញ្ហាភាពមិនបុរក្រតីនក្រៃមូសូមនា: អ្នកអាចធ្វើការពិនិត្យរាមទន់និងសុបួនដីម្បីធ្វើការវិភាគមីលថាតីទារកកុនុងផ្ទៃរបស់អ្នកមានជំងឺ Down's syndrome ដរែឬអត់? ចំនកែឯសុរតីដលែមានផ្ទៃពោះមានអាយុក្រាម៣៥ឆ្នាំរឺញអាចធ្វើការជ្រើសរើសវិធីពិរយ៉ាងកុនុងចំណាមការបង្ការជំងឺ Down's syndrome ក្រាយពលេពិនិត្យជំងឺបុរសិនបីអ្នកមានជំងឺ Down's syndrome ធ្ងងន់ធ្ងរនាៈអ្នកគួរធ្វើការពិនិត្យរាមទន់និងពិនិត្យសុបួន ដីម្បីដឹងចុបាស់ថាទារកកុនុងផ្ទៃមានភាពមិនបុរក្រតីនក្រៃមូសូមដរែឬអត់។

បុរសិនបីអ្នកមិនយល់គុរង់ចំនុចណាមួយកុនុងបញ្ចហាជំងឺ Down's syndrome សូមធ្វើការពីគ្រាៈជាមួយគ្រូរពេទ្យរបស់អ្នក ហើយធ្វើតាមការនាំាពិនិត្យរបស់អ្នកជំនាញ។

孕婦海洋性貧血篩檢流程



註：

1. MCV為「平均血球體積」、MCH為「平均血球血紅素」
2. HbA2為「血紅素A2」、Ferritin為「含鐵蛋白」
3. 衛生福利部國民健康署資格審查通過之海洋性貧血基因檢驗機構：臺灣大學醫學院附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、柯滄銘婦產科診所、長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、成功大學醫學院附設醫院、慧智醫事檢驗所等7家機構。

ការពិនិត្យជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមតាមលំដាប់

ការពិនិត្យជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមតាមលំដាប់

ការពិនិត្យឡើងវិញ ពេល១០០ឆ្នាំម ៣ខែ

ការពិនិត្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជំនាក់កាលដំបូងតាមរយៈការពិនិត្យឈាម

MCV>80fl និង MCH>25pg

MCV≤80fl រឺ MCH≤25pg

ការពិនិត្យឈាមទូទៅ

MCV>80fl និង MCH>25pg

MCV≤80fl រឺ MCH≤25pg

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានសភាពធម្មតា (ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ MCV>80fl និង MCH>25p ≤បុគ្គលមិនចាំបាច់ធ្វើការពិនិត្យ)

ស្ត្រីដូលៃមានសភាពមិនប្រក្រតី (ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ MCV≤80fl រឺMCH≤25pg≤បុគ្គលMCV>80flនិងMCH>25pg)

បុគ្គលិនិងប្រពន្ធមានអាការៈមិនប្រក្រតី (ទាំងបុគ្គលិនិងប្រពន្ធប្រុសមួយត្រូវMCV≤80fl រឺ MCH≤25pg)

គ្រូមានការហាមឃាត់អំពីការបង្កើតកូនដូលៃមានជំងឺខ្វះឈាម

បុគ្គលប្រពន្ធបន្តធ្វើការពិនិត្យសន្ទនិដានតាមរយៈការងារបូមឈាមconfirmation.

ការពិនិត្យនិងវិនិច្ឆ័យមរោគ HbA2 ، Ferritin

ជំងឺខ្វះឈាម ខ្វះជាតិដែក

ការព្យាបាលដោយការចាក់ថ្នាំ ការពិនិត្យឡើងវិញ

ម្ល៉ូលហេតុជំងឺប្រភេទទី១

ម្ល៉ូលហេតុជំងឺប្រភេទទី២

បុគ្គលិនិងប្រពន្ធបន្តអនុកមានជំងឺប្រភេទដូចគ្នា

កូនបន្ទាប់

ការពិនិត្យសុខាភាពទារកក្នុងផ្ទៃពោះ (ពិនិត្យតាមទន ពិនិត្យសូបូន ពិនិត្យទារកតាមរយៈការបូមឈាម)

ការវិនិច្ឆ័យនឈាម

ការពិនិត្យ ជីវិនអរ

សំគាល់៖

១. តាំង MCV ជា"មធ្យមភាគនចំណុះគ្រាប់ឈាម"MCH"មធ្យមភាគគ្រាប់ឈាមមានធាតុដែកែ"

២. តាំង HbA2 ជា"ធាតុដែកែកន្លងគ្រាប់ឈាមA2"Ferritin"ប្រូតេអីនមានជាតិដែកែ"

៣. សុថាប័នពិនិត្យហ្វាស់នៃជៃម្ប៉ី thalassemia ដូលៃហានឆលងឯកាត់ការតួតពិនិត្យទូលសុគាល់ពីទីសូនាក់ការសុខភាពប្រជាជននកៃសួងសុខាភិបាលនិងរបបសង្គមៈ១.មនុទីពេទ្យបន្ទះនពិទ្យាសុថានវជ្ជសាស្ត្រជននសៃភាកលវិទ្យាល័យពតង៉ន២.មនុទីពេទ្យបន្ទះនសៃភាកលវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រជននិងវជ្ជសាស្ត្រជីន៣.មនុទីសមុភាហ៊ាងម៉ាង៤.មនុទីពេទ្យឆាងកឹងសុភាកលីនខ្លាងកៃមុបហ៊ិនសុខាភិបាលឆាងកឹង៥.មនុទីពេទ្យចុងហើនសៃភាកលវិទ្យាល័យវជ្ជសាស្ត្រដការសុង៦.មនុទីពេទ្យបន្ទះនពិទ្យាសុថានវជ្ជសាស្ត្រជននសៃភាកលវិទ្យាល័យឆ្លងកុងនិង៧.មនុទីពិនិត្យវជ្ជសាស្ត្រដហ្វាយជំ។

常規檢查

Q&A

Q：B型肝炎篩檢？

A：

1. B型肝炎病毒主要是藉由體液或血液，經由親密接觸、輸血、注射等途徑而傳染，一般可分為垂直傳染(指帶原的母親在生產前後將B型肝炎病毒傳染給新生兒)和水平傳染(含有病毒的血液或體液透過皮膚或粘膜進入體內而感染，如輸血、共用針頭或注射器、…都可能感染)兩類。

2. 由於受B型肝炎病毒感染時的年齡愈小，愈容易成為慢性帶原者，母嬰間的垂直感染，是臺灣地區B型肝炎盛行的重要原因，40-50%的帶原者是經由此途徑傳染。早期的預防接種能有效預防B型肝炎的感染，為截斷母嬰垂直感染，政府於民國73年7月起，針對母親為B型肝炎表面抗原陽性之新生兒接種B型肝炎疫苗。此外，若媽媽為高傳染性B型肝炎帶原者(e抗原陽性)，嬰兒於出生後另儘速接種1劑B型肝炎免疫球蛋白。並自民國75年7月起全面對新生兒實施B型肝炎疫苗接種。

3. 但因高傳染性B型肝炎帶原(e抗原陽性)媽媽所生的寶寶，在完成B型肝炎免疫球蛋白(HBIG)及3劑B型肝炎疫苗後、仍有約10%可能成為慢性帶原者，增加了肝功能異常、猛爆性肝炎及未來發展成肝硬化、肝癌之機率。為及早發現這些寶寶的B型肝炎預防接種成效與感染狀況，儘速採取後續補接種與追蹤措施，政府自民國99年9月起提供媽媽為e抗原陽性的幼兒(97年7月以後出生者)，在滿12個月大時，進行B型肝炎表面抗原(HBsAg)及B型肝炎表面抗體(anti-HBs)檢測，為了維護愛兒的健康，請一定要記得帶寶寶去醫院診所檢查喔。

4. 另對於原有之B型肝炎帶原者，為降低肝硬化與肝癌之發生率，衛生福利部自民國92年10月起開始實施「全民健康保險加強慢性B型及C型肝炎治療試辦計畫」，期能使慢性肝炎患者，獲得積極治療之機會。因此亦請B型肝炎表面抗原陽性(或e抗原陽性)的準媽媽，產後別忘了依消化專科醫師的建議，定期進行相關追蹤檢查，寶貝自己的健康。

（資料來源：疾病管制署）

ការពិនិត្យទូទៅ

Q សំនួរៈការពិនិត្យជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបជោអ្វី?

A

១. មរោគរលាកថ្លើមប្រភេទបគឺឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ធាតុរាវនិងឈាម នោះគឺការប៉ះពាល់គ្នាក្នុងករណីស្និតស្នាល ការកាច់បញ្ចូលឈាម រឺការចំលងជំងឺដោយការហាញ់បញ្ចូលទឹកនមេរោគ ជាធម្មតាអាចបង្កែចកែជាការឆ្លងពីម្តាយទៅកូន(ជាការឆ្លងពីស្ត្រីជាម្តាយដលែចំលងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបទៅកូនមុនរឺក្រោយពលេកូនកីត)និងការឆ្លងតាមការប៉ះពាល់អ្នកជំងឺ(ជាការឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់នសោរធាតុរាវដលែមាននៅលើខ្លួនអ្នកជំងឺរឆ្លងតាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានរាងកាយនិងការឆ្លងតាមរយៈការបញ្ចូលឈាម ជាដើម...........សុទ្ធបតែអាចឆ្លងជំងឺបានទាំងអស់។)

២. ដោយសារអោយនកោរឆ្លងមរោគវីរុស B ជំងឺរលាកថ្លើមនៅមានទំហំតូចជាងយ៉ាងងាយស្រួលកាន់តច្រើនក្លាយទៅជារ៉ាំរៃជោមួយមនុស្សម្នាក់ដើម, ការបញ្ជូនបញ្ឈររវាងម្តាយនិងកូន, គឺជាហាតុផលសំខាន់សម្រាប់អត្រាប្រពោទ្បង់នជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នៅតវ៉ៅន់និងជា 40-50% នក្រែុមតន្ទរតីដឹមដលែជាតាមរយៈវិធីនេះ ការឆ្លងមរោគ។ ដើមការចាក់ថ្នាំបង្ការអាចការពារការឆ្លងមរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B, ម្តាយការបញ្ជូនបញ្ឈរកោត់ឱ្យខ្លីរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនសោធារណរដ្ឋចិននៅខកែក្កដា 73, ប្រឆាំងនឹងម្តាយរបស់ antigen ផ្ទរែលាកថ្លើមប្រភេទ B មានភាពសម្បូរបបែនកោរទំនាក់ទំនងជាមួយរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទារកវ៉ាក់សាំងនេះ។ លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើម្តាយគឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លងខ្ពស់ជាមួយនឹងមនុស្សដើម (antigen វិជ្ជមានអឡេចិត្រូនិ), ទារកផ្សងេទៀតបានឆាប់តាមដលែអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងថ្លើមប្រភេទ B immunoglobulin កំណើតមួយ។ និងការអនុវត្តតពេញលញេនកោរចាក់ថ្នាំបង្ការរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទារកក្នុង 75 ឆ្នាំចាប់តាំងពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅខកែក្កដា។

៣. ប៉ុន្តអ្នែកផ្ទុបជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទប(eវិជ្ជមាន)កូនដលែម្តាយកីតមក ទោះបីជាបានទទួលការបង្ការជំងឺគាលិកា (HBIG) និងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន៣ដងរួចរាល់ហើយក៏ដោយក៏នៅតមែានអាត្រា១០ភាគរយមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដដែរ បង្កើនភាពមិនប្រក្រតីនថ្ងៃលើម រលាកថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរនិងមានបញ្ហាថ្លើមផ្សងេៗទៀតនៅថ្ងខែាងមុខកីនលើងភាគរយនអ៊ែាត្រាមហារីចថ្លើម។ ដើម្បីធ្វើការការពារបញ្ហារលាកថ្លើមប្រភេទបហេនទាន់ពលេនិងដឹងពីសភាពជំងឺ សូមធ្វើការបង្ក្រប់ចំនួនការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះ ខឌែឆ្នាំម២០០០រដ្ឋាភិបាលជាតិបានផ្តល់ថ្នាំស៊ាំរាងកាយeវិជ្ជមានកូនរបស់ម្តាយ(អ្នកកីតមុនខឌែឆ្នាំ២០១០) នៅពលេដលែមានអាយុគ្រប់១២ខែ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យជាតិស៊ាំនប្រភេទជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទប(HBsAg)និងការពិនិត្យប្រព័ន្ធការពារក្នុងឈាម (anti-HBs) ដើម្បីធ្វើការថរែក្សាសុខភាពកូនអ្នក សូមចាំមថាត្រូវយកកូនៗទៅកាន់ភ្នាក់ងារពិនិត្យសុខភាពណា។

៤. ក្រៅពីនេះដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាកីតជម្ងឺក្រិនថ្លើម និងជម្ងឺមហារីកថ្លើមនបៃុគ្គលផ្ទុកជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទB ក្រសួងសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថម្ភបានដាក់អនុវត្តដ "ផនែការសាកល្បងពង្រឹងការព្យាបាលជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទBរ៉ាំរ៉ៃនិងជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទCរ៉ាំរ៉ៃនចៃានរ៉ាប់រងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ" ចាប់តាំងពីខតែុលាឆ្នាំ២០០៣នសាធារណៈរដ្ឋចិន ដោយសង្ឃឹមថាអ្នកជម្ងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ នឹងទទួលបានឱកាសព្យាបាលវិជ្ជមាន។ហាតុនេះក៏សូមឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដលែមាន អង់ទីសនផ្ទៃនជៃម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទB វិជ្ជមាន (ឬអង់ទីសនeវិជ្ជមាន) ធ្វើការពិនិត្យតាមដានក្រោយពលេសម្រាលទៅតាមដំបូន្មានរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នកែប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដើម្បីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

(ប្រភពឯកសារផ្តល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល)

常規檢查

Q&A

Q：為什麼懷孕期間要避免感染德國麻疹？

A：1. 德國麻疹又稱風疹，由德國麻疹病毒引起，經由飛沫或接觸感染。一般人感染此症通常只持續1到3天，症狀輕微且無後遺症，但懷孕3個月內的孕婦萬一被感染，她的胎兒有高達90%的機會受到感染，且有25%以上的機會會產生先天性德國麻疹症候群(CRS)、或造成死胎、早產的情形，缺陷之嚴重程度和感染時機有密切關聯，懷孕愈早期感染，其所引起之缺陷愈嚴重。懷孕第20週以後才得到感染，則生下畸形兒機會很小。

2. 預防德國麻疹最有效的方法就是接種疫苗，在國內，民國60年9月以後出生的女性，至少曾接種1劑德國麻疹疫苗或麻疹腮腺炎德國麻疹混合(MMR)疫苗。因此育齡婦女如不確定自己是否曾經接種過德國麻疹相關疫苗或具有德國麻疹抗體，建議於孕前健康檢查時，進行德國麻疹抗體檢測。如檢查結果呈陰性，應在懷孕前或產後儘速持德國麻疹抗體檢查陰性（－）證明，至各衛生所或預防接種合約醫院診所，接種1劑MMR疫苗(疫苗免費)。以確保懷孕期間均不會受感染。

（資料來源：疾病管制署）

ការពិនិត្យទូទៅ

Q&A

Q សំនួរ៖ហេតុអ្វីបានទើបត្រូវបង្ការការឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រិល?

A ១. ចំលើយ៖ ជំងឺកញ្ជ្រិលអាល្លឺម៉ង់ហៅកាត់ថាជំងឺកញ្ជ្រិល ជំងឺកញ្ជ្រិលនេះគឺបណ្តាលមកពីការឆ្លងមេរោគតាមរយៈមេរោគក្នុងខ្យល់និងការប៉ះពាល់ត្រូវមេរោគ។ ជាមធ្យមតាអ្នកដែលឆ្លងមេរោគប្រភេទនេះមានអាការៈស្រាលក្នុងកំឡុងរយៈពេលពី១ទៅ៣ថ្ងៃ ប៉ុន្តែប្រសិនបើចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះរយៈពេល៣ខែ ហើយឆ្លងជំងឺ ទារកក្នុងផ្ទៃនោះអត្រាដែលទារកឆ្លងជំងឺអាចមានទៅដល់៩០ភាគរយនៃការឆ្លងជំងឺ ហើយ២៥ភាគរយអាចមានឱកាសកើតជំងឺកញ្ជ្រិលប្រភេទ (CRS)ពីកំណើត ឬអាចបណ្តាលអោយទារកស្លាប់ក្នុងផ្ទៃ កើតមុនពេលកំណត់ កំរិតនៃការមិនប្រុងប្រយ័ត្នវាទាក់ទងទៅនិងការឆ្លងជំងឺយ៉ាងស្អិតរមួត ការឆ្លងមេរោគនៅពេលពោះកើតតែឆាប់វាបណ្តាលអោយមានកំហុសក្នុងការសំរាលកូនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ការឆ្លងមេរោគក្រោយពេលទារកក្នុងផ្ទៃមានរយៈពេល២០សប្តាហ៍ឡើងទៅ នោះអត្រានៃការកើតកូនមិនគ្រប់លក្ខណៈកាន់តែតិច។

២.វិធីបង្ការជម្ងឺកញ្ជ្រិលដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតគឺការចាក់ថ្នាំបង្ការ។ នៅក្នុងប្រទេស ស្ត្រីដែលកើតក្រោយខែកញ្ញាឆ្នាំ៩០នៃសាធារណៈរដ្ឋចិន យ៉ាងហោចណាស់ធ្លាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺកញ្ជ្រិល ឬថ្នាំបង្ការចម្រុះជម្ងឺកញ្ជ្រិលនិងជម្ងឺក្រឡទែន (MMR) ម្តងរួចមកហើយ។ហេតុដូចនេះស្ត្រីក្នុងវ័យបង្កកំណើតដែលមិនច្បាស់ថាខ្លួនធ្លាប់ចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺកញ្ជ្រិលឬមានអង់ទីករជម្ងឺកញ្ជ្រិលឬទេនោះ គប្បីធ្វើការពិនិត្យអង់ទីករជម្ងឺកញ្ជ្រិលក្នុងពេលធ្វើការពិនិត្យសុខភាពមុនពេលមានផ្ទៃពោះ។ប្រសិនបើការពិនិត្យមានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន សូមទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាព ឬមន្ទីរពេទ្យគ្លីនិកផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ដើម្បីចាក់ថ្នាំបង្ការ MMR ម្ដង (ថ្នាំបង្ការឥតគិតថ្លៃ) ដោយភ្ជាប់ទៅជាមួយនូវលិខិតបញ្ជាក់ការពិនិត្យអង់ទីករជម្ងឺកញ្ជ្រិលអវិជ្ជមាន (-) នៅមុនពេលមានផ្ទៃពោះ ឬក្រោយពេលសម្រាលកូន។ដើម្បីធានាបញ្ជៀសការឆ្លងក្នុងកំឡុងពេលមានគភ៌។

(ប្រភពឯកសារផ្តល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល)

常規檢查

孕婦乙型鏈球菌篩檢說明

目的

乙型鏈球菌是人類的腸胃道及泌尿道常見的細菌；為周產期嚴重感染之主要致病菌。亦為導致新生兒細菌感染疾病中最常見之細菌。約有18-20%孕婦產道帶有此一細菌。孕婦體內若帶有乙型鏈球菌而無進行篩檢和積極治療，則可能引起新生兒早發型乙型鏈球菌感染，可能進一步導致新生兒肺炎、腦膜炎、敗血症等重大併發症。經研究統計，新生兒感染乙型鏈球菌後導致神經系統後遺症者約15%；而新生兒感染死亡率約10至13%；早產兒感染死亡率高達20%。目前國際上預防新生兒早發型乙型鏈球菌感染症，主要採行之策略，以孕婦篩檢乙型鏈球菌，及針對確知孕婦有乙型鏈球菌帶菌狀況時，於待產時使用預防性抗生素治療。

檢查方法與時程

依據實證及先進國家(如：美國、加拿大)經驗，建議針對孕婦在懷孕35至37週期間進行乙型鏈球菌的培養篩檢。其檢查方法，係由醫師在孕婦的陰道及肛門採樣後，再將檢體送至合格的檢驗單位進行培養。約於一週內即可知道孕婦有無乙型鏈球菌之帶菌。若孕婦於尚未接受乙型鏈球菌篩檢前，出現早期子宮收縮或胎膜早破現象而住院者，除接受常規治療外，亦應於住院時，依醫師專業意見考慮接受乙型鏈球菌篩檢或使用預防性抗生素治療。

檢查結果與預防

如果孕婦經篩檢檢驗確知為乙型鏈球菌陽性時，毋須擔心害怕；醫師會進一步評估及於待產時提供預防性之抗生素治療(可由健保給付)，以降低新生兒感染。若孕婦曾有抗生素過敏經驗者，或懷孕期間有身體不適或疑問時，請告知並與醫師討論。

ការពិនិត្យទូទៅ

សេចក្តីនៅសុតីអំពីហាក់តរីបុរភទេទី២ដលៃបណ្តាលអាយសុតុរីមានផ្ទៃពោះឆ្លងជំងឺគាលបំណង

ហាក់តរីបុរភទេទី២នមៃរោគគឺជាមរោគដលៃមាននៅផ្ទៃកៃពៈវៀននិងផ្ទៃកៃតំរង់នាមជាមូលហេតុនកៃារចំលងជំងឺកុនុងរយៈពលេវៃង។ ក៍ជាមរោគដលៃតងៃតជួៃបបុរទេៈលីទារកទីបបុរសូតផងដរៃ។ ចុរកទុវាសំរាលកូនរបស់សុតុរីមានមរោគបុរភទេនេៈបុរមាណពី១៨ទៅ២០ភាគរយ។ បុរសិនបីសុតុរីមានផ្ទៃពោះមានហាក់តរីបុរភទេទី២ដលៃបណ្តាលអាយសុតុរីមានផ្ទៃពោះឆ្លងជំងឺហីយមិនហានធ្វើការពិនិត្យនិងពុយាហាលហានទាន់ពលេទ នោៈវាអាចបណ្តាលអាយទារកដលៃទីបនឹងកីតឆ្លងជំងឺនោៈដរៃ។បុរសិនបីសុតុរីមានផ្ទៃពោះមានជំងឺបុរភទេនេៈសូមធ្វើការពិនិត្យនិងពុយាហាលអាយហានទាន់ពលេ វាអាចបណ្តាលអាយទារកឆ្លងជំងឺរលាកសួត រលាកខួរ ខុរៈឈាមនិងអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាចុរនៃទៀត។យាងតាមការពិសាធ៍ហានអាយដឹងថាទារកដលៃឆ្លងជំងឺនេៈអាចបណ្តាលអាយមានសាភាពសុមារតីចុៈខុសាយបុរហាលៃ១៥% និងអត្តរាសុលាប់ដាយសារជំងឺបុរមាណជាពី១០ទៅ១៣% អត្តរាទារកកីតមុនកំណត់បុរហាលៃជា ២០%។ បចុចុបុបុននេៈបុរទេសេអនុត្តរាជាតិមានការយកចិត្តទុកុខដាក់ចំពៈការបុរយុទ្ធបុរឆាំងនិងជំងឺនទៅរកទីបកីត ការពិនិត្យសុវៃងរកមរោគដលៃធ្វើអាយមានជំងឺឆ្លងនិងធ្វើការពុយាហាលតាមរយៈការបុរីបុរាស់ថុនាំដលៃមានភាពបុរឆាំងនិងជំងឺជាកតុតាសំខាន់នកៃារពយាហាល។

វិធីពិនិត្យនិងការវិភាគការពិនិត្យ

យាងតាមភាពជាក់សុតងៃនិងបទពិសាធ៍នបៃណ្តាលបុរទេសេរីកចំរីននា។(ដូចជាៈបុរទេសេអាមធិច កាណាដា) ហានផ្តល់យាបល់ដល់ចំពៈសុតុរីដលៃមានការពពាៈរយៈពលេពី៣៥ទៅ៣៧ខអៃយចនេៈធ្វើការពិនិត្យសុវៃងរកមរោគជំងឺបុរភទេបដេលៃឆ្លងពិមុតាយទៅកូន។ និងវិធិពិនិត្យគឺដាយគ្លូពទេ្យធ្វើការពិនិត្យតាមរយៈបុរដាប់បនុតពូជរបស់សុរ្តីមានផ្ទៃពោះ បនុទាប់មកទីបបញ្ចូនទៅអាយកុនាក់ងារពិនិត្យសុរបលកុខណៈ។យើងអាចដឹងលិតផល់នកៃារពិនិត្យមរោគឆ្លងបុរភទេបដេលៃជាមរោគឆ្លងពិមុតាយទៅកូនហានកុនុងមួយសបុតាហ៍។បីសុតុរីមុនាក់មានផ្ទៃពោះមុនពលេដលៃមិនទាន់ហានទទួលយកការពិនិត្យហាក់តរីមានកីតឡើងនូវសុថានភាពសុបួនកនុតុរាក់មុនពលេភ្នាសរបស់ទារកបកៃមុនពលេកំនត់តូវទៅសំរាកពទេ្យកុរាពីទទួលយកការពិនិត្យតាមកុបួនពលេសំរាកពទេ្យគួរសុដាប់តាមដំបូនុមានគ្លូពទេ្យឯកទេសេពិចារណានិងទទួលយកការពិនិត្យហាក់តរីឬបុរីថុនាំផ្សៈពុយាហាលនិងការពារ

លទ្ធផលពិនិត្យនិងការបង្ការ

បុរសិនបីសុតុរីមានផ្ទៃពោះចុហាស់ថាខុលួនមានមរោគឆ្លងបុរភទេបនេៈមានលកុខណៈវិជ្ជមាននាៈ សូមកុំបារមុតគ្លូពទេ្យនិងបនុតធ្វើការប៉ាន់សុមាននិងផ្តល់ថុនាំការពារបុរឆាំងនិងមរោគនិងពុយាហាលនាពលេរង់ចាំមសំរាល់កូន(អាចហាត់បង់តាមរយៈការធានាសុខាភាព)ដីមុបីកាត់បនុថយការឆ្លងជំងឺទៅដល់ទារកទីបនិងកីត។ បុរសិនបីសុរ្តីមានផ្ទៃពោះធ្លាប់មានបុរតិកមុមអាលាក់សី រីសុរ្តីមានផ្ទៃៈពៈ មានចំងល់ និងសុខភាពមិនលុអនាៈ សូមធ្វើការជំរាបនិងពីគុរាៈជាមួយគ្លូពទេ្យ។

常見的非常規檢查

Q&A

Q：什麼是第一孕期、第二孕期母血唐氏症篩檢？

A：現行的唐氏症篩檢有兩種方式分別為：第一孕期(11-14週)母血唐氏症篩檢，以超音波檢查胎兒頸部透明帶和鼻樑骨，並抽取孕婦血液進行血清標誌分析，此項檢查可檢出82%-87%的唐氏兒；第二孕期(15-20週)母血唐氏症篩檢，則是完全抽取孕婦血液進行血清標誌分析，此項檢查可檢出60%-83%的唐氏兒。

Q：為什麼要做妊娠糖尿病篩檢？

A：1. 屬於糖尿病高危險人口群的孕婦（如：肥胖症、高血壓、高血脂症、近親罹患糖尿病、曾有妊娠糖尿病史、曾有多囊性卵巢症、曾有早產、死產、巨嬰症等生產史）、應於確知懷孕時及早自費接受妊娠糖尿病篩檢。其他非屬糖尿病高危險人口群的孕婦，需要時，於懷孕24-28週接受妊娠糖尿病篩檢確診之妊娠糖尿病孕婦，於產後6-12週應再次接受篩檢，評估是否會發生或發展成典型糖尿病。

2. 孕婦如果有妊娠糖尿病，罹患子癲前症的風險會增加，另外也可能會造成胎兒過大，以及因為胎兒過大而剖腹生產或發生生產併發症的機會上升，亦或有新生兒血糖過低或呼吸系統問題，所以在懷孕24-28週時可以抽血檢查，若超過標準值，就要在孕期與醫師及營養師配合，做飲食或藥物控制，以增進母嬰健康。

Q：什麼是羊膜腔穿刺檢查？

A：可以檢查胎兒的染色體是否異常，宜在懷孕16週以後做檢查。建議高齡孕婦(34歲以上)、超音波檢查異常、母血唐氏症篩檢結果為高危險群、曾生育先天異常胎兒及有家族史的準媽媽們，可以做這項檢查。

ការត្រួតពិនិត្យទូទៅ

Q ធ្វើតេស្ត Down's តាមរយៈសម្លែមមាតានៅក្នុងដំណាក់កាលទីមួយ ទីពីរនៃការមានផ្ទៃពោះគឺអ្វី?

A ចំលើយ៖ ការពិនិត្យជំងឺ Down's syndrome បច្ចុប្បន្ននេះបង្កើនភាពជាពិរោះ គឺមានពីនិត្យជំងឺ Down's syndrome កុនុងរយៈពេលមានផ្ទៃពោះទី១(ពី១១ទៅ១៤សប្តាហ៍) ដោយធ្វើការពិនិត្យផ្នែកកនិងនិងឆ្អឹងច្រមុះរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃតាមរយៈការពិនិត្យអកូ និងធ្វើការជួសឈាមសុរតីមានផ្ទៃពោះមកពិនិត្យកំណត់និចិ្ចយការពិនិត្យបបែនេះអាចរកឃើញកូនដលែមានជំងឺ Down's syndrome ហានពី៨២ទៅ៨៧% ការពិនិត្យជំងឺ Down's syndrome កុនុងរយៈការពទី២ (ពី១៤ទៅ២០សប្តាហ៍) គឺជាការពិនិត្យតាមរយៈការជួសឈាមសុរតីមានផ្ទៃពោះទាំងសុរងដីម្បីធ្វើការពិនិត្យវិនិចិ្ចយអតុតសញ្ញាណ ការពិនិត្យបបែនេះអាចរកឃើញទារកមានជំងឺ Down's syndrome ហានពី៦០%ទៅ៨៣%។

Q សំនួរេហតុអ្វីតូ្រវធ្វើការពិនិត្យជំងឺទឹកនាមផ្អែមនៅពេលចាប់ផ្តើមមានផ្ទៃពោះ?

A ១. ជា កមុមសិទ្ធិ របស់ ក្មុម បុរជាជន ដលែ មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ នៃ សុតិ្ត ដលែ មាន ផ្ទៃពោះ មាន ជំងឺ ទឹកនាម ផ្អែម (ដូចជា : ជំងឺ ធាត់ ជំងឺលើសឈាម ធំធាត់ ជិតសុនិទ្ធ ជាមួយ នឹង អ្នកមាន ទឹកនាម ផ្អែម មាន បុរតុតិ ជំងឺ ទឹកនាមផ្អែម ពេល មាន ផ្ទៃពោះ ធ្លាប់ដុះសាច់ក្នុងដសៃ្បូនធ្លាប់សំរាលកូន មិន គ្រប់ ខែ ទារក សុលាប់ កុនុង ផ្ទៃ ទារកធំហួស -ល-) , គួរ តរ ចំណាយ ផ្ទាល់ ខ្លួនកុនុងការ តាមដាន ជំងឺ ទឹកនាម ផ្អែម អំឡុង ពេល មាន ផ្ទៃពោះ មាន ផ្ទៃពោះ ។ជា កមុមសិទ្ធិ របស់ ក្មុម បុរជាជន ដលែ មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ នៃ សុតិ្ត ដលែ មាន ផ្ទៃពោះ មាន ជំងឺ ទឹកនាម ផ្អែមនៅពេល ដលែ ចាំបាច់២៤-២៨ ដីម្បី ទទួល យក ការ តាមដាន ជំងឺ ទឹកនាម ផ្អែម អំឡុង ពេល មាន ផ្ទៃពោះ ដលែ មាន ផ្ទៃពោះ ។ដីម្បីទទួលយកការតាមដានជំងឺទឹកនាមផ្អែមអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះដលែមានផ្ទៃពោះ។ ការិនិចិ្ចយការកត ជំងឺទឹកនាមផ្អែមនសៃ្តរីមានផ្ទៃពោះ គួរធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនាពេលកូនកតហើយរយៈពេលពី៦ទៅ១២សប្តាហ៍ ដីម្បីអាយចុបាស់ថាមានការកតជំងឺទឹកនាមផ្អែមមែនការិវឌ្ឍន៍នជំងឺនាដលែឬទេ។

២. សុតិ្ត មាន ផ្ទៃពោះបុរសិនបើ អ្នក មាន ជំងឺ ទឹកនាម ផ្អែម អំឡុង ពេល មាន ផ្ទៃពោះ ងាយ និងទទួលរងនិងគ្រះថ្នាក់ជំងឺលើសឈាមនាពេលមានផ្ទៃពោះក្រាពី នេះ ទៀត អាច ប ណ្តា ល ឱ្យ ទារក មាឌធំ ពេក ពុរមទាំងដាយ សារ តរ ទារក ធំ ពេក កតដាយវិធីវះឬធ្វើអាយមានផលវិបាកនានាកាន់តមែន កន ចុរនឡើង ឬ ទារក មាន បញ្ហាជាតិសុករក្នុងឈាមតិចពេកឬ មានបញ្ហាកុនុងការដកដង្ហើមដូចនេះហើយ នា កុនុង ២៤-២៨ ស បុតា ហ៍ នៃ ការ មាន ផ្ទៃពោះ អាចធ្វើការជួស ឈាមពិនិត្យមើល ប្រសិន បើ វា លើស ពី ស្តង់ ដារ កំនត់ គួរតសៃ្រវជាវមួយអ្នកជំនាញសារជាតិចិញ្ចឹមអាយពេល មាន ផ្ទៃពោះប្រើអារហារីចុនាំមកទប់សុកាត់ដីម្បី កនៃលមុអ សុខភាព មាតា និង ទារក ។

Q សំនួរេអ្វីទៅជាការពិនិត្យទារកតាមរយៈសុបួនសុរតី?

A អាច ពិនិត្យ មើល ថា តើ ក្មរម៉ូសូម របស់ ទារកមានភាពប្រក្រតីធមុមតាដរែឬទេគួរ ធ្វើ ការពិនិត្យមើលចាប់ពីពេល មានផ្ទៃពោះ ១៦ ស បុតា ហ៍ ឡើងទៅ។យើងណានៅសុតិ្ត មាន ផ្ទៃ ពៈនាវែយចំណាស់(លើសពី ៣៤ ឆ្នាំឡើងទៅ) , ការពិនិត្យមើលតាម អ៊ុ ល តរា ពិនិត្យឃើញ អា ការមិនធមុមតា ដាយ មុតាយមានជំងឺសុករក្នុងឈាមក៏តខ្ពស់ ធ្វើអាយមានលទ្ធផលគ្រះថ្នាក់ជាខ្លាំង សំរាប់ ក្មុម គួរសារដលែ មាន តំណរត្រកូលកីតកូនមិនប្រក្រតីគួរធ្វើការពិនិត្យផ្នែកមួយនេះ។

產檢超音波篩檢說明

目的

產檢超音波篩檢是一種非侵入性的檢查，可用於測量胎兒的頭雙頂骨徑、腹圍與大腿長度等生長測量以及胎盤位置和羊水量的觀察。另有所謂胎兒超音波檢查(即所謂自費的高層次超音波)，可對於胎兒的器官做有系統的掃描。

原理與特性

超音波是一種人類耳朵聽不到的聲波，需要水及軟組織做為傳導介質，超音波無法穿透骨頭也可能受到空氣阻隔，因此檢查的準確性會有許多限制。若母親腹部脂肪組織太厚、胎兒趴臥、或骨頭阻擋，皆會造成許多器官無法判讀，而無法發現某些異常。另外，若羊水過多，會導致胎兒距離探頭過遠而影像不清；若羊水過少，則胎兒四肢重疊、阻礙聲波進入，均會減低檢查的準確性。

檢查結果

1. 產檢超音波是一種篩檢方法，並非最終診斷，檢查的準確性有其限制，主要目的在於評估胎兒生長發育的狀況，以及胎盤位置和羊水量等，並非所有的胎兒問題均可以透過超音波檢查出來。
2. 超音波的檢查報告，只能判讀為：在這個週數的檢查下，篩檢胎兒生長發育及胎盤位置有否異常的狀況。若沒有篩檢出異常狀況，並不代表胎兒就是完全正常、沒有疾病，因為有的胎兒疾病會在較大的週數、甚或出生後才出現，也有的雖然已出現，但超音波並無法診斷這類問題，而胎兒器官是否有異常則需執行胎兒超音波才能進一步評估。

Q&A

Q：超音波和X光一樣嗎？懷孕的時候照超音波會不會有危險？

A：超音波和X光不同，是靠音波反射，使體內軟組織顯現，並非游離性幅射。截至目前為止的研究顯示，診斷用的超音波對人體及胎兒未發現不良影響，世界醫用超音波生物醫學聯盟建議，超音波不應用於非醫療用途。亦不贊同超音波於提供胎兒紀念影像的用途。雖然目前的診斷超音波儀器沒有被確切證實會對患者造成生物效應，但未來仍存在發現這類生物效應的可能性。

ការពិនិត្យផ្ទៃពោះការបញ្ជាក់នៃការពិនិត្យអ៊ុលត្រាសាន

គោលបំណង

ការពិនិត្យផ្ទៃពោះការពិនិត្យអ៊ុលត្រាសានជាការពិនិត្យមិនមានការលូកចូលខាងក្នុងអាចប្រើអេក្រង់ដើម្បី វាស់ អង្កត់ផ្ចិត ក្រងរង៉ែឆ្អឹងក្បាល របស់ ទារកកផ្លូវ (សរសៃ) រង្វង់ ពោះ និងបរិវរង៉ែ ក្រលៅ និង កំណើន សដ្បេកិច្ច ដទៃ ទៀត និង ទីតាំង សង្កេត នៃ សុ ក និង បរិមាណ ទឹកភ្លោះ វាស់ របស់សង្កេតមើលៗពីមានការពិនិត្យអក្រូ ទារក មួយ ទៀត (ដែល គេ ហៅ អក្រូ កម្រិត ខ្ពស់ ដោយត្រូវ ការ ចំណាយ ជ្ទាល់ ខ្លួន) អាច សុកនេ ពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធ សរីរាង្គ របស់ ទារក ទាំងអស់។

សិក្ខាបទនិងលក្ខណៈពិសេស

អ៊ុ ល ត្រា សា នេះ គឺ ជាសំលេងដែល ត្រចៀក របស់ មនុស្ស មិន អាចស្ដាប់មិនហាន ត្រូវការទឹកនិងគាលិកា ទន់ដើម្បីបញ្ចូនទៅ អ៊ុ ល ត្រា សា មិន អាច ជ្រាប ចូលឆ្លងកាត់ ឆ្អឹង នោះទទួលរង ឧបសគ្គ ដោយសារខ្យល់ នោះដែរដូចនេះការ ពិនិត្យ មើលមាន ភាព តឹមត្រូវប្រភាពដនកំណត់ ។បុរសិន បី មុតាយមាន ខ្លាញ់ កនុង ពោះ ក្រាស់ពកេផ្ទៃអាយហាំងសុទ្ធះឆ្អឹងការដេកេតំរេត របស់ ទារក អាចប ណ្តា ល ឱ្យ សរីរាង្គ ជា ចូ្រន ដែល មិន អាចមើលច្បាស់ ដូចនេះហើយ អាចបណ្តាលអាយ មើលមិនឃើញសរីរាង្គណាមួយមិនប្រក្រតី។លើស ពី នេះ ទៀត ប្រសិន បី ទឹកភ្លោះ ចូ្រន ពកេ អាច ប ណ្តា ល ឱ្យ ទារក សុចិត នៅ ឆ្ងាយ និង រូបភាព មិន ច្បាស់ លាស់ ប្រសិន បី ទឹកភ្លោះ តិច ពកេ អវយវៈ ទារក ស្ទួត សឹ ត្តនា ធ្ងើ ឱ្យ រំខាន ដល់ការបញ្ចូល រលក សម្លេង ចូល និង កាត់ បន្ថយ ភាព ច្បាស់លាស់ នៃ ការ ស្ទួតពិនិត្យ ។

លទ្ធផលការពិនិត្យ

1. ការពិនិត្យផ្ទៃពោះអក្រូគឺជារិធីសាស្ត្រតការពិនិត្យមួយមិនមនែជាការធ្ងើការរិនិច្ឆ័យចុងក្រាយទគោលបា្រកដនែ ការពិនិត្យមានកំណត់សំខាន់គឺនៅលើការលូតលាស់របស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃដើម្បីវាយតម្លៃពីការរីកលូតលាស់និងទីតាំងសុកនិងទឹកភ្លោះ។ល។មិនមនែបា្រកដថាគ្រប់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃទាំងអស់អាចពិនិត្យអក្រូមើលបញ្ហាទ។
2. ការបញ្ជាក់ពីពិនិត្យអក្រូមានតមែួយគត់គឺ: ការពិនិត្យក្នុងចំនួនសបុតាហ៍នេះមានពិនិត្យការីកលូតលា ស់និងទីតាំងរបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃថៅតែ់សុថានភាពមិនប្រក្រតីទ។ ប្រសិនបើមិនមានសុថានភាពដែលមិនប្រក្រតីការពិនិត្យ, មិនមនែមានន័យថាទារកគឺជារឿងធម្មតាទាំងស្រុង, ជំងឺទពើពុភៈជំងឺរបស់ទារកមួយចំនួននៅក្នុងមួយចំនួនធំនសៃបុតាហ៍ឬសូមបើតលៃចេឡើងបន្ទាប់ពីកំណើត, ទោះបីជាមួយចំនួនហានជុសឡើងនោះទប៉ុន្តែអក្រូមិនអាចធ្ងើរាគារិនិច្ឆ័យនិងប្រភេទនបែញ្ចហានិងថាតើមានសរីរាង្គរបស់ទារកមិនធម្មតានេះត្រូវការដើម្បីអនុវត្តតអក្រូទារកនឹងការវាយតម្លៃបន្ថមែទៀត។

Q សំនួរ៖ម៉ាសីនអក្រូលនិងកាំមរសុមីអិចដូចគ្នាដែលើទ?ពលេមានទំង់ន់ធ្ងលុះអក្រូលមានគ្រាៈថ្នាក់ដែលើទ?

A ចំលើយ៖ម៉ាសីនអក្រូលនិងកាំរសុមីអិចមិនដូចគ្នាទ។ វាពឹងផ្អែកទៅលើការធ្ងលុះមកវិញដើមុបីមើលឈើញជុនកែទន់នងៃងកាយ គឺមិនមនែធ្ងើការប្រើប្រាស់ការវាស់តាមរយៈកំដៅនាៈឡើយ។សព្វថ្ងៃនៃរៈតាមការពិសាធន៍ហានអាយដឹងថា មិនមានការរកឃើញណាបង្កហាញថាមានផលប៉ៈពាល់ណាដល់ទារកក្នុងផ្ទៃដោយការធ្ងើការពិនិត្យអក្រូលនាៈឡើយ សមុព័ន្ធវជ្រជសាស្ត្រដជីវៈនប្រៃព័ន្ធអ្នគ្រាសានប្រើប្រាស់កុនុងវជ្រជសាស្ត្រដពិភពលាកហាននាៅថា អ្នគ្រាសានមិនគួរប្រើប្រាស់កុនុងគាលបំណងមិនមនែពុយាហាលឡើយ។ និងមិនគាំទ្រចំពោៈការប្រើប្រាស់អ្នគ្រាសានដើមុបីថតរូបគភិទុកជាអនុស្សាវីយ៍ឡើយ។ ចុ្រតែបិតបច្ចុប្បន្នបរិក្ខាពិនិត្យអ្នគ្រាសានមិនទាន់ត្រូវហានបញ្ជាក់ថាមានផលប៉ៈពាល់ជីវសាស្ត្រដដល់អ្នទកជមុងឺ ប៉ុន្តដនៅថ្ងៃអែនាគតលទ្ធភាពប្រទៈឃើញផលប៉ៈពាល់ជីវសាស្ត្រដនេះនឹងអាចកីតមាន។

胎兒超音波檢查說明

檢查上的限制

1. 胎兒的智商、視力、聽力、有無胎記、或有否生化代謝異常等，無法以超音波檢查出來。
2. 超音波無法取代羊膜穿刺，意即無法由超音波確切診斷有無唐氏症或其他染色體異常疾病。
3. 微小的胎兒缺陷無法完全辨識，例如：較小的心室中隔缺損、動脈弓狹窄或神經管缺損(通常位於尾脊皮膚的小破洞)。
4. 早期正常的胎兒檢查，並無法保證妊娠後期或出生時仍為正常，因為有許多特殊疾病出現於妊娠末期，甚至在出生後才開始發生或出現，故無法在早期（16-24週）即由超音波檢查發現所有胎兒疾病，同時也無法由單次檢查即斷言以後均不會有任何問題發生。
5. 由於胎兒常處於握拳或活動狀態，幾乎無法由超音波確切診斷指(趾)節異常。
6. 妊娠週數越大(>28週)時，因為胎兒在子宮無法完全伸展，骨骼肢體重疊，導致檢查效果較差。
7. 胎兒在子宮內的血液循環與出生之後的血液循環並不相同，導致一些先天性心臟疾病很難在出生前作診斷。

個別考量

1. 雖然政府有免費提供一次妊娠20週左右的產檢超音波篩檢，準媽媽們也可選擇進行自費的胎兒超音波檢查，但民眾有權利決定是否要接受這項檢查，即使做檢查，也有權利拒絕知悉某些檢查結果，例如有些民眾因為信仰或其他因素，不會因胎兒異常而選擇終止妊娠，或不希望知悉一些無法在母體內處理的問題，例如心臟瓣膜輕微的異常或兔唇。如果您有上述考量，請在檢查前主動告知醫師。
2. 超音波檢查發現的胎兒畸形，部分是目前醫療可以矯正，且不影響未來生長與發育的，例如唇顎裂、部分先天性心臟病等。故如果於產前檢查發現有胎兒畸形，建議諮詢相關專科醫師，以取得充分醫療資訊，作出適當的處置。
3. 若懷孕期間有身體不適或胎兒有特殊狀況，可與醫師討論檢查頻率及次數。
4. 胎兒超音波對於性別的判定有很高的不準確性，而且依規定不可用來判定胎兒性別，亦不可以因胎兒的性別而中止妊娠。

ការពិនិត្យអ៊ុលត្រាសានសុវងៃរកបកសុវាយ

ការកំនត់ការពិនិត្យ

១. បុរាជញ្ញា ការមីល ការសុតាប់ និងការកំណត់សន្ទនដូជានថាមានរឺកូន រឺមានភាពមិនបុរកុរតីក៏ត ឡឹងនាពលេកំពុងវិឌ្ឍន៍ជាដីមគឺមិនអាចផ្ទីការពិនិត្យតាមរយៈការពិនិត្យអក្ងេលឡ៏យ។

២. ការពិនិត្យអក្ងេលគកិមិនអាចយកមកជំនួសការពិនិត្យតាមសុបួនឡ៏យ ហ៏យការពិនិត្យអក្ងេ គឺមិនអាចផ្ទីការកំណត់រាគសញ្ញាជំងឺ Down's syndrome រឺជំងឺមិនបុរកុរតីនកៃ្ងមូសូមផ្ទសងេ ឡ៏យ។

៣. មិនអាចមីលដឹងពិកំហុសតូច ទាំងសុរុងឡ៏យ ឧទាហរណ៍ ៖ ថតនបៃេដូងមានកងុ្រេខាតបនតិ ចបនតួច សរសៃឈាមតូចចងុ្អតីកងុ្រេខាតនៃ សរសៃបុរសាទ។

៤. ការពិនិត្យផ្ទៃពោះដំបូងមានសភាពបុរកុរតីមិនអាចផ្ទីការសនុមត់ថាការវិឌ្ឍន៍របស់ទារកក្នុងផ្ទៃនិងពលេដលៃទារកកីតមកមានសភាពបុរកុរតីនាេឡ៏យ ពីពុរាេអាចមានភាពខុសពីធម្ម តាជាចុរនដលៃអាចកីតមានឡឹងនាពលេការវិឌ្ឍន៍នទៃារកចុងក្រយ នាក្រយពលេទារកកី តហ៏យទ៏បចាប់ផ្តីមមានអាការៈរឺទបសងុ្កតេយ៏ញ ដូចនេះមិនអាចផ្ទីការរកយ៏ញជំងឺទាំងអស់ របស់ទារកកុនុងផ្ទៃពោះកុនុងដំណាក់កាលដំបូងនាេឡ៏យ (ពី១៦ទ្រា២៤សបុតាហ៍) ក៏មិនអាចពិ និត្យយ៏ញរាល់ជំងឺទាំងអស់ឡ៏យ សុរបពលេនាេដលៃក៏មិនសំរេចការពិនិត្យសំរេចកុនុង ពលេតមែ្តងនាេទ។

៥. ដាយទារកកុនុងផ្ទៃតៃងៃកុតាប់ដរឺមានចលនាមិនឈប់ ផ្ទីរអាយសុទីរតមិនអាចផ្ទីការសនុនិដ្ឋ ហានហានតាមរយៈការពិនិត្យអក្ងេល។

៦. ការវិឌ្ឍន៍នទៃារកកាន់តធ្ងេ(>28 សបុតាហ៍) ដាយសារតទៃារកមិនអាចផ្ទីការល្ងតលាស់ហានទាំងសុ រុងនៅកុនុងសុបួន ផ្ទីរអាយឆុអឹងរាងគកាយតួរតលីគុនា បណ្តាលអាយផលនកៃារពិនិត្យចេយចុះ។

៧. ការផ្ទីចលនារបស់ទារកកុនុងសុបួននិងការផ្ទីចលនាក្រយពលេកីតគឺមិនដូចគនាទ, ដំងឺដលៃ បណ្តាលអាយមានជំងឺបេះដូងពីកំនីត ការពិនិត្យមុខពលេទារកកីតគឺពិហាកវិនិច្ឆ័យអាយហា នចុហាស់ណាស់។

ការគិតដាយឡកៃ

១. ទាៈ បី ជា រដុហា ភិ ហាល ហាន ផ្តល់ ជូនការពិនិត្យ ផ្ទៃពោះ ដាយឥតគិតថុលម្តែងង ពិនិត្យ អក្ងេ ផ្ទៃពោះ ស បុតា ហ៍>20 < ដូចុនេះ មុតាយ អាចន ផ្ទីរស រីស យក ការ ពិនិត្យ អក្ងេ ទារកផ្ទៃពោះ ដាយការចំណាយបុរាក់ ផ្ទាល់ ខ្លួន ប៉ុនតៃ បុរជាជន មាន សិទ្ធិ កុនុង ការ សមុរេច ចិត្ត ផ្ទីរសរីស ការ ពិនិត្យ , សូមុបី តការផ្ទីការ ពិនិត្យ ក៏មាន សិទ្ធិ កុនុង ការ បដិសធេការទទួលដឹងលទ្ធផលពិនិត្យឧទាហរណ៍ មនុស្ស មួយ ចំនួន ដាយសារតៃ ជំនឿ សាសនាឬ ដាយ សារ តៃកត្តា ផ្ទសងេ ទៀត មិន មនែ ដាយ សារ ទារកមានភាព មិន បុរកុរតី តូរវ បញ្ចប់ ការ មាន ផ្ទៃពោះ ឬ មិន ចង់ ដឹង អំពី បញ្ហា មួយ ចំនួន កុនុងខុលួន សុតុរី ជា មុតាយ ដូច ជា សនុះបេះដូងមានភាព មិន បុរកុរតី ឬ ឆបៃ បបូរមាត់ ។បុរសិន បី អុនក មាន ការពិចារណា ខាងលើ នេះ សូម ទទួល ផ្តល់ដំណឹងដល់ គូរពទេ្យជាមុន មុន ពលេ ដលៃ ការ ផ្ទីរ ការពិនិត្យ។

២. ការ ពិនិត្យ អ៊ុល ត្រា សា ហាន បង្ហាញ ថា ទារករាងចំលកៃមួយ ផ្ទនកៃនាេពទេ្យ វជ្រេជ សា ស្ត្រត អាច នឹង តូរវផ្ទីការកៃ ដំរូរ ហានដាយ មិន ប៉ះពាល់ ដល់ ការល្ងតលាសនាថ្ងៃ អនាគត ដូច ជា ឆបៃ បបូរមាត់ មានជំងឺ បេះដូង ពិ កំណីត ។បុរសិន បីពិនិត្យយ៏ញទារកមានរូបរាងចំលកៃ គូរតទៅសាកសួរពតិមាន ពិគ្រាៈ យាបល់ ជាមួយ អ្នក ជំនាញវជ្រេជសា ស្ត្រត ដាៈសុាយបញ្ហាអាយហានតុ្រមតូរវ ។

៣. បុរសិនបីកុនុងរយៈពលេមានផ្ទៃពោះមានអាការៈមិនសុរួលរឺទារកកុនុងផ្ទៃមានភាពខុសពីធម្ម តា អាចផ្ទីការពិគ្រាៈជាមួយគូរពទេ្យនិងផ្ទីការពិនិត្យអាយហានញ៊ឹកញាប់។

៤. ការពិនិត្យអក្ងេលមានភាពមិនចុហាស់លាស់កុនុងការបងៃកែភទេនទៃារកចុរិន ដូចនេះតាមការ កំណត់គឺមិនអាចយកការពិនិត្យអក្ងេលមកផ្ទីការវិភាគភទេរបស់ទារកឡ៏យ ក៏មិនអាចផ្ទីការ យកគកំចញេដាយសារភទេនទៃារកដរែ។

胎兒超音波檢查說明

Q&A

Q：什麼是3D/4D超音波檢查？

A：3D超音波可呈現出嬰兒的五官與立體的樣貌；4D超音波則是從靜態的影像變成動態的影片。3D與4D超音波，不是醫學診斷上的依據。（為自費）

Q：什麼是高層次超音波檢查？

A：坊間所稱高層次超音波即是對於胎兒的器官做有系統掃瞄的胎兒超音波，與目前產檢超音波使用的設備是相同的，均為2D超音波。準媽媽若經產檢超音波檢查發現可能有異常或有個人需求時，可依據個人情況與醫生進一步討論，是否要再進一步進行胎兒超音波檢查，並將由專業醫師根據臨床經驗與檢測技巧，對胎兒的頭頸部、胸部腹部器官、臍帶及四肢等項目進行精密的細部構造檢查，檢查時間約需要半小時至一小時。檢查週數建議於20-24週進行。(為自費)

ការពិនិត្យអ៊ុលត្រាសានសុវងែរកបកសុ្រាយ

Q សំណួរ៖ តើអ្វីជាការពិនិត្យអូលត្រាសាន 3D/4D?

A ចម្លើយ៖ ការពិនិត្យអូលត្រាសាន 3D អាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីមុខមាត់របស់កូន។ ការពិនិត្យអូលត្រាសាន 4D បំលែងពីរូបភាពអកមុម ទៅជាវីដេអូសកមុម។អូលត្រាសាន 3Dនិង 4D មិនសាកសមធ្វើជាសចេក្តីយោងនកែារវិនិចឆ័យវជ្ជសាសុ្រដឡើយ។(បង់ថ្លៃដោយខ្លួនឯង)

Q អ្វីទៅជាការពិនិត្យអក្ងេកមុ្រិតខ្ពស់?

A ការ ហៈពុមព្ន នៃ ការ ចាទ បុរកាន់ អក្ងេ កមុ្រិត ខ្ពស់ សរីរាង្គ របស់ ទារក នាៈ គឺ ដីមុ្បី ធុ្រី ការ សុកនេ អ៊ុ ល ត្រា សា ទារក បុរព័ន្ធ របស់ និង ឧបករណ៍ អក្ងេ បច្ចុប្បបន្ន ន៖ តុ្រវ ហាន បុ្រី សមុ្រាប់ ពិនិត្យ គឺ ដូចគ្នា ទាំង ពីរ អក្ងេ ២D ។បុរសិនបើ មុតាយ បន្ទាប់ ពី ការ ពិនិត្យ អក្ងេជុ្ទផ្ទៃពោះឃើញមានភាពមិនបុរប្រតី ឬ តមុ្រវការ បុគ្គល អាច ទៅពិភាក្សា បន្ទុថមែ ជាមួយ គ្រូពទេ្យ ដាយ ជុ្អកែ លើ សុ្ថានភាព ជា បុគ្គល ថា តើតុ្រវពិនិត្យ អក្ងេ ទារក បន្ទុថមែ ទៀត មុតង ទៀតទេ ហើយ ដាយ ជុ្អកែ លើ បទពិសោធន៍ និង ជំនាញ សាកលុ្បង ការ ពុយាហាល ទារកកុហាល និង ក ទុ្រង សរីរាង្គ ពៈ ដៃជើង និង គមុ្រាង ជុ្សងេ ទៀត ទងជុ្ចិត និង មាន ការ តុ្រួត ពិនិត្យ ពី រចនា សមុព័ន្ធ លមុអិត ចុហាស់លាស់ របស់គ្រូពទេ្យការ ពិនិត្យតុ្រវការយៈពលេកនុលៈ ម៉ាង ទៅ មួយ ម៉ាង ។ សូមពិនិត្យមើលចំនួនសបុតាហ៍គួរតចៅបជុ្តីមធ្យើនៅ សបុតាហ៍ ២០-២៤ ។(បង់ថ្លៃដោយខ្លួនឯង)

孕婦免費愛滋病毒篩檢服務

衛生福利部疾病管制署於九十四年一月一日起，於孕婦的產檢項目中增加每位孕婦乙次免費愛滋病檢查。本項篩檢併同初次產檢(標準抽血檢查項目：血型、Rh因子等)實施，以確保懷孕婦女及下一代的健康。為了寶寶的健康，每一位準媽媽都該毫不猶豫的接受愛滋病毒的篩檢，理由如下：

1. 愛滋病毒會透過母親懷孕胎盤、分娩過程和哺餵母乳等方式感染給寶寶。感染機率在30-45%之間。目前感染的愛滋寶寶，發現九成是因為媽媽在懷孕前不知道自己感染愛滋病，因為沒有事前預防治療，造成寶寶感染。
2. 目前已知有效的方法，包括：懷孕期間服用預防性抗反轉錄病毒藥物、剖腹產和使用母乳代替品哺餵，可以阻斷愛滋病毒傳染給小孩，感染機會從45%降至2%以下，同時經由藥物治療將有助於感染愛滋病毒母親的健康。
3. 愛滋病毒並不會選擇特定對象，每一個婦女，甚至只有固定單一性伴侶的婦女，都有感染的危險而不自知。要求性伴侶使用保險套是女性的權利，請保護自己免於感染愛滋病毒。藥癮者，切勿與他人共用針具、容器或是稀釋液，以免經由血液感染愛滋病。

Q&A

Q：愛滋病是什麼？

A：愛滋病又稱「後天免疫缺乏症候群」，人類感染愛滋病毒後通常不會立刻發病，可能在感染後六個月甚至長達十年或更久才有症狀發生。這種病毒會使人類失去抵抗病原體的能力，甚至喪失生命。

Q：愛滋病是如何感染？

A：1.性行為傳染：未採防護措施的性行為。
2.血液感染：如輸血、共用針具、容器或是稀釋液。
3.母子垂直感染：懷孕、生產及哺乳。

Q：如果有其他疑問或懷疑感染愛滋病毒時，誰能幫助我？

A：1.請撥打疾病管制署疫情通報及諮詢專線1922，將有專人提供諮詢服務。
2.請上疾病管制署網站http://www.cdc.gov.tw查詢。

孕婦免費愛滋篩檢同意書附於240頁。

សេវាពិនិត្យជំងឺអេដស៍ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងទារកដោយឥតគិតថ្លៃ

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥ក្រសួងគ្រប់គ្រងជំងឺសុខាភិបាលបានផ្តល់ជូនការពិនិត្យស្រាវជ្រាវរកមេរោគអេត៍ក្នុងរយៈពេលមានផ្ទៃពោះសម្រាប់ស្ត្រីពីដងដោយមិនគិតថ្លៃ។ ការពិនិត្យនេះធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយការពិនិត្យលើកដំបូង(ផ្នែកបូមឈាមពិនិត្យកំណត់ភាពជាក់លាក់ ៖ ប្រភេទឈាម) ដើម្បីការពារសុខភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកូនៗជំនាន់ក្រោយ។ ដើម្បីការពារសុខភាពកូនៗ ស្ត្រីដែលទើបក្លាយជាម្តាយគ្រប់រូបគួរទទួលយកការពិនិត្យស្រាវជ្រាវរកមេរោគអេត៍ដោយមិនមានមន្ទិលសង្ស័យ។ មូលហេតុមានដូចខាងក្រោម ៖

១. មេរោគអេត៍អាចឆ្លងតាមរយៈការមានផ្ទៃពោះរបស់ម្តាយ ការសម្រាលនិងការបំបៅដោះកូន វាធ្វើកូនអោយឆ្លងបាន។ អត្រាភាគរយនៃការឆ្លងមានពីចន្លោះ៣០ទៅ៤៥%។ ស្ត្រី៩០%មិនបានដឹងថាខ្លួនមានផ្ទុកមេរោគអេត៍ឡើយ ពីព្រោះមិនបានធ្វើការការពារជាមុនដែលធ្វើអោយទារកឆ្លងជំងឺនេះដែរ។

២. បច្ចុប្បន្ននេះគេមានវិធីល្អៗជាច្រើនដូចជា៖ មានដូចជាការប្រើថ្នាំការពារដែលមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគក្នុងពេលពពោះ ការសម្រាលកូនតាមពោះនិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួសការបំបៅដោះម្តាយ អាចជៀសវាងការឆ្លងជំងឺអេតពីម្តាយទៅកូនបាន អត្រាចំលងអាចមានពី៤៥ទៅ២ភាគរយចុះក្រោម ស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែលគេប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់ជំនួយសុខភាពស្ត្រីមានផ្ទុកមេរោគអេត៍។

៣. ជំងឺអេដស៍មិនរើសដៃគូរឡើយ រាល់ស្ត្រីទាំងឡាយ សូម្បីស្ត្រីដែលមានការរួមភេទជាមួយដៃគូរតែម្នាក់ក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺនេះដោយមិនដឹងខ្លួនដែរ។ ការស្នើអោយដៃគូប្រើប្រាស់ស្រោមការពារគឺជាសិទ្ធរបស់ស្ត្រី សូមការពារខ្លួនអ្នកកុំអោយឆ្លងជំងឺអេត៍។ ជនញៀនថ្នាំមិនត្រូវធ្វើការប្រើប្រាស់ម្ជុលសាកថ្នាំរួមគ្នាឡើយ ឧបករណ៍ផ្សេងៗនិងការប៉ះពាល់អ្វីផ្សេងៗទៀតជាដាច់ខាត ដើម្បីធ្វើការជៀសវាងពីការឆ្លងជំងឺអេត៍។

Q សំនួរ៖អ្វីទៅជាជំងឺអេត?

A ចំលើយ ៖ ជំងឺអេដស៍ក៏អាចហៅថា(ជាជំងឺធ្វើអោយបាត់បង់នូវធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធការពារជំងឺ)ពេលមនុស្សកើតជំងឺអេដស៍ជាធម្មតាគឺមិនមានលក្ខណៈជំងឺភ្លាមៗឡើយ វាអាចបង្ហាញអាការៈជំងឺក្រោយពេលឆ្លងជំងឺបាន៦ខែទៅ១០ឆ្នាំទើបមានរោគសញ្ញា។ មេរោគប្រភេទនេះអាចធ្វើភាពស៊ាំងនិងការពាររាងកាយចុះខ្សោយបាននឹងធ្វើអោយបាត់បង់ជីវិត។

Q សំនួរ ៖ តើការឆ្លងជំងឺអេដស៍ធ្វើឡើងតាមរយៈណា?

A ១. ការឆ្លងដោយការរួមភេទ ៖ ការរួមភេទដោយមិនបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយការពារ។
២. ការឆ្លងតាមរយៈឈាម ៖ ដូចជាការបញ្ចូលឈាម ការប្រើប្រាស់ម្ជុលចាក់រួមគ្នា សំភារៈវះកាត់ប្ដូរដោយបន្តពូជជាដើម។
៣. ការឆ្លងពីម្តាយទៅកូន ៖ ការមានផ្ទៃពោះ កើតកូន រឺការបំបៅដោះ។

Q សំនួរ៖ពេលដែលមានសំនួរសង្ស័យថាមានឆ្លងជំងឺអេដស៍ តើមាននរណាអាចជួយខ្ញុំបាន?

A ១. សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រសួងគ្រប់គ្រងជំងឺដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានរឺសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈលេខបណ្តាញ១៩២២ នឹងមានអ្នកជំនាញផ្តល់សេវាព័ត៌មាន។
២. សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រក្រសួងគ្រប់គ្រងជំងឺ http://www.cdc.gov.tw ដើម្បីស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានលំអិត។

កិច្ចព្រមព្រៀងនៃការពិនិត្យវីរុសអេដស៍ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ស្ត្រី ទំព័រ២៩១។



產前遺傳診斷與補助

新生兒為什麼會先天性異常？

新生兒先天異常的發生原因有很多種，包括染色體異常、單基因突變、多因子遺傳或環境因素等，然而仍有很多先天異常其發生原因尚不清楚。

為減少新生兒先天異常的發生，衛生福利部自優生保健法於民國74年公布實施以來，即積極推動產前遺傳診斷工作，以減少嚴重畸形兒的出生，減輕家庭及社會的負擔。

產前遺傳診斷常用的方法？

1. 第一孕期、第二孕期母血唐氏症篩檢。(可計算出異常的機率，但無法確診。)
2. 羊膜腔穿刺術。
3. 絨毛膜取樣術。
4. 臍帶血採樣術。
5 超音波檢查。(參考第102頁)

什麼人需要產前遺傳診斷？

1. 三十四歲以上孕婦。
2. 曾生育過先天異常兒者。
3. 本人或配偶有遺傳性疾病者。
4. 家族有遺傳性疾病者。
5. 其他可能生育先天異常兒之高危險群者，如：經超音波或孕婦血清篩檢胎兒有異常可能者。

全民健康保險有給付產前遺傳診斷嗎？

1. 全民健康保險並未給付產前遺傳診斷之費用，目前是由衛生福利部每年編列預算提供該項費用之部分補助，孕婦接受產前遺傳診斷者，仍然需要自付一些費用。有關政府補助或減免之金額，可洽詢採檢醫院或當地衛生局。

ការពិនិត្យនិងបំប៉ន់មុនពេលឆ្លងជំងឺ

ទារកទីបនិងកីតហេតុអ្វីមានភាពមិនប្រក្រតីតាំងពីចាប់កំណើត?

មូលហេតុដែលបណ្តាលអោយទារកកើតមកមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីពីកំនើតមានច្រើនយ៉ាង ប្លូករួមទាំងភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រូមូសូម មានភាពប្រែប្រួលនសៃនែ និងកត្តាចំលងជំងឺច្រើនរឺមូលហេតុនបៃរិសុទ្ធានជាដើម ម៉ុយាងទៀតនៅមានភាពមិនប្រក្រតីតាំងពីកំណើតដែលកើតឡើងដាយមិនអាចយល់ច្បាស់ពីមូលហេតុបាន។

ដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយអាត្រាកើតមាននទៅរកមិនប្រក្រតីពីកំណើត នៅឆ្នាំ១៩៨៥ទីស្តីការសុខាភិបាលបានប្រកាស់អនុម័តផនែការបស់ខ្លួន ជំរុញអាយមានការធ្វើការពិនិត្យរាគវិនិច្ឆ័យនកែារឆ្លងជំងឺមុនពេលកើតទារក ដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយការកើតទារកមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង និងកាត់បន្ថយបញ្ហាអំរកេនគ្រួសារនិងសង្គម។

តើមធ្យោបាយណាជាមធ្យោមបាយដែលគេតែងប្រើប្រាស់សំរាប់ពិនិត្យរឺនិច្ឆ័យការឆ្លងជំងឺ

១. ការពិនិត្យជំងឺ Down's syndrome កុនុងដំណាក់កាលពពាះទី១ និងដំណាក់កាលពពាះទី២។ (អាចគណនាភាគរយនភោពមិនប្រក្រតីហាន ប៉ុន្តមែនអាចប្រាដកហានឡើយ។)
២. ការពិនិត្យស្បូនសុត្ថិមានផ្ទៃពោះ។
៣. ការពិនិត្យតាមស្បាមស្បូននិងរាមទន់របស់សុត្ថិ។
៤. ការយកឈាមមកពិនិត្យ
៥. ការពិនិត្យអក្ខែល (សូមអានទំព័រលេខ១០៣)

តើអ្នកណាខ្លះត្រូវការការវិភាគការឆ្លងជំងឺមុនពេលកើត?

១. សុត្ថិមានផ្ទៃពោះដែលមានអាយុចាប់ពីអាយុ៣៥ឆ្នាំទៅ។
២. ធ្លាប់កើតកូនមានអាការៈមិនប្រក្រតីតាំងពីកំណើត។
៣. បុគ្គលប្រពន្ធបជាអ្នកមានផ្ទុកជំងឺឆ្លង
៤. ក្រុមគ្រួសារមានជំងឺឆ្លង
៥. បុការផ្សងៗនកែារអាចមានកូនដែលមានសភាពមិនប្រក្រតីកុនុងចំណាមអ្នកមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា៖ ការពិនិត្យអក្ខែរឺផ្ទៃពោះអ្នកដែលអាចមានសភាពមិនប្រក្រតី។

តើការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលជាតិមានប្រយោជន៍ដល់ការវិភាគកំណត់ការឆ្លងជំងឺដែលឺទេ?

១. ការធានាសុខភាពប្រជាជនគឺមិនហានផ្តល់ជាបុរយោជន៍ដល់ការចំណាយសំរាប់ការធ្វើរាគពិនិច្ឆ័យនកែារឆ្លងជំងឺ សព្វថ្ងៃនៃះជារៀងរាល់ឆ្នាំតងែមានការឧបត្ថមុភពីទីស្តីការសុខាភិហាលផ្តល់ជំនួយនកែារចំណាយ សុត្ថិមានផ្ទៃពោះដែលទទួលយករាគវិនិច្ឆ័យមុនពេលសំរាលកូន គឺនៅតែត្រូវបង់បុរាក់នកែារចំណាយមួយចំនួនដាយខ្លួនឯង។ ចំពាៈការឧបត្ថមុភនិងការអនុគ្រាៈចំណាយផ្សងៗ អាចធ្វើការពិគ្រាៈជាមួយគ្រូពទ្យឺអ្នកនាទីស្តីការសុខាភិហាលជាតិផ្ទាល់។

產前遺傳診斷與補助

2. 符合補助條件之孕婦，將由產檢醫院協助填寫產前遺傳診斷申請表；政府所提供之補助費用，會直接由產檢醫院協助您從自行負擔之費用中扣除補助費用，屆時您只要自付一些費用。如果您有任何疑問，請洽當地衛生局詢問。

哪裡可以獲得相關資訊？

除了主治的婦產科醫師會依個案情形提供相關遺傳諮詢，如有進一步的疑問，可以洽衛生福利部國民健康署審查通過的十一家遺傳諮詢中心尋求協助。

衛生福利部國民健康署審查通過之遺傳諮詢中心服務窗口	
臺灣大學醫學院附設醫院	02-23123456#71922、71923
臺北榮民總醫院	02-28712121#3292
馬偕紀念醫院	02-25433535#2547、2548
林口長庚紀念醫院	03-3281200#8544
臺中榮民總醫院	04-23592525#5938
中國醫藥大學附設醫院	04-22052121#2128
中山醫學大學附設醫院	04-24739595#20225
彰化基督教醫院	04-7238595#7244
成功大學醫學院附設醫院	06-2353535#3551
高雄醫學大學附設中和紀念醫院	07-3121101#7801
慈濟綜合醫院	03-8563092

តួរតពិនិត្យជំងឺឆ្លងមុនពេលបុរសូតនិងជំនួយ

២. សុរតីមានផ្ទៃពោះដលែសុរបតាមលកុខខ័ណ្ឌជំនួយ,មន្ទីពទេ្យតួរតពិនិត្យផ្ទៃពោះនឹងជួយបំពញេលិខិតសុទ្ធីសុំតួរតពិនិត្យជំងឺឆ្លងមុនពេលបុរសូត,ជំនួយដលែរដ្ឋាភិបាលផ្តល់អាយ,មន្ទីពទេ្យតួរតពិនិត្យផ្ទៃពោះនឹងហួតចញេតាមតំលតែ្លរតពិនិត្យ។បុរសិនបីអ្នកមានចំងល់,សូមទំនាក់ទំនងមន្ទីរសុខាភិបាលដលែអ្នករស់នៅ។

តីអាចទទួលបានពត៌មានតាមរយៈអ្វី?

វាពីផ្តល់ការបឹក្សាទាក់ទងនឹងរាគឆ្លងតាមតំណាដាយវជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសុតពនិងរាគសុត្ថិរ ចំពោះសំណួរបន្ថមែទៀតអាចសុំជំនួយបឹក្សាហាននាមជុំឈមណ្ឌលរាគឆ្លងតាមតំណា១១កន្លែង ដលែផ្តល់សវ៉ទ្ធដាយក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពបុរជាពលរដ្ឋ ។

បងអ្នចសរោក្តមុនមែជួយមណ្ឌលបឹក្សាជមុងឺតពូជ ដលែឆ្លងកាត់ការតួរតពិនិត្យពទីសុនាក់ការសុខាភិបាលបុរជាជននៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថមភ៍សង្គម	
មន្ទីពទេ្យនមែហាវិទ្យលយ័ពទេ្យវិទ្យាតវ៉ាន់	02-23123456#71922 and 71923
មន្ទីពទេ្យយុងមីងតបៃ	02-28712121#3292
មន្ទីពទេ្យម៉ាជាជីនាន	02-25433535#2547 and 2548
មន្ទីពទេ្យឆាងកឹងជីនានលីនខូវ	03-3281200#8544
មន្ទីពទេ្យយុងមីងថចែុង	04-23592525#5938
មន្ទីពទេ្យនមែហាវីទ្យាល័យពទេ្យចុងគ័	04-22052121#2128
មន្ទីពទេ្យនមែហាវីទ្យាល័យពទេ្យចុងសាន	04-24739595#32337
មន្ទីពទេ្យគ្រឹសុតចាងហ័	04-7238595#7244
មន្ទីពទេ្យនមែហាវិទ្យាល័យពទេ្យវិទ្យាឆឹងកុង	06-2353535#3551
មន្ទីពទេ្យចុងហឺជីនាននមែហាវិទ្យាល័យពទេ្យវិទ្យាកាសុង	07-3121101#7801
មន្ទីពទេ្យទូទាឈីជី	03-8563092

趕走對胎兒的不良影響

1. 菸害

根據世界衛生組織癌症研究總署，吸菸以及二手菸均為一級致癌物，請及早戒菸。

女性吸菸者增加罹患致死性慢性阻塞性肺炎、包括慢性支氣管炎與肺氣腫，吸菸增加女性許多癌症如口腔、咽喉、食道、喉頭、膀胱、胰臟、腎臟、子宮頸等癌症及急性髓質白血病、吸菸女性也與停經前乳癌有關。

孕婦吸菸或吸入二手菸，體內易殘留有高濃度尼古丁(nicotine)或其代謝物可丁尼(cotinine)，胎兒在這樣的子宮環境內發育，神經、消化系統和視力等也都會導致不同程度的影響，增加自然流產、先天畸形、早產及新生兒低體重的危險性，成長後罹患血癌的危險性較高。

如果父母習慣在室內或寶寶身邊吸菸，寶寶體內的可丁尼濃度會比不吸菸父母的寶寶高近50倍；即使父母至門外陽臺吸菸，寶寶體內的可丁尼濃度仍然為不吸菸父母的寶寶的7倍。

哺乳媽媽暴露在二手菸環境下，尼古丁代謝物可丁尼等有害物質，會經由人體進入母乳引發異味，讓寶寶變得不愛喝。另一方面，也會使母體賀爾蒙分泌異常，導致乳汁分泌不足。

吸菸或二手菸不但會提高孕婦血中鉛濃度，更會經由胎盤傳給胎兒，影響寶寶的智力發展。而尼古丁則會對胎兒尚在發育的耳內「神經傳輸器」造成傷害，影響聽力。

另外，研究證實，在家吸菸，會造成有毒物質在家中持續高濃度的殘留，即使菸已經熄滅很久了，這些物質仍會在家庭裡各種表面上（例如桌椅、地板、牆壁、衣櫥、澡盆、馬桶……家具）以微粒的形式，形成一層附著物；同時也可以附著於飛塵上；或成為揮發性的有毒複合物，經過數天、數周、數月，飄散到空氣中。吸菸一天，就可以在未來很長時間使出入於那個空間的人暴露到菸害。這些物質在低濃度就具有毒性，包括數種一級致癌物。

為了小寶貝，準爸媽趕快戒菸

若準爸媽想了解菸害與戒菸相關資訊，可向醫療院所洽詢並提供戒菸諮詢相關資訊，或洽戒菸專線、戒菸門診等服務(免費戒菸專線0800-63-63-63)。

*「戒菸專線服務中心」轉介流程及同意書附於82、84頁。

戒菸資訊

(1)二代戒菸，補助升級！免費戒菸諮詢專線： 0800-636363，網址：http://www.tsh.org.tw/

(2)全國超過3,000家戒菸服務合約醫事機構或藥局（查詢電話：02-2351-0120）

(3)洽各縣市衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務，可索取免費戒菸手冊

(4)健康九九網站戒菸教戰手冊下載，網址：http://health99.hpa.gov.tw

បណ្តញ្ជើការប៉ះពាល់ទៅដល់ទារក

១.ខ្លួចសុខភាពដាយសាហារី

យោងទៅតាមទីស្នាក់ការសុភវជ្ជរវជ្ជមុងឹមហារីកនអែងគការសុខភាពពិភពលាកហានឲ្យដឹងថា ការជក់ហារី និងផ្សងៃហារីគឺជាសារធាតុបង្កឲ្យមានមហារីកថ្នាក់ទី១ សូមផ្ដាច់ហារីឲ្យហានឆាប់។

សុតុរីជក់ហារីនឹងមានជំងឺរលាកសួតបុរតទេសុទ:ឬសុលាប់,រួមមានរលាកបំពង់ដង្ហើមនិងហើមសួត,ជក់ហារីបណ្តាលអាយសុតុរីមានជំងឺមហារីកជាច្រើនដូចជាមហារីកមាត់,បំពង់ក,បំពង់អាហារ,ដើមបំពង់ក,បុលាកនាម, លំពង៉ៃ,កុរលៀន,សុបូន។ល។និងជំងឺឈាមសបន្ទាន់,សុរតីជក់ហារីក៏ជាមូលហតេុបណ្តាលអាយមានជំងឺមហារីកដារៈមុនអស់រដូវ។

សុតុរីមានផ្ទៃពោះជក់ហារីឬនៅកុបអែុនកជក់ហារី,នឹងបន្សល់នីកូទីន(nicotine)និងកូទីនី (cotinine)កុនុងខុលួន,ទារកលូតលាស់កុនុងសុបូនរបៀបនេះ,សសបៃុសោត,បុរព័ន្ធរំលាយអាហារនិងកុនកៃ។ល។ក៏មានកំរិតប៉ះពាល់ខុសគុនាដរៃ,បណ្តាលអាយមានគុរ:ថុនាក់ដូចជារលូតកូន,កូនមានរូបរាងចំលៃក,តឹតមុនខនៃងមានទំងន់សុាល,កូននឹងមានគុរ:ថុនាក់ដាយសាជំងឺមហារីកឈាមនាអនាគត។

បុរសិនបើឪពុកមុតាយមានទំលាប់ជក់ហារីកុនុងផ្ទៃ:ឬជក់ហារីនៅកុបរៃកូន,ទារកនឹងមានកូទីនីកុនុងខុលួនចុរើនជាង2ទារកដលៃឪពុកមុតាយមិនជក់ហារី៥0ដង,ទ:បើជាឪពុកមុតាយជក់ហារីនៅមុខទ្វាកុវាផ្ទៃ:,កូទីនីកុនុងខុលួនទារកក៏ចុរើនជាង3ទារកដលៃឪពុកមុតាយមិនជក់ហារី៧ដង។

សុរតីមានផ្ទៃពោះជក់ហារីឬនៅកុបអែុនកជក់ហារីនឹងមានសំណរកុនុងឈាមខាប់,នឹងឆុលងកាត់ផ្ទៃពោះឆុលងអាយទារក,ប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់បុរាជ្ញាកូន។ហើយនីកូទីនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សសបៃុសោទសុរចៀកដលៃទារកកំពុងលូតលាស់,បណ្តាលអាយខូចតុរចៀក។

លើស ពី នេះ ទៀត ការ សិក្សា នេះ ហាន បញ្ជាក់ ថា ការ ជក់ ហារី នៅ តាម ផ្ទះ: អាច បង្ក ឱ្យ មាន សារធាតុ ពុល នៅ កុនុង ផ្ទះ: ទុរទុរង់ ការ បុរមូល ផ្តុំ ខ្ពស់ នៃ សំណល់ ទា: បី ជា ផ្សងៃ ត្រូវ ហាន ពន្លត់ ជា យូរ មក ហើយ សារធាតុ ទាំង នេះ គឺ នៅ តៃ នៅ លើ ភាព ខុស គុនា នៃ គ្រួសារ ដលៃ មាន ផ្ទះ មួយ (ដូច ជា តុ កាអី អិដ្ឋការជញ្ជាំង ទូខាអារ អាងងូតទឹក បង្គន់ ..... គ្រឿង សង្ហារឹម) នៅ កុនុង សំណុំ បបៃបទ នៃ ភាគលុអិត បង្កឹត សុរទាប់ នៃ ឯកសារ ភ្ជាប់ មួយ ប៉ុនុតៃ អាច ត្រូវ ហាន ភ្ជាប់ ទៅ នឹង ផេះ បនុទាន់ ឬ ហាន កុលាយ ទៅ ជា សមាសធាតុ ពុល បង្កក ជាហតេុ បនុទាប់ ពី ប៉ុនុមានថ្ងៃ ជ បនុទាប់ស បុតា ហ៊ាបនុទាប់ ខៃ រសាត់ ចូល ទៅ កុនុង ខុយល់ ។ការ ជក់ហារី កុនុងមួយ អាច ផ្ទើ ឱ្យ ចញេ រយ: ពលេ វលៃ នៅ កុនុង ចនុលោ: នៃ មនុសុស ដលៃ ប៉ះពាល់ ទៅ នឹង ការ ប៉ះពាល់ នៃ ថុនាំ ជក់ នៅ ពលេកុរាយ ។សារធាតុ ទាំង នេះ អាច ទៅ ជា ពុល កុនុង កំហាប់ ទាបរួម បញ្ចូល ទាំង បុរភេទ សតុវ មួយចំនួន នៃ ជំងឺ មហារីក ហាន ។

ដីមុបីកូន,សូមឪពុកមុតាយតមហារី

បុរសិនបើឪពុកមុតាយយល់ដឹងពីគុណវិបត្តនិងពត៌មាននកៃារជក់ហារី,អាចសឺបសួរមនុទីពទេុយអំពីពត៌មានតមហារី,ឬទំនាក់ទំនងសវេកមុមបណ្តាញតមហារីនិងការពុយាបាល។ល។(បណ្តាញតមបហារីឥតគិតថ្លៃ0800-63-63-63)។

* មជ្ឈមណ្ឌលសវេកមុមផ្តាច់បនុទាត់ "ដំណរីការបញ្ឈជូននិងការយល់ពុរមទៅកាន់សុថាប័នវជ្ជសាសុតុរហានភ្ជាប់ទៅនឹងទំព័រទី៨៣-៨៥។

ព័តមានតមហារី

(១) ជំនាន់ទី២ផ្ដាច់ហារី ការឧបត្ថមុភកីនឡើង! ខុសទៃរស័ព្ទបុរឹក្សាផ្ដាច់ហារីដាយឥតគិតថ្លៃ:៖ 0800-636363, គហេទំព័រ:៖ http://www.tsh.org.tw/

(២) មានក្រសួងសុថាប័នពិនិត្យសុខភាពសុខាភិបាលសហការកុនុងការបញ្ឈប់ការជក់ហារីនៅទូទាំងបុរទេសេមានចំនួន៣0000ក្រសួងសុថាប័ន។ (ទូរស័ព្ទសាកសួរពតិមាន: 02-2351-0120)

(៣) ទំនាក់ទំនងមនុទីរ (មណ្ឌល) សុខភាព គរប់សុរុកុរុង ដីមុបីទទួលការបុរឹក្សាឬសវេកមុមផ្ដាច់ហារី អាចសុំស្បៀរភាផ្ដាច់ហារីឥតគិតថ្លៃ។

(៤) ទាញយកសៀរភាការអប់រំផ្ដាច់ហារីពីគហេទំព័រសុខភាព៩៩:៖ http://health99.hpa.gov.tw

趕走對胎兒的不良影響

2. 酒害

過量飲酒除了對孕婦會造成孕程出血而流產、子宮及陰道感染、習慣性流產、胎盤早期剝離和死產外，也會影響胎兒在子宮內的生長，而容易生下臉部發育異常(如小眼、鼻樑扁平、顏面畸形)、體重及身高的生長遲滯及中樞神經異常(小腦症、智障及神經行為障礙)等有健康問題的「胎兒酒精症候群」嬰兒。

3. 避免過度照射X光

懷孕時應避免X光照射，如有必要，可在醫師指示下行之，以減少胎兒畸形的風險。

4. 孕婦使用藥品須知：

(1)如有打算近期懷孕，在服用任何藥物前應先詢問醫師或藥師的建議，不要任意使用藥物或不必要的中草藥或偏方。

(2)若在懷孕、疑似懷孕或是未避孕而可能懷孕期間，服用任何藥物包括：處方藥、非處方藥及食品補充劑等，請告知您的醫師或藥師。

(3)美國食品藥物管理局(FDA)將懷孕期間藥物的安全性分成五級，區分內容如下：

級別	定義
A	在懷孕婦女的對照臨床試驗中，無法證實對懷孕第一期或較後期胎兒有風險、或對胎兒傷害的可能性。
B	動物試驗未顯示對胎兒有危險，但缺乏懷孕婦女的對照臨床試驗資料；或者，動物試驗顯示對胎兒有不良反應，但懷孕婦女對照臨床試驗無法證實對胎兒有危險。
C	動物試驗顯示有致畸性或殘害胚胎，但沒有懷孕婦女的對照臨床試驗；或者，懷孕婦女的對照臨床試驗或動物試驗均缺乏資料。
D	已證實對人類胎兒有危險，但在一些狀況(如有致命危險的狀況或在嚴重疾病其他較安全的藥品無法使用或無效)，必須利益大於潛在的風險才可以使用。
X	在動物及人體試驗、及/或臨床經驗證實會造成胎兒異常，這種風險遠超過可能的利益。

註：A、B 兩級藥物於懷孕期間使用大致安全；C、D 兩級藥物則需視實際情形權衡使用。懷孕期間如有用藥需求，應先諮詢醫師或藥師之專業意見。

(4)孕婦在懷孕期自行補充維他命及營養補給品，應先諮詢醫師及藥師，以避免過量服用對胎兒造成危害。

បណ្តញ្ជើការប៉ះពាល់ទាំដល់ទារក

២.ខ្លួចសុខភាពដាយសាសុរា

ធឹកសុរាចុរ៉ែនពកេកុរ៉ាពីបណ្តាលអាយអ្នកមានផ្ទៃពោះរលូតកូនដាយសាចញ្ជើឈាម,ឆ្លងរាគតាមសុបូនឬ យានី,រលូតកូនជាទំលាប់,រលាត់សូកមុនពលេឬសុលាប់កុរ៉ាសុបូន,ក៏ប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់ទារកនុងផ្ទៃ, ហើយងាយស្រួលនឹងបង្កើតកូនដលែមានមុខមិនប្រុរតី(ដូចជាមានភ្នែកតូច,ចុរមុះកំពាត,មុខរាងចំលកែ),ការលូត លាស់ទំងន់និងកំពស់យ៉ែតនិងសសប្រៃសាទប្រុរតី(ជំងឺខ្លួរកុបាល,ពិការប្រាជ្ញានិងសសប្រៃសាទ)ទារកមានបញ្ហា សុខភាព(ជំងឺទារកដាយសារសុរា)។

៣. ជ្រៀសវាងការឆ្លុះកមូមរសុមី X ជ្រុលហួសហារ្តេះ

កុនុងពលេមានផ្ទៃពោះ គបួបីជ្រៀសវាងការឆ្លុះកមូមរសុមី X។ បុរសិនបីមានការចាំបាច់ អាចធ្វើឡើងហានដាយ នាកុរាមបង្គាប់របស់វជ្រេជបណ្ឌិតដ៏មុបីបនុទាបហានិភ័យនរ្លែបរាងខុសប្រុរតីរបស់កូនកុនុងផ្ទៃ។

៤.ការយល់ដឹងអំពីសុរតីមានផ្ទៃពោះប្តីប្រុរស់ថ្នាំ

(១) បុរសិនបីមានគំរងចង់មានទំងន់សូមកុំប្តីប្រុរស់ថ្នាំផ្តសេផ្តាស់ឬថ្នាំសុមាដលែមិនចាំបាច់, ថ្នាំព្រួបួថ្នាំមិនចុហស់លាស់។

(២) បុរសិនបីមានគំរងចង់មានទំងន់,សូមសីសូរយោបល់គ្រូពទេ្យមុនពលេប្តីប្រុរស់ថ្នាំទាំងឡាយ

(៣) មនុទីគ្រប់គ្រងថ្នាំអាហារអាមរិក(FDA)ហានបកែចកែសុរត្តិភាពថ្នាំជា៥ថ្នាក់,រួមមាន

ថ្នាក់	អត្ថន័យ
A	នាកុនុងការពិសាធប្រៀបធៀបចំពោះសុរដីមានផ្ទៃពោះ មិនអាចបញ្ជាក់ថាមានហានិភ័យចំពោះកូនកុនុងផ្ទៃកុនុងដំណាក់កាលមានផ្ទៃពោះទី១ឬដំណាក់កុរាយទ្បែត ឬ លទ្ធភាពនកែារខ្លួចខាតដល់កូនកុនុងផ្ទៃ ហាននាះទេ។
B	ការពិសាធចំពោះសត្តវមិនហានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានហានិភ័យចំពោះកូនកុនុងផ្ទៃនោះទេ ប៉ុនុដខ្លែរះខាតទិនុននិយនកែារពិសាធប្រៀបធៀបចំពោះសុរដីមានគភ៌។ ឬ នាកុនុងការពិសាធចំពោះសត្តវហានបង្ហាញថាមានបុរតិកមួមមិនលអចំពោះកូនកុនុងផ្ទៃ ប៉ុនុដនៅកុនុងការពិសាធប្រៀបធៀបចំពោះសុរដីមានផ្ទៃពោះមិនអាចបញ្ជាក់ហានថាមានគ្រាះថ្នាក់ចំពោះកូនកុនុងផ្ទៃនោះទេ។
C	កុនុងការពិសាធចំពោះសត្តវហានបង្ហាញថា អាចធ្វើឲ្យខ្លួចរូបរាងឬធ្វើឲ្យខ្លួចខាតដល់អំប្រីយ៉ែង ប៉ុនុដមិនមានការពិសាធប្រៀបធៀបចំពោះសុរដីមានគភ៌ ឬ ខ្លែរះខាតទិនុននិយទាំងការពិសាធប្រៀបធៀបចំពោះសុរដីមានគភ៌ ឬការពិសាធចំពោះសត្តវ
D	តរូវហានបញ្ជាក់ថាមានគ្រាះថ្នាក់ចំពោះកូនកុនុងផ្ទៃរបស់មនុសុស ប៉ុនុដនៅកុនុងសុថានភាពមួយចំនួន (សុថានភាពដលែមានគ្រាះថ្នាក់ដល់ជីវិត ឬ កុនុងសុថានភាពមានជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរតែមិនអាចប្តីប្រុរស់ឱសថដលែមានសុរត្តិភាពជាងនេះឬប្តីរហើយគ្មានប្រសិទ្ធិភាព) អាចប្តីហានលុះតុរាតដែលប្រយោជន៍ដលែទទួលហានធំជាងសក្តានុពលនហានិភ័យ។
X	នាកុនុងការពិសាធចំពោះរាងកាយមនុសុសនិងសត្តវ និង/ឬបទពិសាធនវែជ្រេជសាសុរដ ហានបញ្ជាក់ថាអាចបណ្តាលឲ្យកូនកុនុងផ្ទៃមានភាពខុសប្រុរតី ដលែហានិភ័យនេះខុពស់ជាងឆ្លងាយធៀបទាំនឹងដល់ប្រយោជន៍ដលែអាចទទួលហាន។

សមុគាល់ៈ ឱសថកម្ងរិត A និង B ជាទូទាអាចប្តីប្រុរស់ហានដាយសុរតុថិភាពកុនុងពលេមានផ្ទៃពោះ។ ប៉ុនុដនែឱសថកម្ងរិត C និង D អាចប្តីប្រុរស់ហានដាយចុលឹងចុលងៃទាំនឹងសុថានភាពជាក់សុដងៃ។ អំឡុងពលេមានផ្ទៃពោះ បុរសិនបីមានការប្តីរថ្នាំ, គួរតពិគ្រាះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញដូចជាគ្រូពទេ្យឬឱសថការី។

(៥) អ្នកមានផ្ទៃពោះគួរសឹបសួរគ្រូពទេ្យឬគ្រូពទេ្យថ្នាំមុនពលេទទួលទានអាហារបំប៉ន ជំរុជាតិដាយខ្លួនឯង,ដ៏មុបីកុំអាយប្តីប្រុរស់លើសចំនួនបណ្តាលអាយមានគ្រាះថ្នាក់ដល់ទារកកុនុងផ្ទៃ។

趕走對胎兒的不良影響

5. 孕婦使用化粧品須知：

(1) 可能懷孕或確知已懷孕婦女不得染髮，並避免燙髮及使用指甲油、去光水或指甲彩繪品。

(2) 請勿使用來路不明、標示不清及過度宣稱效果的化粧保養品。

(3) 懷孕期間常因荷爾蒙變化長痘痘，此時化妝保養程序應儘量簡化並可輔以適當的外用抗痘產品，此外上妝時儘量以淡妝為宜，不建議濃妝。

(4) 懷孕期間儘量不要使用顏色過重、香味過強及成分過度複雜的化妝保養品。

(5) 懷孕期間臉上容易長斑而且原本斑點的顏色也會加深，此時應注意適當的防曬措施並輔以適合的純物理性防曬品。此外可以適度的使用一般美白保養品，但三合一退斑膏藥品(A酸+對苯二酚+類固醇)則不適合用於懷孕期間。

(6) 懷孕期間皮膚容易乾癢及長疹子，除了穿著透氣寬鬆的衣物，處於涼爽的環境以及使用溫和的沐浴產品外，如果情形嚴重應儘快到皮膚科求診，並依醫師處方輔以適當的藥物來治療處理。

(7) 懷孕期間可使用含果酸或水楊酸的化粧品，但不適合進行高濃度的化學換膚處理。

(8) 懷孕期間並不建議執行非急迫性的醫美處理（雷射、脈衝光、電波拉皮或電氣導入）或是整型手術（包括微整型），以免暴露到不必要的風險。

(9) 如有蟹足腫體質的患者在生產手術前需事先與醫師討論，並於術後配合使用適當的輔助產品以預防明顯疤痕的產生。

（資料來源：食品藥物管理署）

6. 不使用毒品

懷孕婦女若吸食毒品，毒品會經由母體胎盤進入胎兒體內，相當於胎兒間接性吸毒，可能使得新生兒出現「新生兒戒斷症候群」，提高癲癇發作、出生體重過輕、呼吸問題、甚至死亡的風險；亦可能導致學習障礙、注意力不集中、行為問題等發展缺損。

提醒未停止藥物濫用之準媽媽，可儘速向衛生福利部指定之藥癮戒治機構（可自衛生福利部網站（www.mohw.gov.tw）/資訊服務專區/心理及口腔健康司/成癮治療/指定藥癮戒治機構項下查詢）尋求診治，並停止施用毒品。

បណ្តញ្ជើការប៉ះពាល់ទៅដល់ទារក

៥.ការយល់ដឹងពីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបុរីបុរាស់គ្រឿងតងែខ្លួន

(១) ស្ត្រីបុរហាលែ ជា មាន ផ្ទៃពោះ ឬ សុតិ្តបុរាកដថា មាន ផ្ទៃពោះ មិនគួរលាបថ្នាំសក់ទគ្ងេរតៃ ជៀសវាង ការអ៊ុតសក់ ការលាបថ្នាំ កុរចកដៃ ទឹក លាងថ្នាំកុរចកឬការគ្ងូម៉ូតលីកុរចកផ្សងេៗ ។

(២) កុំបុរីបុរាស់មុស៊ាជាត់មុខដលែមិនចុហាស់លាស់ឬផ្សពុវផ្សាយបុរសិទ្ធភាពហូសហាតេុ។

(៣) អំឡុង ពលេ មាន ផ្ទៃពោះ ផ្ទរីអោយ បុគ្ងរ អ៊ីរម៉ូនផ្លាស់បុគ្ងរជា ញឹកញាប់ដរែបណ្តាលអោយកីតមុន ដូចនរះហើយគួរតបែុរីគ្រឿងលាបជំនួយមុខដលែងាយៗដូចជាការលាបបំហាត់មុនលីសីស្បកែកុរាពី នរះទៅទៀតយល់លុអជាត់មុខស្តីងៗហានហើយមិនគួរជាត់មុខខ្លាំងពកេទ។ ។

(៤) អំលុងពលេមានផ្ទៃពោះសូមកុំបុរីបុរាស់ពណ៌កុរាស់ពកេ,កុលិនខ្លាំងពកេនិងថ្នាំថសែុបកែដលែមា នចុរីនមុខ។

(៥) អំឡុងពលេមានផ្ទៃពោះងាយស្បួលកីតរុយឬរុយពីមុនមានពណ៌ជុរាជាងមុន,នៅពលេនារះគួរជ្ងើការកា រពារកំដៅចុងនៃងការពារដាយធមុមជាតិ។កុរាពីនារះក៏អាចបុរីថ្នាំថសែុបកែទូទៅហានដរែ,ប៉ុន្តថ្នាំបំ ហាត់សុនាមរួម១(អសើត,Hydroquinone,Steroid)នឹងមិនគួរបុរីបុរាស់កុនុងអំឡុងពលេមានផ្ទៃពោះ។

(៧) អំ ឡុង ពលេ មាន ផ្ទៃពោះ ធ្ងរីអោយងាយ សួ្រល នឹង សុងួត រមាស់ សុបកែ និង មាន កន្ទួលកុរាពីនរះគួរតៃ សុលៀក ស មុលៀ ក បំពាក់ រលុងខ្យល់ចញេចូលហាននៅ កនុលងែមានលំហើយ និង ការ បុរី បុរាស់ ទឹក សាបូ៊ដុសខ្លួនណាដលែមិនមានជាតិកាត់ខ លាំង បុរសិន បើ ករណីធ្ងន់ធ្ងរ គួរ តៃ ទៅការ ពិគុរាៈ យាបល់ពី ពទេ្យផ្នកែ ជំងឺ សីរសុបកែ ដាយសុតាប់ធ្ងរីតាម ការណានៃអាយលបេថ្នាំកុនុងដំបូលមានរបស់ពទេ្យ។

(៨) អំឡុងពលេមានផ្ទៃពោះក៏អាចបុរីបុរាស់ថ្នាំថសែុបកែដលែមានជាតិផ្លលែឈើ,ប៉ុន្តមិនសមសុរបបុរី បុរាស់ថ្នាំដលែមានជាតិគីមីធ្ងន់ធ្ងរទ។

(៩) អំឡុង ពលេ មាន ផ្ទៃពោះ គឺ មិន គួរទៅពទេ្យធ្ងរីការកដរែសមុភាសណាដលែមិនចាំបាច់នារះទ(ឡាសរែ ពន្លឺ ជីពចរ បន្តឹងសុបកែឬ នាំចូល អគ្គិសនី) ឬ ការ វះកាត់ កសែមុភាស (រួម ទាំង ការសមុភាសបន្តិចបន្តួច) ដីមុបី ជៀសវាងនឹងការជួបបុរឈរមុខនិងគុរាៈថ្នាក់ដលែមិនចាំបាច់។

(90) បុរសិនបើមានជំងឺដំបៅដងែកូរវុរកគួរពិភាកុសាជាមួយគ្ងរពទេ្យកុរាយពលេវះកាត់បងែកីតកូន,ហើយសូម បុរីបុរាស់ផលិតផលជំនួយសមសុរបនិងផលិតផលការពារកុំអោយមានសុនាមចុហាស់។

(បុរភពឯកសា:សុថាប៍នមនុ្ទីគ្រប់គ្រងអាហារនិងថ្មាំពទេ្យ)

៦.មិនមនែគ្រប់គ្រងដាយគ្រឿង ញៀន

បុរសិន បី សុតិ្តរី មាន ផ្ទៃពោះ ជក់ថ្នាំញៀន ថ្នាំញៀន នឹង ចូលតាមរយៈសុកទៅសរីរាងគ្ទ ទារក គឺវាសុមីនិងទារកបុរីថ្នាំញៀនដរែ អាច ធ្ងរី ឱ្យ ទារក ដលែ ទីបនឹង កីត "ទារកមានជំងឺ មិន បរិភាគ" ទារកងាយ ការ កីន ឡើង បុរកាច់ ទារកដលែទីបនឹងកីតមានទំងន់ សុាលពកេមានបញ្ហា ផ្លូវដងែហើម និង បណ្តាលអាយគុរាៈថ្នាក់ដល់ សុលាប់ការ បុរឈម មុខ ការខុរៈភាពយកចិតុតទុកដាក់និងមានបញ្ ហាពិការភាព ផ្សងេ ទៀត នា កុនុង ការ អភិវឌ្ឍន៍ នៃ បញ្ហា អាកបុបកិរិយាដលែបណ្តាលអាយ មាន ភាព ពិការកុនុង ការ រៀនសូតុ្រ ។

សូមដាស់តឿនបើ មិន ហាមឃាត់ ឱ្យ បញ្ឈប់ ញៀន ថ្នាំរបស់មុដាយការ ពុយាហាល ការ ញៀន ថ្នាំ ញៀន ទៅ ឱ្យ យនុ្តការ ចុាន ចាល អាច តូ្រវ ហាន កំណត់ ឱ្យ ហាន ឆាប់ តាម ដលែ អាច ធ្ងរី ទៅ កុរសួង សុខាភិបាល និង សុខុមាលភាព (អាច រក ហាន ពី កុរសួង សុខាភិបាល និង គេហទំព័រ សុខុមាលភាព (www.mohw.gov.tw) / សវោ តំបន់ ព / ផ្នកែ សុខភាព ផ្លូវចិតុត និង មាត់ ធ្មមញ / ការ ពុយាហាល ការ ញៀន / ការ ពុយាហាល ការ ញៀន ថ្នាំ ដីមុបី បដិសធេ សុថាប៍ន សំណូរ ដលែ ហាន បញ្ជាក់) សូរែងែក ការ ពុយាហាល និង ដីមុបី បញ្ឈប់ ការ គ្រប់គ្រង ថ្នាំ ។

女孩男孩一樣好，生來通通都是寶

隨著文化的變遷，民主意識的抬頭，兩性平權、實質平等的時代也已悄然到來。在家族生命的延續、母子心靈的親疏或對孩子未來成就的期許上，你會因為孩子性別的不同而有所差異嗎？提供下面訊息給準父母參考：

女性也可以傳宗接代！

- 男女結婚後可繼續保有原來姓氏，無需再冠夫姓。
- 子女姓氏可由父母書面約定從父姓或母姓。
- 女性與男性具有平等的家產繼承權利，女兒的應繼分也和兒子應繼分完全相同。
- 祭祀公業條例自2008年7月1日起施行，已摒棄過去排除女性繼承宗祧的習俗，展現男女的平權意識。
- 在喪葬禮儀中，女性也可以擔任主奠者及主持捧斗、執幡等儀式，傳承家族血緣。

孩子未來的成就無關性別！

- 「性別平等教育法」：讓女性與男性皆有平等受教育之權利。
- 「性別工作平等法」：保障女性工作權之平等，消除性別歧視。
- 女性勞動參與率，專業技術人員比率，管理及經理人員比率不斷提升；國會議員和民意代表中女性席次比率，及女性公務人員進入決策階層比率亦提高。

女孩男孩都是寶！

父母和孩子之間的親情連結跟子女性別並無關聯，長久情感的親密互動，才是真正讓父母感到「有女、有子萬事足」之關鍵。

為了幫助更多胎兒平安出生，不要因性別而被放棄，請您一起來守護！

若您有發現違法檢測及選擇胎兒性別的情事，請向各縣市胎兒性別篩選查報窗口反映，請參閱第236頁。

偏見停一停，女男一樣行，
兩性都珍貴，平等才是對，
讓我們珍惜生命，珍惜上天賜予我們的心肝寶貝～

កូនប្រុសកូនស្រីល្អដូចគ្នា,សុទ្ធតែជាសំណាងចិត្តទាំងអស់

ទៅតាមការប្រែប្រួលនៃប្រពៃណី,ប្រជាធិបតេយ្យនិយម,សម័យដែលមានសិទ្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ស្មើគ្នារវាងភេទទាំង២បានមកដល់ហើយ។បន្តជីវិតក្នុងតុក្កដែ,ចិត្តមនុស្សនិងកូនឬសេចក្តីសង្ឃឹមមានចំពោះកូន,តើអ្នកមានការខុសប្លែកពីព្រះភេទរបស់កូនឬ?ផ្តល់អោយពត៌មានដូចខាងក្រោមជាយោបល់ទៅដល់ឪពុកម្តាយ

• ភេទស្រីក៏អាចបន្តពូជតុក្កដែហានដែរ!

- រាយពេលប្រុសស្រួតរៀបមង្គលការក៏អាចប្រឹតុក្កដែដ៏មហានដែរ,មិនចាំបាច់ប្រឹតុក្កដែសុវាមីទេ។
- បុត្រាបុត្រីអាចមានតុក្កដែតាមការសន្យោរវាងឪពុកម្តាយ,យកតុក្កដែឪពុកឬម្តាយក៏ហាន។
- ភេទស្រីនិងភេទប្រុសមានសិទ្ធទទួលមរតកគ្សាសុមីគ្នា,បុត្រីមានភាគមរតកសុមីគ្នាដូចបុត្រា។
- មាតុភាវិស័យសកុការៈប្រជាសាធារណៈ ហានចាប់ផ្តើមដាក់អនុម័តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកុកដា ឆ្នាំ២០០៨ ដែលហានលុបបំបាត់ទំនៀមទម្លាប់នកែការីសអីសស្តីពីកុនុងការសុនងតុក្កដែដូនតាបង្ហាញពីអត្ថន័យនសៃមភាពរវាងប្រុសនិងស្រ្តី។
- នាកុនុងពិធីបុណ្យសព សុដ្ឋីក៏អាចទទួលបន្ទុកជាម្ចាស់ដីមបុណ្យ និងអាចធ្វើជាអ្នកចាត់ចែងពិធីផ្សេងៗដូចជាពិធីកាន់ទង់ពុះលឹងជាដីម ដោយសុនងឈាមសុរលាយគ្នូសារ។

• អនាគតកូនមិនអាស្រ័យទៅលីភេទទេ!

- (នាតុរាអប់មានសិទ្ធអប់រំសុមីគ្នាទាំង២ភេទ)ធ្វើអោយប្រុសនិងស្រ្តីមានសិទ្ធសុមីគ្នាកុនុងការទទួលការអប់រំ។
- (នាតុរាសិទ្ធអាជីបសុមីគ្នាទាំង២ភេទ)ធានាសិទ្ធនារីកុនុងការងារ,បំបាត់ការមីលងាយភេទ។
- ការចូលរួមពលកម្មមនកៃទេនារី,អ្នកជំនាញ,អ្នកគ្រប់គ្រងនិងនាយកកីនឡើងមិនឈប់ឈរ។រដ្ឋបសភានិងតំណាងពលរដ្ឋភាគច្រើនជាស្រ្តីភេទ,និងការកើនលើងអំពីការសំរេចគាលការនអ្នកធ្វើការរដ្ឋប។

• បុត្រាបុត្រីសុទ្ធតែជាសំណាងចិត្ត!

រវាមនាសញ្ចតេណាឪពុកម្តាយនិងកូនមិនខុសប្លែកដាយសាភេទកូននាៈទ,មនាសញ្ចតេនាដែលយូរលុង,ទីបជាមូលហាតុសំខាន់ដែលធ្វើអោយឪពុកម្តាយមានអារម្មណ៍ថាមានបុត្រាបុត្រីអ៊ីក៏ហានដែរ។

• ដីម្បីជួយទារកកាន់តច្បែរនអាយហានបុរសួតសុខសប្បាយ,កុំហៈបង់ដាយសាភេទ, សូមអ្នកមកមីលថជាមួយគ្នា!

បុរសិនបីអ្នកឃីញការត្រួតពិនិត្យលុមីសច្បាប់និងការជ្រើសរីសភេទទារក,សូមទំនាក់ទំនងទីប្តឹងទៅកាន់ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យភេទទារករាល់ខតេតកុរុង,សូមអានទំព័រទី២៣៧។

បញ្ចឈប់ការបង្កៃចកៃ,បុរសស្រីល្អដូចគ្នា
មានតំលៃទាំង២ភេទ,សុមីគ្នាទីបតុមែត្រូវ
យើងនាំគ្នាសុរលាញ់ជីតរក្សាកូនសំណាប់ចិត្តដលៃព្រះជាម្ចាស់ផ្តល់អាយយើង

讓寶寶安全的成長

早產是指寶寶在懷孕滿20週至未滿37週時出生。早產寶寶的照顧不容易，是新生兒死亡的主要原因。早產發生的原因目前仍有50%不明，已知的危險因子包括：

生活行為		孕前狀況		懷孕期間	
是	否	是	否	是	否
☐	☐ 營養狀況不良	☐	☐ 懷孕年齡小於18歲或大於40歲	☐	☐ 感染、發燒
☐	☐ 吸菸、喝酒	☐	☐ 未婚懷孕	☐	☐ 細菌尿、感冒
☐	☐ 使用成癮藥物	☐	☐ 孕前體重不足	☐	☐ 多胞胎
☐	☐ 工作過度勞累	☐	☐ 懷孕間隔太密	☐	☐ 前置胎盤
☐	☐ 衛生習慣不良	☐	☐ 曾發生過早產、早發陣痛或妊娠早期~中期流產	☐	☐ 子癲前症、高血壓
☐	☐ 情緒焦躁不安	☐	☐ 曾患腎盂腎炎	☐	☐ 胎盤早期剝離
☐	☐ 貧血…等	☐	☐ 前胎有子宮頸閉鎖不全之現象	☐	☐ 早期破水
		☐	☐ 曾有不良的產科病史	☐	☐ 羊水過多或過少
		☐	☐ 子宮曾接受過手術〈如人工流產…等〉	☐	☐ 子宮有畸形
				☐	☐ 妊娠12週後曾出血
				☐	☐ 腹部手術
				☐	☐ 身體或情緒方面的創傷
				☐	☐ 胎兒染色體異常或先天性畸形
				☐	☐ 牙周病

這些因素大多數是可以在懷孕前就開始準備先行改善的，懷孕期多注意，以預防早產的發生。若出現下列類似早產徵兆的情形，應儘快就醫才能降低早產風險。(請參閱第214頁)

是　否

☐ ☐ 一小時內有6次以上或10-15分鐘有一次的子宮收縮，休息30分鐘後仍無改善。這些收縮不一定有疼痛感，但肚子會變硬或有下墜感。

☐ ☐ 類似月經來時的悶痛感或來之前的脹痛感。

☐ ☐ 子宮與陰道的壓力，有下墜感或陰道有壓迫感。

☐ ☐ 其他方法無法改善的下背痛。

☐ ☐ 持續不斷的腹瀉或腹部絞痛。

☐ ☐ 陰道水樣、黏液和血液樣分泌物增加。

☐ ☐ 感覺胎動較平常減少一半以上。

（如果您有勾選上述任何症狀，即可能為高危險妊娠孕產婦，請記得向醫師說明協助診斷，以確保自己和胎兒的安全，請參閱第214頁；有關早產兒相關福利，請洽財團法人臺灣早產兒基金會http://www.pbf.org.tw）

ផ្តល់ការលួតលាស់ដ៏មានសុវត្ថិភាពដល់កូន

កូនកើតមុនខគឺកើតនៅពេលមានផ្ទៃពោះ២០ទៅ៣៧សប្តាហ៍។កូនកើតមុនខពិបាកកុនងការថែទាំ,ជាមូលហេតុសំខាន់បណ្តាលអោយទារកទីបនឹងកើតហត់បង់ជីវិត។កុនងបច្ចុប្បន្នកើតមុនខមែន៥0%មានមូលហេតុមិនច្បាស់លាស់,មូលហេតុដលែត្រូវបានដឹងរួមមាន

អំពីជីវភាព	សុខានភាពមុនពេលមានផ្ទៃពោះ	អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ
មនែ មិនមនែ	មនែ មិនមនែ	មនែ មិនមនែ
☐ ☐ មានលក្ខខណៈជីវជាតិមិនល្	☐ ☐ មានផ្ទៃពោះកុរាមអាយុ១៨ឆ្នាំឬលើអាយុរ៤0	☐ ☐ ឆ្លង,កុតខុលួន
☐ ☐ ជក់ហរិនិងផឹកសុរា	☐ ☐ មានផ្ទៃពោះមុនពលេរៀបមង្គលការ	☐ ☐ ទឹកនាមមពេគ,រាគផ្តាសាយ
☐ ☐ ប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀន	☐ ☐ មានទំង់ទំងមិនគួរប់មុនពលេមានផ្ទៃពោះ	☐ ☐ កូនកុលា:
☐ ☐ ហត់នឿយកុនុងការងារ	☐ ☐ មានផ្ទៃពោះញឹក	☐ ☐ សុកខាងមុខ
☐ ☐ មានទំលាប់អនាម័យមិនលុអ	☐ ☐ ធ្លាប់កើតមុនខ,ឈឺមុនខប្លែរលួតកូនកុនុងរលោពលេមានផ្ទៃពោះមុខកនុតាល	☐ ☐ ជំងឺពុកអុកុរលាភុលិងលីសឈាម
☐ ☐ មានអារមុមណ៍មិនសុងប់សុងាត់	☐ ☐ ធ្លាប់មានជំងឺរលៀកករលៀនឆ្អឹងតុរកៀក	☐ ☐ ឆាប់របេកសុក
☐ ☐ ខុរៈឈាម។ល។	☐ ☐ កូនមុនមានហត្ថភូតមាត់សុបូនបិទមិនជិត	☐ ☐ ឆាប់បរែទឹក
	☐ ☐ ធ្លាប់មានបុរវត្ថុតជំងឺផ្តុនកែសំាលកូនដលែមិនលុអ	☐ ☐ ទឹកផ្ទៃពោះច្បើនឬតិច
	☐ ☐ ធ្លាប់ទទួលការវះកាត់សុបូន(ដូចជាការពន្លួតកូន។ល។)	☐ ☐ ការខូចទុរង់ទុរាយសុយូន
		☐ ☐ ធ្លាប់ចញេឈាមកុរាយពេលមានផ្ទៃពោះ១២សប្តាហ៍
		☐ ☐ ការវះកាត់កុហាលពោះ
		☐ ☐ រមួសផ្តុនកែខុលួនបុរាណនិងអារមុមណ៍
		☐ ☐ ក្លេម្ស៉ូសូមទារកកុនុងផ្ទៃអែបុរកុរតឺឬមានខូចទុរង់ទុរាយពីកំនិត
		☐ ☐ ជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ

ភាគចុរីននកែតុតាទាំងនេះអាចតុរូវហានមុនពេលមានផ្ទៃពោះហានចាប់ផ្តើមរៀបចំជាមុនដីម្បីកលែមុអការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តចែ្បរីនកុនុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះដីម្បីការពារកុំឱ្យកើតមិនគួរប់ខ។ បុរសិនបីមានកាល:ទសេ:ដូចខាងកុរាមសញ្ញាសុរដ្បៀងគ្មានពៃលកមុមមិនគួរប់ខកើតឡើងពុយាហាលហានឆាប់តាមដលែអាចផ្តើទៅហាននាកុនុងគាលបំណងដីម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនកែារកើតមិនគួរប់ខនោះទ។ (សូមមីល ២១៥)

មនែ មិនមនែ

- ☐ ☐ រួញសុយូនលើសពី៦ដងកុនុងរយៈពេល១ម៉ាងឬរួញសុបូនមុតងកុនុងរយៈពេល១0-១៥នាទី,សំរាក៣0នាទីនូរតមែនមានការសំរួល។ការរួញសុបូននេះមិនបុរាកដជាមានការឈឺទ,ប៉ុនុតពោះនឹងរឹងឬមានអារមុមណ៍ថាធ្ងលាក់ចុះ។
- ☐ ☐ មានអាការៈចុកពៈដូចជានៅពេលមករដូវឬឈឺពៈមុនពេលមករដូវ។
- ☐ ☐ សំមុពធសុបូននិងយានី,មានអារមុមណ៍ធ្ងលាក់សុបូនឬយានីមានអារមុមណ៍សមុពធ។
- ☐ ☐ មិនអាចកសៀរលការឈឺខុនងដាយវិធីដទៃ។
- ☐ ☐ រាកឬចុកពៈមិនឈប់ឈរ។
- ☐ ☐ ទឹកយានី,ទឹករំអិលនិងឈាមច្បើនជាងមុន។
- ☐ ☐ មានអារមុមណ៍ថាទារកកុនុងផ្ទៃរមែានចលនាតិចជាងមុនពាក់កណ្តាល។

(បុរសិនបីអុនកគួសធកេលីរាគសញ្ញាខាងលើនេះនោះវានិងមានគ្រុះថ្នាក់បំផុតពេលដលែកំពុងំពរពោះសូមចាំថាតុរូវតទៅពិនិត្យនិងពិគ្រុះជាមួយគ្រូពទេ្យដីម្បីសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតខុលួនឯងនិងទារកសូមមីលតាមទំព័រ២១៥ដលែទាក់ទងនិងអតុថប្បយោជន៍ចំពោះកូនដលែកើតមកដាយមិនគួរប់ខសូមទាក់ទងទៅសមាគមមូលនិធិកុមារដលែកើតមិនគួរប់ខតៃវ៉ាន់មូនិធិគ្រឹ http://www.pbf.org.tw)

準媽媽生活保健DIY

衣著

- 選擇寬鬆、吸汗材質，保持身體舒適及衛生。
- 穿著低跟、防滑的舒適鞋子，避免跌倒。
- 平常應戴上胸罩，支托保護乳房。

休息&睡眠

- 每天睡足八小時，中午最好有30分鐘的午睡。
- 白天注意身心狀態，可做短暫休息。
- 懷孕末期宜採側臥，休息時抬高雙腳，以促進下肢血液循環減少水腫。

活動

- 避免攀高、舉重或提重物。
- 可做家務，但不可勞累。
- 散步是最好的活動，可依醫護人員的評估及指導，進行適當的產前運動。

性生活

- 原則上不需禁止，但孕婦若曾有早產或流產症狀者，懷孕最初三個月及最後兩個月宜暫停。
- 此次懷孕有子宮頸閉鎖不全或前置胎盤，或目前尚未足月但有陰道出血及陣痛等情形者，應禁止。
- 在性行為的過程中，若孕婦產生子宮強烈收縮、不正常出血、嚴重下腹痛等，應停止性行為，儘快就醫。

排泄

- 宜每天排便。
- 不憋尿，有尿意時即排尿，不減少水份攝取。
- 宜多吃蔬菜、水果、多喝開水、以促進大小便暢通。

ការធានាសុខភាពជីវភាពអ្នកមុតាយDIY

សំលៀកបំពាក់

- ជ្រើសរើសកុរណាត់រលុង,បឺតញើស,រក្សាខ្លួនបុរាណស្រួលនិងអនាម័យ។
- ពាក់សុបកែជើងដលែមានកងៃទាប,ដលែមិនរអិល,ជៀសវាងកុំអាយដួល។
- ជាធម្មតាគួរពាក់អាវតុរនាប់ការពារដោះ។

សំរាក&ដំណេក

- ដំណេកគ្រប់៨ម៉ាងរាល់ថ្ងៃ,យកលុអសំរាក៣០នាទីនាពលេថ្ងៃ។
- បុរុងបុយ័តុនសុថានភាពកាយនិងចិតុតនាពលេថ្ងៃ,អាចសំរាកវលោខ្លី។
- គួរដេកបែថៃបៀងនាវលោកុរាយកុនុងអំឡុងពលេមានផ្ទៃពោះ,លីកជើងទាំងគួអាយខ្ពស់នាពលេសំរាក,ជីម្បីចលនាឈាមជើងហានលុអបង្ថយការហើមជើង។

សកម្មភាព

- ជៀសវាងឈងខ្ពស់,លីកវត្ថុធុងន់ឬយូរវត្ថុធុងន់។
- អាចធ្វើការងារផ្ទះ,ប៉ុនុតកុំនឿយហត់ពកេ។
- ដីរដោយថមីជើងឬហាត់បុរាណមុនពលេសម្រាលកូន តាមការណែនាំរបសគ្រូពទេយ។

ជីវភាពភទេ

- កុនុងគាលការណ៍មិនចាំហាច់ហាមឃាត់,ប៉ុនុតសៃុតីរដលែមានផ្ទៃពោះធ្លាប់បង្កើតកូនមិនគ្រប់ខ្ទឬអុនកធ្លាប់មានអាការៈរលូតកូន,គួរបញ្ឈប់ជាបណ្តោះអាសនុននាពលេមានផ្ទៃពោះដំបូង៣ខឬក្រោយ២ខ។
- ការមានផ្ទៃពោះលីកនៈបុរសិនបីសុដីរមានករណីកសុបូនអសមតុថភាព ឬសុកចាំងមាត់សុបូន ឬបច្ចុប្បនុនមិនទាន់គ្រប់ប៉ុនុដ៏មានការឈឺចាប់ និងហូរឈាមតាមទុវារមាស គួរបញ្ឈប់។
- កុនុងពលេរួមភទេ បុរសិនបីសុរដីមានផ្ទៃពោះកីតមានករណីសុបូនរួមខុលាំងខ្លា ហូរឈាមមិនបុរកុតិ និងឈឺផុនកៃកុរាមពោះជាដីមគួរបញ្ឈប់ការរួមភទេ និង ទាពុយាបាលជាបនុទាន់

លាមក

- គួរបត់ជើងធំរាល់ថ្ងៃ
- ទប់នាមុបត់ជើងតូចភ្លាមនាពលេចង់បត់ជើង,មិនកាត់បនុថយទទួលទានទឹក។
- គួរបរិភោគបនុលផ្លែឈើអាយហានចុរើន,ផឹកទឹកអាយហានចុរើន,ជីម្បីធូរសុរាលកុនុងការបត់ជើង។.

準媽媽生活保健DIY

口腔衛生

- 建議婦女在準備懷孕前就作好牙科治療。懷孕期間，應養成良好的口腔衛生習慣，包括：睡前要刷牙，一天至少刷2次；平常使用含氟牙膏刷牙；少甜食、多漱口，減少牙齒傷害。可持健保卡至牙科醫療院所定期接受口腔檢查；以及每天至少1次使用牙線(棒)或牙間刷清潔牙縫，不要共用牙刷。若口腔出現不舒服症狀，一定要就醫處置。
- 為什麼懷孕時孕婦的齲齒率會增加？牙周健康會惡化？懷孕時牙齒情況變糟的原因在於孕期荷爾蒙波動、飲食習慣改變等原因，會使原有的齲齒、牙周病惡化。因此例行性的口腔檢查非常重要。建議產前每三個月（如：第12週、24週、36週）可至牙科醫療院所進行例行口腔檢查。

沐浴

- 孕期避免身體泡高溫熱水澡及溫泉。
- 應採淋浴，避免盆浴，尤其最後兩個月。
- 陰道分泌物會增多，宜保持會陰部清潔、乾燥。

環境及工作的暴露

- 某些工作場所上的危害，可能會影響胎兒的健康。因此，懷孕婦女應了解如何預防某些職場的危害：當懷孕婦女可能會接觸到危害物質或作業時，請諮詢您的醫師。

旅遊

- 懷孕期間如果計劃在國內或到國外旅遊時，請告知您的醫師。懷孕期間旅遊，可能會產生問題；因此，儘可能先瞭解旅遊目的地及過境地區的醫療照護服務。

ការធានាសុខភាពជីវភាពអ្នកម្តាយDIY

សុខភាពមាត់ធ្មេញ

- ការណែនាំពីការរក្សាធ្មេញនៅពេលរៀបនឹងកំពង់មានផ្ទៃពោះ។ក្នុងរយៈពេលមានផ្ទៃពោះគួរតែមានទំលាប់អនាម័យមាត់អោយល្អរួមមានៈ មុនចូលគេងគួរដុសធ្មេញមួយថ្ងៃដុសអោយបានពីរដងតាមធម្មតាប្រើថ្នាំដុសធ្មេញមានជាតិហ្វ្លរអរ ឱសថសាហ៊ីខ្ពល់មាត់កាត់បន្ថយអាហារជាតិផ្អែមផ្ទើយអោយកាត់បន្ថយការខូចធ្មេញ។អាចយកកាតសុខាភិបាលទៅមន្ទីរពេទ្យធ្មេញគួរតពិនិត្យក្រអូមមាត់អោយបានទៀងទាត់ហើយប្រើខ្សែអំបោះសំអាតធ្មេញឈើខ្សែអំបោះចាក់ធ្មេញឬយកច្រាស់ដុសសំអាតចន្លោះធ្មេញ កុំប្រើច្រាស់រួមគ្នា។ប្រសិនបីមានបញ្ហាក្នុងក្រអូមមាត់ណាមួយគួរតែអោយពេទ្យពិនិត្យមើល។
- ហេតុអ្វីពេលកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះស្រ្តីមានកំណើនCariesកាន់តែច្រើនឡើង ?លក្ខណៈធ្វើអោយធ្មេញកាន់តែមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជាតិអាស៊ីតនៅពេលកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះធ្វើអោយមានការប្រែប្រួលអកម្មនដ្ឋរធ្វើអោយការបរិភោគអាហារមានការផ្លាស់ប្តូរ។ដូចនោះហើយបានជាការពិនិត្យក្រអូមមាត់សំខាន់ណាស់។ការណែនាំមុនពេលសំរាលកូនជារៀងរាល់បីខែ (ដូចជាៈ សប្តាហ៍ទី១២ សប្តាហ៍ទី២៤ សប្តាហ៍ទី៣៦) គួរតែទៅមន្ទីរពេទ្យធ្មេញត្រូវពិនិត្យក្រអូមមាត់អោយបានទៀងទាត់។

ងូតទឹក

- ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ស្ត្រីគួរជៀសវាងងូតទឹកដលែមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬទឹកផ្កាក្តៅ។
- គួរស្រូចទឹក,ចៀសវាងត្រាំទឹក,ជាពិសេសនៅចុងក្រោយ២ខែ
- វត្ថុទឹកក្នុងបន្ទប់ទឹកនឹងកីនលីង,គួររក្សាអនាម័យបន្ទប់ទឹកអោយស្អាតបាន,ស្ងួត។.

នៅក្នុងបរិដ្ឋានឬទីកន្លែងធ្វើការ

- គ្រោះថ្នាក់នៅទីកន្លែងធ្វើការខ្លះ,ប្រហែលជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទារកក្នុងផ្ទៃ។ដូចនេះ,ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរយល់ដឹងអំពីការការពារពីគ្រោះថ្នាក់នៅទីកន្លែងធ្វើការខ្លះ : នៅពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រហែលជាប៉ះពាល់ដល់វត្ថុគ្រោះថ្នាក់ឬនៅពេលធ្វើការ,សូមសីបសួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។

ធ្វើដំណើរ

- គ្រោះថ្នាក់នៅទីកន្លែងធ្វើការខ្លះ,ប្រហែលជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទារកក្នុងផ្ទៃ។ដូចនេះ,ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរយល់ដឹងអំពីការការពារពីគ្រោះថ្នាក់នៅទីកន្លែងធ្វើការខ្លះនៅពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រហែលជាប៉ះពាល់ដល់វត្ថុគ្រោះថ្នាក់ឬនៅពេលធ្វើការ,សូមសីបសួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។

當個舒適自在的準媽媽

懷孕期間生理心理都會有些改變，準媽媽遇到一些不舒服的症狀時可以如何處理？

頻尿

原　　因：子宮擴大壓迫膀胱，或心理因素。
處理方法：1. 有尿意感立即前往排尿。
2. 白天增加液體攝取量，夜間為減少小便次數，可在晚餐以後減少液體攝取量。

噁心、嘔吐

原　　因：荷爾蒙改變、代謝改變、情緒因素、空腹。
處理方法：1. 起床前先吃些蘇打餅乾、乾吐司或穀類食品後，再下床。
2. 避免在用餐時喝湯或開水。
3. 少量多餐、避免空腹饑餓，可在兩餐間補充食物。
4. 避免油膩、不易消化或調味濃烈之食物。
5. 孕吐後用開水漱口，以去除噁心味。並可喝少許開水，將胃酸沖離食道，以減少食道灼傷的機會。

便秘

原　　因：1. 飲食不足，運動量減少，腸胃蠕動減慢及缺乏纖維質食物引起。
2. 子宮增大使得小腸移位，或子宮壓迫直腸所致。
3. 補充鐵劑而引起。
處理方法：1. 水份充足，一天要攝取2000cc之水份。
2. 適度的運動，早晚做散步活動。
3. 多吃有渣的蔬菜、水果、全穀類。
4. 養成每天定時排便的習慣。
5. 必要時依醫師處方服用軟便劑，切勿自行服用成藥。

ធ្វើជាអ្នកមុតាយដ៏លៃសុខសួរល

កុនុងអំឡុងពលេមានផ្ទៃពោះមានការប្រែប្រួលទាំងកាយនិងចិត្ត,អ្នកមុតាយគួរធ្វើដូចមុតចេនៅពលេមានអាការៈមិនសួរលខ្លួនខ្លះៗ?

- **នាមញឹក**

  មូលហតេុ : រកីសុបួនសងកត់បុលាកនាម,ឬដាយសាមូលហតេុផ្លូវចិត្ត។

  វិធីពុយាហាល:

  ១. គួរទៅហាត់ជីងគូចនាពលេមានអារមុមណ៍។

  ២. ទទួលទានអាហារទឹកអាយហានចុ្រនេនាពលេថ្ងៃ,បនុ្ថយការបត់ជីងគូចនាពលេយប់,អាចកាត់បនុ្ថយអាហារទឹកកុ្រយពលេអាហារពលេយប់។

- **ការខុពីមរអីម,កុអួត**

  មូលហតេុ: កសែ្តរសៅមួន,កសែ្តរកោរដុតបំបកែអាហារកុនុងរាងកាយ,មូលហតេុអារមុមណ៍,គុមានអាហារកុនុងពះ។

  វិធីពុយាហាល:

  ១. បរិភាគនំ,នំហាំងឬអាហារអងុ្គរមុនពលេងមិបពីគេង,ទីបអាចចុះពីគ្រែ។

  ២. ចៀសវាងកុំបរិភាគសំឡបឹកទឹកនាពលេទទួលទានអាហារ។

  ៣.ញ៉ាំតិចៗចុ្រនដង,ចៀសវាងកុំអាយឃ្លាន,អាចទទួលទានអាហាររវាងពលេអាហារពីពលេ។

  ៤. ចៀសវាងកុំទទួលទានអាហារខុលាញ់ដលៃពិបាកកុនុងការរំលាយអាហារឬមានរស់ជាតខុលាំងពកេ។

  ៥. គួរសំអាតមាត់កុ្រយពលេកុអួត,ដីមុបីបំហាត់ខុលឺនរអីម។ ព្រមទាំងអាចជឹកទឹកឆ្អិនបនុ្ថិច លាងជាតិអាសីតកុ្រពះចញេពីផ្លូវអាហារ ដីមុបីបនុ្ទាបឱកាសការរលាកផ្លូវអាហារ។

- **ជំងឺទល់លាមក**

  មូលហតេុ:

  ១. ទទួលទានអាហារមិនគុ្រប់គុ្រាន់,កាត់បនុ្ថយការហាត់បុ្រាណ,កាត់បនុ្ថយលុបឿនរីកកុ្រពះនិងបណ្តុតាលមកពីខុ្រះអាហារមានជាតសសៃ។

  ២.រីកសុបួនធ្វើអាយពាះរៀនគូចបុគូ្រនលុង,ឬបណ្តុតាលមកពីសុបួនសងកត់ពាះរៀនគុ្រង់។

  ៣.បណ្តុតាលមកពីប៊ុីបុ្រាស់ថ្នាំបនុ្ថមែជាតប៊ូ្រឈាម។

  វិធីពុយាហាល:

  ១. មានទឹកគុ្រប់គុ្រាន់,ទទួលទានទឹក 2000ccកុនុង១ថ្ងៃ។

  ២. ហាត់បុ្រាណគួ្រសម,ដីរកំសានុតរាល់ពុ្រកនិងយប់។

  ៣.បរិភាគបនុ្លៃ,ផ្លែឈើ,អាហារធ្លុវីពីអងុ្គរដលៃមានកាក។

  ៤. មានទំលាប់បត់ជីងតាមពលេវាល់ថ្ងៃ។

  ៥. គួរប៊ុីបុ្រាស់ថ្នាំបនុ្ទន់លាមកតាមយាបល់គ្រូពទេ្យនាពលេចាំហាច់,សូមកុំប៊ុីបុ្រាស់ថ្នាំដាយខ្លួនឯង។

當個舒適自在的準媽媽

陰道分泌物增加

處理方法：1. 注意清潔，每天淋浴，勿用消毒水清潔外陰部。
2. 如廁後衛生紙由陰部往肛門處擦拭，勿來回擦以防感染。
3. 勿穿褲襪或緊身衣褲。
4. 宜穿透氣棉質內褲，濕即更換，勿用不透氣護墊，易悶及潮濕。
5. 若分泌物多且有搔癢、灼熱感、臭味情形，應就醫。

抽筋、下肢水腫及靜脈曲張

處理方法：1. 保持下肢溫暖。
2. 攝取含鈣較多的食物，如牛奶、排骨、小魚乾。
3. 抽筋時將腿伸直，以手由足底向小腿方向推、按摩。
4. 勿吃太鹹的食物。
5. 休息時最好採左側臥，可將下肢抬高，使血液循環較流暢。

出血性問題

處理方法：懷孕期間之出血及凝血障礙會導致嚴重的問題，包括流產。如果準媽媽有出血或凝血障礙，請告知您的醫師。

痔瘡

原　　因：便祕、腹瀉、用力使靜脈內壓力增加，增大的子宮壓迫靜脈阻礙循環所致。

處理方法：1. 養成定時排便習慣，避免便祕，蹲坐用力，久坐或久站。
2. 溫水坐浴。
3. 疼痛厲害可看醫師，使用軟便劑或止痛軟膏。



ធ្វើជាមុតាយដលែសុខសុរួល

- **រត្ថុទឹកកុនុងយានីនឹងកីនលីង**

  វិធីពុយាហាល :

  ១. បុរុបុរយ័ត្នសំអាត,ងូតទឹករាល់ថ្ងៃ,សូមកុំបុរីទឹកកំចាត់មរោគសំអាតកុវាយានី។

  ២. កុវាយពលេបត់ជីងបុរីកុរដាស់អនាម័យសំអាតពីកុវាមយានីទៅគូត,សូមកុំជូតទៅមក។ដើមបីកុំអាយឆ្លងរាគ។

  ៣.សូមកុំសុលៀកពាក់ខាអាវ៉ីតខុលួន។

  ៤. សូមសុលៀកខាកុនុងដលែធ្វើពីកុរណាត់សុរួលខុលួន,បុត្ថូរនៅពលេសីម,សូមកុំបុរីបុរាស់សំឡីអនាម័យដលែថប់ខុយល់និងសីម។

  ៥. បុរសិនបីរត្ថុទឹកហូរតាមស្បូនចុរីនពរេក,ហើយរមាស់,កុតា,មានខុលឺនសុអុយ,សូមទៅរកគ្ថូរពទ្យ។

- **រមូលកុរពី,ហ៊ីមជីងនិងហ៊ីមសសជីង**

  វិធីពុយាហាល :

  ១.កុសាជីងអាយមានកំដាកក់កុតា។

  ២. ទទួលទានអាហារដលែមានជាតកាលកុយ្ងមចុរីន,មានដូចជាទឹកដោះគា,ឆ្អឹងជំនី,កូនតុរីកុរៀម។

  ៣.តំរង់ជីងអាយតុរង់នាពលេរមូលកុរពី,បុរីដម៉ៅសាទៅមកពីហាទជីងដល់កូនកំភួនជីងតូច។

  ៤. សូមកុំទទួលទានអាហារបុរពៃរេក។

  ៥. នាពលេសំរាកយកលុអគ្ថូរបខែលួនទៅខាងឆ្វរេង,លីកជីងអាយខុពស់,ធ្វើអាយដំណើរឈាមរត់សុរួល។

- **បញ្ហាបុរភេទញេឈាម**

  វិធីពុយាហាល : ពលេមានផ្ទៃពោះនិងកក់ឈាមអាចប ណុតាលអាយមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូមនាការរលូតកូន ។បុរសិនបីអុនកមុតាយចញេឈាមឬកក់ឈាម,សូមបុរាប់គ្ថូរពទ្យរបស់អុនក។

- **ឫសដូងហាត**

  មូលហាតុ : ទល់លាមក,រាក,បុរីកំលាំងបណុតាលអាយសមុ្ពធកុនុងសសឈាមខុមៅកីនលីង,សុបូនធំលីងសង្កត់សសឈាមខុមៅបណុតាលអាយសុទះដំណើរ។

  វិធីពុយាហាល :

  ១. មានទំលាប់បត់ជីងធំ,ចៀសវាងកុំអាយទល់លាមក,បនុទន់ជង្គង់បុរីកំលាំង,អង្គុយយូរឬឈរយូរ។

  ២. អង្គុយមុជទឹកកុតាអ៊ុន

  ៣.នាពលេឈឺខុលាំងអាចទៅរកគ្ថូរពទ្យ,បុរីបុរាស់ថ្នាំបនុទន់លាមកឬថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់។

當個舒適自在的準媽媽

腰酸背痛

原　　因：姿勢不良、子宮擴大使腰薦椎的曲度增加，懷孕期荷爾蒙改變使關節軟化、鬆弛而導致。

處理方法：1. 保持正確姿勢，背部保持平直，勿彎腰駝背。
2. 避免拿重物、久站、久坐或太勞累。
3. 坐時腰背應有支托。
4. 使用托腹帶支持腹部，減輕背部過度用力。
5. 按摩腰或背部以促進血液循環。

胃灼熱、心口灼熱

原　　因：食道括約肌鬆弛導致胃酸逆流。

處理方法：1. 少量多餐，避免一次進食太快或過多。
2. 避免甜食與油膩、不易消化或油炸的食物。
3. 避免衣物太緊或束緊皮帶，減少胃食道逆流的機會。
4. 進食後宜半坐臥，不要馬上躺下。
5. 嚴重時可在醫師的建議下服用制酸劑、止吐藥物。

蛀牙、牙齦炎、懷孕期牙齦增生、牙周病惡化

原　　因：荷爾蒙改變、進食次數明顯的增加、懷孕的初期對酸性食物特別偏好、常會反胃及吐酸水。

處理方法：1. 維持良好的口腔衛生習慣(餐後及睡前潔牙、搭配牙線/棒及牙間刷)。
2. 定期口腔檢查(懷孕婦女牙結石清除)。
3. 有異常情況應及早接受治療。

ធ្វើជាមុតាយដលែសុខសុរួល

- **ឈឺរួយខុនងចង្កេះ**

  មូលហេតុ : របៀបឈរឬអង្គុយមិនត្រឹមត្រូវ,សុបូនធំជាងមុនបណ្តាលអាយរនុធឆ្អឹងខុនងវាចជាងមុន ,អំលុងពលេមានផ្ទុទ្ធៃ:ហូមូនកប៉ែរប៉ែរបណ្តាលអាយកនុលាក់ឆ្អឹងទន់,ធ្ងរជាងមុន

  វិធីព្យាហាល :

  ១.រកុសារបៀបឈរឬអង្គុយអាយត្រឹមត្រូវ,រកុសាខុនងអាយតុរង់,កុំកាងខុនង។
  ២.ចៀសវាងកុំយករតុធុងន់,ឈរយូរ,អង្គុយយូរឬហាត់នឿយពកេ។
  ៣.ត្រូវមានបង្អកែខុនងនាពលេអង្គុយ។
  ៤.ប៊ីរបុរាស់ខុសរឹតពៈទុរកុហាលពៈ,កាត់បនុថយកុំអាយខុនងប៊ូរីកំលាំងខុលាំងពកេ។
  ៥.ម៉ាសាចង្កេះឬខុនងដីម្បីដំណើរការឈាម។

- **កុរហោយចុងដង្ហិម កុរហោយទុរង**

  មូលហេតុ : ការលុងសាច់ដុំខុជិបនបំពង់អាហារនាំឱ្យមានការចុរាលអាសីដកុរពៈ។

  វិធីដាៈសុរាយ :

  ១.ញ៉ាំតិចតចែ្រនដង ជៀសវាងការញ៉ាំលឿនពកេឬចុរែនពកេ។
  ២.ជៀសវាងបង្អមែនិងជាតិខាញ់អាហារដលែមិនងាយរលាយឬចំណីចៀន។
  ៣.ចៀសវាងសមុលៀកបំពាក់តឹងពកេឬតឹរតបន្តឹងខុសក្រៃវ៉ាត់ជាឱកាសកាត់បនុថយការចុរាលអាសីដកុរពៈ។
  ៤.ញ៉ាំអាហារ រួចត្រូវអង្គុយសិន មិនគួរដកេក្រោម។
  ៥.ករណីធុងន់ធុងរអាចធ្វើតាមដំបូនុមានរបស់គួរពទេុយ ញ៉ាំថ្នាំបនុសាបអាសីដថ្នាំបំហាត់ កុអូត។

- **ពុកធុមញេ រលាកអញ្ចាញធុមញេ មានផ្ទុទ្ធៃ:ភាគចុរីនអញ្ចាញធុមញេរីកធំ ជំងឺអញ្ចាញធុមទេញកាន់តធ្ងែងន់ធ្ងរ**

  មូលហេតុ : អ័រម៉ូនបុរប្រែរួល ចំនួននកៃារបរិភាគកីនឡើងយ៉ាងខ្លាំង អ្នកមានផ្ទុទ្ធៃ:ដំបូងចូលចិត្តអាហារដលែមានជាតិជូរ ចង់អារជាញឹកញាប់និងកុអូតចញេទឹកអាសីដ

  វិធីដាៈសុរាយ :

  ១.រកុសានូវទមុលាប់លុអនកៃារធ្វើអនាម័យមាត់((បរិភាគអាហាររួច មុនចូលគងេ ត្រូវដុះសំអាតធុមញេ រួមជាមួយនឹងអំបៈចាក់ធុមញេ) ។/ដុះចនុលាៈធុមញេ)
  ២.កំណត់ពលេទៅពិនិត្យមាត់ឱ្យហានទឹងទាត់(សុតុ្រមានផ្ទុទ្ធៃ:ត្រូវសំអាតធុមញេដុះសុនឹម)
  ៣.សុថានភាពដលែមិនបុរកុរតីគួរនិងបុរញ្ជាប់ទៅពុយាហាល។



吃出健康(葉酸、碘、鐵)

孕乳婦飲食一般飲食原則

1. 準備懷孕之女性，應將身體調整至健康狀態，並維持理想體重，以作為懷孕之準備。如對孕乳期飲食有疑問者，請洽詢醫師或營養師提供諮詢協助。
2. 體重：懷孕期間，孕婦體重應依懷孕前體重做適當調整，以增加10-14公斤為宜，且須注意體重增加的速度，懷孕期間不適於減重，孕期體重增加指引請參考表一。

表一　孕期體重增加指引

懷孕前的身體質量指數(BMI)*	建議增重量	第二和三期每周增加重量
	公斤(磅)	公斤/週(磅/週)
<18.5	12.5-18 (28-40)	0.5-0.6(1-1.3)
18.5-24.9	11.5-16 (25-35)	0.4-0.5(0.8-1)
25.0-29.9	7-11.5 (15-25)	0.2-0.3(0.5-0.7)
≧30.0	5-9 (11-20)	0.2-0.3(0.4-0.6)
*身體質量指數BMI=體重(公斤)/身高^2(公尺^2)		
資料來源：美國婦產科醫學會(ACOG)		
懷孕前的身體質量指數(BMI)*	建議增重量	12週後每週增重量
	公斤(磅)	公斤/週(磅/週)
雙胞胎	總重 15.9-20.4 (34-45)	0.7
三胞胎	總重 22.7 (50)	
資料來源：美國糖尿病協會(American Dietetic Association)		

3. 熱量：
   (1) 懷孕期的熱量攝取，依據第7版國人膳食營養素參考攝取量(Dietary Reference Intakes, DRIs)建議，自懷孕第二期起，每日需增加300大卡的熱量。但每個人每天的總熱量，需視孕婦的年齡、活動量、懷孕前的健康狀況及體重增加情形，而加以調整。
   (2) 哺乳婦熱量的需要依據第七版國人膳食營養素參考攝取量(DRIs)建議，每日以增加500大卡為宜。
4. 蛋白質：
   (1) 依據第7版國人膳食營養素參考攝取量(DRIs)建議自懷孕第一期起，因胎兒開始發育，每日需額外增加10公克的蛋白質。蛋白質來源中一半以上來自高生物價(High Biological Value, HBV)的蛋白質，如：低脂奶類製品、豆漿、豆腐、豆干等黃豆製品、魚、肉、蛋。

បរិភោគឲ្យមានសុខភាពល្អ (អាស៊ីតហ្វូលិក ជាតិអ៊ីយ៉ូតជាតិដែក)

គោលការណ៍ទទួលទានអាហារទូទៅនស្ត្រីបំបៅដោះ

១. ស្ត្រីដែលរាប់ចំមានផ្ទៃពោះ,ត្រូវថែខ្លួនអោយមានលក្ខណៈសុខភាពល្អ,ហើយរក្សាទំងន់សមរម្យ,ដើម្បីរាប់ចំមានផ្ទៃពោះ។ប្រសិនបើអ្នកមានចំងល់ពីការទទួលទានអាហារក្នុងពេលបំបៅដោះ,សូមសើបសួរគ្រូពេទ្យឬគ្រូជីវជាតផ្តល់ជំនួយ។

២. ទំងន់-អំលុងពេលមានផ្ទៃពោះ,ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវបន្ថែមទំងន់ធ្ងន់ជាងមុនពេលមានផ្ទៃពោះ,បន្ថែម១០-១៤គីឡូក្រាម,ហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នលឿនបន្ថែមទំងន់,អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវបញ្ចុះទំងន់គោលការណ៍ណែនាំ,ការបន្ថែមទំងន់នៅពេលមានផ្ទៃពោះសូមមើលតារាង១។

• តារាង១ គោលការណ៍ណែនាំការបន្ថែមទំងន់អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ(Guidelines for prenatal weight gain)

ទំងន់ខ្លួន(BMI)* មុនពេលមានផ្ទៃពោះ	អាយយាបល់បង្កើនទំងន់	ដំណាក់កាលទី២ និងទី៣ ត្រូវបង្កើនទម្ងន់ជារៀងរាល់សប្ដាហ៍
	គីឡូក្រាម(pound)	គីឡូក្រាម/សប្តាហ៍(pound/សប្តាហ៍)
<18.5	12.5-18 (28-40)	0.5-0.6(1-1.3)
18.5-24.9	11.5-16 (25-35)	0.4-0.5(0.8-1)
25.0-29.9	7-11.5 (15-25)	0.2-0.3(0.5-0.7)
≧30.0	5-9 (11-20)	0.2-0.3(0.4-0.6)

*ទំងន់ BMI=ទំងន់(គីឡូក្រាម)/កំពស់(សម)

ប្រភពឯកសា : សមាគមន៍វេជ្ជសាស្ត្ររោមរិកជនកែសម្ភព (ACOG)

ទំងន់ខ្លួន(BMI)* មុនពេលមានផ្ទៃពោះ	អាយយាបល់បង្កើនទំងន់	បន្ថែមទំងន់រាល់សប្តាហ៍ក្រោយពេលមានផ្ទៃពោះ១២សប្តាហ៍
	គីឡូក្រាម(pound)	គីឡូក្រាម/សប្តាហ៍(pound/សប្តាហ៍)
កូនភ្លោះ២	សរុបទំងន់ 15.9-20.4(34-45)	0.7
កូនភ្លោះ៣	សរុបទំងន់ 22.7(50)	

ប្រភពឯកសា : សមាគមន៍ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាមេរិក(American Dietetic Association)

៣.កាឡូរី

(១) កាឡូរីក្នុងអំលុងពេលមានផ្ទៃពោះ,យោងទៅតាមយោបល់ទទួល(Dietary Reference Intakes, DRIs) ពីជីវជាតពលរដ្ឋយើង,ចាប់ តាំងពីអំលុងពេលទី២នៅពេលមានផ្ទៃពោះ,គួរទទួលទានអាហារដែលមានកាឡូរី៣០០កាក្នុង១ថ្ ងៃ។ប៉ុន្តែសរុបកាឡូរីក្នុង១ថ្ងៃរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ,យោងទៅតាមអាយុ, បរិមាណពលកម្ម,ស ថានភាពសុខភាពមុនពេលមានផ្ទៃពោះនិងស្ថានភាពបន្ថែមទំងន់,ហើយតំរង់តាមនោះ។

(២) តម្រូវការថាមពលកម្ដៅរបស់ស្ត្រីអោយកូនបៅ ត្រូវផ្អែកទៅលើតម្រូវការអំពីជីវជាតិនប្រែជាជនក្នុងតំបន់ ទី៧ (DRIs) នេះ, បានកើនឡើង 500 kcal ក្នុងមួយថ្ងៃតើសមរម្យ

៤.ប្រូតេអ៊ីន

(១) យោងទៅតាម សចេក្តីយោងនកោរស្រូបយករបបអាហារប្រជាជន (DRIs) ហះពុម្ពលើកទី៧ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគប្បីស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនចំនួន១០ក្រាមបន្ថែមទៀតពីលើបរិមាណដែលត្រូវស្រូបយកជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីដំណាក់កាលមានគភ៌ទី១ទៅ ព្រោះកូនក្នុងផ្ទៃបានចាប់ផ្ដើមរីកលូតលាស់។ លើសពីពាក់កណ្ដាលនប្រភេពប្រូតេអ៊ីន បានមកពីប្រូតេអ៊ីនតម្លៃជីវសាស្ត្រខ្ពស់ (High Biological Value, HBV) មាន៖ ផលិតផលទឹកដោះគោមានជាតិខ្លាញ់ទាប ផលិតផលសណ្ដែកលឿងដូចជាទឹកសណ្ដែក ពងមាន់ និងពងទា ត្រី សាច់ និង ស៊ុត។

吃出健康(葉酸、碘、鐵)

(2)哺乳期間每日母乳的分泌量在生產後2-3個月平均約達850毫升，因乳汁含有1.1%的蛋白質，母乳提供幼兒的蛋白質約為10公克，所以建議哺乳婦每日應增加15公克蛋白質的攝取，蛋白質來源中一半以上應來自高生物價蛋白質。

5.懷孕/哺乳期許多維生素及礦物質的需求量增加，孕產婦應均衡攝取六大類食物，多攝取深色蔬菜、全穀雜糧，且應主要來自天然食物，而非選擇單一營養素或礦物質補充劑，或可在醫師建議下選擇市面上孕婦專用綜合維他命，以補充孕期足夠的礦物質和維生素。

6.礦物質：

(1)碘：婦女懷孕時碘嚴重不足時有可能會影響胎兒腦部發育，造成新生兒生長遲緩和神經發育不全，甚至增加嬰兒死亡率，孕婦碘建議200微克/天，哺乳婦建議250微克/天，含碘的食物，如:海苔、海帶、貝類、綠色蔬菜、蛋類、乳類、穀類等，其中以海帶、海藻含碘量最為豐富，烹飪時可選擇碘鹽以增加碘的攝取。

(2)鐵：懷孕時鐵質的需要量增加，孕期第一期及第二期建議攝取量15毫克/天，第三期與哺乳婦建議則增加攝取至45毫克/天，鐵的補充除了供應孕婦本身及胎兒所需外，並大量貯存在胎兒體內，以供嬰兒出生後四個月內使用。孕期鐵營養不足可能對胎兒的腦部與精神症狀造成不良影響，鐵質豐富的食物，如：深綠色蔬菜、紅肉、肝腎內臟、貝類等。

(3)鈣：懷孕/哺乳期應攝取充足的鈣質，孕婦及哺乳婦鈣建議攝取1000毫克/天，以滿足胎兒/嬰兒的生長和母體的需要。鈣質豐富的食物，如：低脂牛乳、乳製品、豆腐、深綠色蔬菜等。

(4)鈉：懷孕期間若有高血壓或水腫等症狀，則應限制鈉的攝取量。

(5)鎂：懷孕期間鎂攝取增加可減少子癲前症與胎兒子宮內發育不全的發生率。孕婦鎂建議355毫克/天，哺乳婦建議320毫克/天，富含於葉綠素的蔬菜中，如菠菜、莧菜及甘藍菜等，其他如胚芽、全穀類之麩皮、堅果種子類及香蕉等。

(6)鋅：孕婦的鋅營養狀態不足，可能會造成胎兒在子宮生長遲緩與神經管缺陷。孕婦與哺乳婦鋅建議攝取量為15毫克/天，動物性來源如肝臟、瘦肉、牡蠣，甲殼類的鋅含量高。

(7)其他：礦物質攝取量應達到國人膳食營養素參考攝取量，並且不超過其上限攝取量。

បរិភោគឲ្យបានសុខភាពល្អ (អាស៊ីតហ្វូលិក ជាតិអ៊ីយ៉ូតជាតិដែក)

(២) ក្នុងដំណាក់កាលបំបៅដោះ ការបញ្ចេញទឹកដោះម្ដាយមានបរិមាណជាមធ្យម៨៥០មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ ក្រោយពេលសម្រាលរយៈពេល២ទៅ៣ខែ។ពីព្រោះទឹកដោះមានប្រូតេអ៊ីន1.1%,ទឹកដោះម្ដាយផ្ដល់នូវប្រូតេអ៊ីនប្រហែល១០ក្រាម,ដូច្នេះអោយយោបល់ស្ត្រីបំបៅដោះបន្ថែមប្រូតេអ៊ីន១៥ក្រាមក្នុង១ថ្ងៃ,ប្រភេទប្រូតេអ៊ីនលើសពីពាក់កណ្ដាលមកពីប្រូតេអ៊ីនជីវសាស្ត្រខ្ពស់(High Biological Value, HBV)

៥. ក្នុងដំណាក់កាលមានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅទឹកដោះកូន តម្រូវការនៃបរិមាណវីតាមីននិងសារជាតិរ៉ែនឹងកើនឡើង ស្ត្រីជាម្ដាយគប្បីស្រូបយកប្រភេទអាហារធំៗទាំង៦ឲ្យបានសមីគ្នា ស្រូបយកបន្លែផ្លែឈើមានពណ៌ចាស់ និងធញ្ញជាតិឲ្យបានច្រើន ដែលអាហារទាំងនេះគប្បីបានមកពីធម្មជាតិជាចម្បង ដោយមិនមែនជាថ្នាំបំប៉នវីតាមីនឬសារជាតិរ៉ែនោះទេ ឬ អាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់វីតាមីនចម្រុះសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមាននៅលើទីផ្សារនៅក្រោមដំបូន្មានរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីបំប៉នវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។

៦. ជាតិខនិជ

(១) អ៊ីយ៉ូដ៖ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលខ្វះខាតអ៊ីយ៉ូដធ្ងន់ធ្ងរអាចប៉ះពាល់ដល់ការរីកលូតលាស់ខួរក្បាលរបស់ទារក បង្កឲ្យទារកលូតលាស់យឺត និងការរីកលូតលាស់សរសៃប្រសាទមិនពេញលក្ខណៈអាចបង្កើនអត្រាស្លាប់របស់ទារក ផ្ដល់យោបល់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ការប្រើជាតិអ៊ីយ៉ូដ២០០ មីក្រូក្រាម / ថ្ងៃ ផ្ដល់យោបល់ដល់ដោះស្ត្រីបំបៅដោះកូន ២៥០មីក្រូក្រាម/ថ្ងៃ អាហារដែលមានជាតិអ៊ីយ៉ូដមានដូចជា៖សារ៉ាយសមុទ្រ ពពួកខ្យង បន្លែបៃតង ស៊ុត ទឹកដោះគោ ធញ្ញជាតិផ្សេងៗ ក្នុងចំណោមសត្វសមុទ្រ សមុទ្រសំបូរជាតិច្រើនបំផុត អាចជ្រើសរើសនិងប្រើអំបិលអ៊ីយ៉ូដពេលចម្អិនអាហារដើម្បីបង្កើននិងស្រូបយកជាតិអ៊ីយ៉ូដ។

(២) ជាតិដែក៖ ពេលមានផ្ទៃពោះតម្រូវការនៃបរិមាណជាតិដែកនឹងកើនឡើង។ ក្នុងដំណាក់កាលមានផ្ទៃពោះទី១ និងទី២ ត្រូវស្រូបយកជាតិដែក ១៥mg/ថ្ងៃ។ ក្នុងដំណាក់កាលទី៣ និង ដំណាក់កាលបំបៅទឹកដោះកូន ត្រូវបង្កើនការស្រូបយកជាតិដែក ៤៥mg/ថ្ងៃ។ ការបំប៉នជាតិដែកក្រៅពីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៃរាងកាយម្ដាយនិងទារក ជាតិដែកមួយចំនួនធំនឹងបង្គរនៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់ទារក ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទារកប្រើប្រាស់រយៈពេល៤ខែក្រោយពេលចាប់កំណើត។កង្វះជាតិដែកក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានចំពោះខួរក្បាល និងស្មារតីរបស់កូនក្នុងផ្ទៃ។ អាហារដែលសម្បូរជាតិដែកមាន៖ សាច់ក្រហម ថ្លើម តម្រងនោម និង ប្រភេទសត្វមានសម្បក ជាដើម។

(៣) កាល់ស្យូម៖ ក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅទឹកដោះកូន ត្រូវស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ ស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះ និងស្ត្រីកំពុងបំបៅកូនគប្បីស្រូបយក ១០០០mg/ថ្ងៃ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការលូតលាស់របស់កូនក្នុងផ្ទៃ ឬទារក និងរាងកាយរបស់ម្ដាយខ្លួនឯងផ្ទាល់។អាហារដែលសម្បូរជាតិកាល់ស្យូមមាន៖ ទឹកដោះគោជាតិខ្លាញ់ទាប ផលិតផលទឹកដោះគោ តៅហ៊ូ និងបន្លែពណ៌បៃតង។

(៤) សូឌីយ៉ូម-អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះប្រសិនបើមានជំងឺលើសឈាមឬហើម។ល។ត្រូវកុំទទួលទានអាហារមានសូឌីយ៉ូមច្រើនពេក។

(៥) ម៉ាញ៉េស្យូម៖បង្កើនការស្រូបយកជាតិម៉ាញ៉េស្យូមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ អាចកាត់បន្ថយអត្រាកើតជំងឺលើសឈាមនៅពេលមានផ្ទៃពោះ និងទារកនៅក្នុងស្បូនម្ដាយលូតលាស់មិនពេញលក្ខណៈផ្ដល់យោបល់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការប្រើម៉ាញ៉េស្យូម៣៥៥មីលីក្រាម / ថ្ងៃ ផ្ដល់យោបល់ដល់ស្ត្រីបំបៅដោះកូនចំនួន ៣២០ មីលីក្រាម/ ថ្ងៃមានសំបូរនៅក្នុងបន្លែពណ៌បៃតងដូចជាការ៉ុតផ្ទីស ស្ពៃខៅត់ណាផ្សេងៗក្រៅពីនេះដូចជាត្រយូងផ្កាយ គ្រាប់ធញ្ញជាតិជាប់សំបក ពពួកគ្រាប់ផ្លែឈើ គ្រាប់ពូជនិង ផ្លែចេកេ។

(៦) ស័ង្កសី៖ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានស្ថានភាពខ្វះអាហារឧបត្ថម្ភស័ង្កសី អាចបណ្ដាលឲ្យទារកក្នុងស្បូនលូតលាស់យឺតនិងពិការបំពង់សរសៃប្រសាទ។ ផ្ដល់យោបល់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីបំបៅដោះកូនការប្រើស័ង្កសី១៥មីលីក្រាម/ថ្ងៃ ប្រភពមកពីគ្រឿងក្នុងសត្វសាច់សុធ ងាវ ពួកសត្វស្នូកមានជាតិស័ង្កសីខ្ពស់។

(៧) ដទៃ-ទទួលជាតិខនិជតាមការកំណត់នៃពេលវេជ្ជបទេសយើងតាមរយៈជីវជាតិក្នុងអាហារ,ហើយកុំច្រើនលើសពីនេះ។

吃出健康(葉酸、碘、鐵)

7. 維生素：懷孕及哺乳期間大部分維生素的需要量均增加。

(1) 維生素B1、B2、B6和菸鹼素的需要量是伴隨熱量及蛋白質的增加而升高。維生素B1以小麥胚芽含量最豐富，此外，堅果、瘦豬肉、肝臟、大豆及其製品、奶粉等亦是主要來源；維生素B2存在於大部分動植物組織，其中牛奶、乳製品及強化穀類含量最為豐富；維生素B6於各種肉類、全穀類。富含菸鹼素的食物包含動物肝臟、牛肉、豬肉、雞肉、魚貝類、蛋、奶類、乳酪、糙米、胚芽米、酵母菌、香菇、紫菜等。

(2) 維生素B12：母親維生素B12於缺乏或是不適當的狀態下，可能會導致胎兒神經管缺陷。對於全素食者，應特別注意維生素B12的補充。維生素B12豐富的食物，如：主要為動物性食物來源，其中肝臟、肉類等含量最為豐富。

(3) 其他：維生素攝取量應達到國人膳食營養素參考攝取量，並且不超過其上限攝取量。

8. 葉酸的重要性：

(1) 國內嬰幼兒神經導管缺陷發生率，以1993年至2002年通報神經管缺陷之出生人口調查發現，十年來神經管缺陷發生率介於0.4-1‰，平均發生率約為萬分之7。依據美國實證研究顯示，孕期攝取足夠的葉酸可以預防胎兒腦及脊髓的先天性神經管缺陷的比例，可減少50-70%胎兒的腦及脊髓的先天性神經管缺陷的發生。根據國人膳食營養素參考攝取量(DRIs)，孕齡婦女每日建議攝取400微克葉酸，準備懷孕婦女則在受孕前一個月至懷孕期間，每日攝取600微克的葉酸，哺乳婦建議每日攝取500微克的葉酸，以供自身與胎兒所需。

(2) 葉酸廣泛存在於許多食物中，如：綠色蔬菜、肝臟、酵母、豆類及水果(如柑橘類)，都是豐富的來源，葉酸攝取建議應優先由天然食物中多樣攝取。如果在日常飲食中攝取不足，建議在醫師處方指導下，補充葉酸錠劑。

9. 食物的選擇要均衡，孕、乳婦應減少或避免攝取下列食物：

(1) 菸、酒、咖啡與濃茶。

(2) 脂肪含量多的食物，如：肥肉、油炸食物等。

(3) 煙燻加工食物，如：醃肉、鹹蛋、鹹魚、火腿、豆腐乳等。

(4) 高熱量食物，如：糖果、可樂、汽水等。

10. 懷孕初期若有噁心、嘔吐等現象，應少量多餐及選擇低脂肪且無刺激性的食物，早晨醒來時，可吃些五穀類食物，如餅乾、饅頭等改善孕吐。在懷孕末期，避免碳水化合物及脂肪攝食過多時，造成體脂肪增加。

11. 不明來源的中藥非經合格中醫師確認用藥用量及用法者，應避免食用之。

(資料來源：國民健康署、中華民國營養師公會全國聯合會)

បរិភោគឲ្យមានសុខភាពល្អ (អាស៊ីតហ្វូលិក ជាតិអ៊ីយ៉ូតជាតិដែក)

៧.ជីវជាតិ-អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនិងបំបៅដោះ,តំរូវការជីវជាតិច្រើនជាងមុន។

(១) វីតាមីន B១ B២, B៦ និងតម្រូវការរបស់វីតាមីនណៀស៊ីន(Niacin)គឺអាស្រ័យលើកាឡូរីខ្លះនិងការបន្ថែមហើយក៏នឡើងនប្រែរួតអើន។វីតាមីនB១ ក្នុងធញ្ញជាតិសំបូរជាងគេបំផុត ក្រៅពីនេះ គ្រាប់ផ្លែឈើសាច់ជ្រូកសុធ ថ្លើម សណ្តែកសៀងនិងផលិតផលរបស់ពួកគេម្សៅទឹកដោះគាគឺជាប្រភេទសំខាន់មួយវីតាមីន B២ មានវត្តមាននៅក្នុងជាលិកាក្រុខជាតិជាច្រើន រួមមានទឹកដោះគោ ផលិតផលទឹកដោះគោ និងពងរឹងប្រភេទសំបកច្រើនបំផុត។វីតាមីន B៦មានក្នុងពពួកសាច់គ្រប់ប្រភេទធញ្ញជាតិទាំងមូល។ប្រភេទអាហារដែលផ្ទុកជាតិណៀស៊ីន(Niacin)ដ៏សម្បូរទៅមានថ្លើមសត្វសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់មាន់ត្រីស៊ុត ទឹកដោះគោឈីសអង្ករសំរូប អង្ករអំប្រីយ៉ុង មដើមផ្ទៃសិតបន្លែ។ល។

(២) វីតាមីនB12៖ម្ដាយមានកង្វះវីតាមីនប្រភេទB១២ឬមានវីតាមីនប្រភេទនេះមិនសមស្រប អាចបណ្ដាលឲ្យទារកមានកង្វះខាតបំពង់សសប្រៃសាទ។ចំពោះអ្នកបរិភាគម្ហូបបួស ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំប៉នវីតាមីនB១២។អាហារសម្បូរវីតាមីនB១២មាន៖មានប្រភពចម្បងមកពីអាហារប្រភេទសត្វ ក្នុងនោះ ថ្លើម និងសាច់សម្បូរវីតាមីនB១២ជាងគេ

(៣) ដទៃ-ទទួលជាតិខនិជតាមការកំណត់នពេលរដ្ឋប្រទេសយើងតាមរយៈជីវជាតិក្នុងអាហារ,ហើយកុំច្រើនលើសពីនេះ។

៨.សារៈសំខាន់សារធាតុជូ

(១) អត្រាពិការបំពង់សរសប្រៃសាទទារកនៅក្នុងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣-២០០២ បានរកឃើញចំនួនកំណើតប្រកាសពីភាពពិការបំពង់សរសប្រៃសាទថា ១០ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានពី ០,៤ ទៅ ១នអត្រាពិការបំពង់សរសៃ។%អត្រាជាមធ្យមប្រមាណ៧ភាគមឺន។ផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងបង្ហាញថា សមាមាត្រនៃការទទួលទានអាស៊ីដហ្វូលីកបានគ្រប់គ្រាន់អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអាចការពារភាពពិការបំពង់សរសប្រៃសាទពីកំណើតរបស់ខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នងទារក ហើយអាចកាត់បន្ថយ50- 70%នគ្រោះថ្នាក់ពិការបំពង់សរសប្រៃសាទពីកំណើតរបស់ខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នងទារក។យោងទៅតាមការស្រូបយកចំនួនរបបអាហារសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ប្រជាជន(DRI) សូមផ្ដល់យោបល់ដល់ស្ត្រីស្ថិតក្នុងវ័យបន្តពូជត្រូវទទួលទានអាស៊ីដហ្វូលិក៤០០ មីក្រូក្រាមប្រចាំថ្ងៃ ស្ត្រីត្រៀមមានផ្ទៃពោះនៅមុនពេលមានផ្ទៃពោះ1ខដែលកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះត្រូវទទួលទានអាស៊ីដហ្វូលិក៦០០មីក្រូក្រាមប្រចាំថ្ងៃ ផ្ដល់យោបល់ដល់ស្ត្រីបំបៅដោះកូនត្រូវទទួលទានអាស៊ីដហ្វូលិក៥០០មីក្រូក្រាម ជាតម្រូវការសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់និងទារកក្នុងផ្ទៃ។

(២) អាស៊ីដហ្វូលលិកមានផ្ទុកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងអាហារជាច្រើនដូចជា៖ បន្លែបៃតង ថ្លើម មដើមបៃ ពួកសណ្ដែកនិងផ្លែឈើ (ដូចជាក្រូច) ទាំងនេះសុទ្ធតែជាប្រភពដ៏សម្បូរបែប សូមផ្ដល់យោបល់ថាការស្រូបយកអាស៊ីដហ្វូលលិកត្រូវជ្រើសរើសយកអាហារធម្មជាតិចម្រុះជាចំបង។ប្រសិនបើការទទួលទានមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃ សូមផ្ដាំថាត្រូវបំប៉នអាស៊ីតហ្វូលិកគ្រាប់ដើម្បីជាជំនួយ ក្រោមវេជ្ជបញ្ជាគ្រូពេទ្យ។

៩.គួរជ្រើសរើសអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់មុខ,ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីបំបៅដោះគួរកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារខាងក្រោមនេះ

(១) បារី,ស្រា,កាហ្វេនិងតែខៅប់។
(២) អាហារដែលមានសារធាតុខ្លាញ់ច្រើន,មានដូចជា-សាច់ខ្លាញ់,អាហារបំពង។ល។
(៣) អាហារឆ្អើរឬអាហារកំប៉ុង,មានដូចជា-សាច់ផ្ទុក,ពងទាប្រៃ,ត្រីប្រៃ,សាច់ប៉ាតេ,តៅហ៊ូ។ល។
(៤) អាហារដែលមានការលីខ្ពស់,មានដូចជាស្ករគ្រាប់,កូកាកូឡា,ទឹកក្រូច។ល។

១០. អំឡុងពេលដំបូងនៃពេលមានផ្ទៃពោះប្រសិនបើមានអាការៈអើមចង់ក្អួត,គួរញ៉ាំតិចៗហើយច្រើនដង,គួរជ្រើសរើសអាហារដែលមានខ្លាញ់តិចនិងមានជាតិសាប,នៅពេលងើបពីសំរាន,អាចទទួលទានអាហារដែលធ្វើពីស្រូវអង្ករ,មានដូចជានំ,នំបុ័ង។ល។ដែលអាចសំរួលខ្លួនពីការក្អួត។នៅអំឡុងពេលចុងក្រោយនៃពេលមានផ្ទៃពោះ,ចៀសវាងអាហារកាបូអ៊ីត្រាតនិងខ្លាញ់ច្រើនពេក,បណ្ដាលអោយបង្កើនខ្លាញ់ក្នុងខ្លួន។

១១.ថ្នាំចិនសដែលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់,ដែលមិនមែនជាថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យចិនបើកអោយ,សូមកុំប្រើប្រាស់។

(ប្រភពទិន្នន័យ៖ ទីស្នាក់ការសុខាភិបាលប្រជាជន និង សម្ព័ន្ធសមាគមន៍ទូទាំងប្រទេសនៃសមាគមន៍អ្នកឯកទេសផ្នែកចំណីអាហារសាធារណៈរដ្ឋចិន)

準媽媽的健康注意事項

一些病菌的感染，在懷孕期間可能經由母體傳染給寶寶，或於生產過程中，經由接觸母親的血液與分泌物而感染，因此須特別注意，例如：陰道感染、B型肝炎、梅毒、德國麻疹、乙型鏈球菌、水痘、愛滋病、腸病毒等。如果發生這些感染，應儘早就醫，接受適當的治療，才可保障媽媽及胎兒的健康。

預防新生兒病毒感染

孕婦在生產前後，如出現發燒、上呼吸道感染症狀、腹瀉、肋肌痛、心肌炎等疑似病毒感染情形，可透過分娩時或產後之接觸而傳染給新生兒，產婦應加強在接觸嬰兒前後做好戴口罩、勤洗手等感染防護措施，以降低傳染給嬰兒之機會。必要時(如母親症狀嚴重無法照顧嬰兒，或無法確保自己的衛生習慣…等)，考慮短暫的隔離。

新生兒感染後，可能出現發燒、厭食、嘔吐、焦躁不安、臉色蒼白、心跳快速、活動力下降、呼吸淺快、發紺、全身有出血點、瘀青、黃疸等症狀，甚至可能導致死亡。照顧者應注意觀察，如有上述症狀，請盡速就醫。

為避免懷孕期間受到病毒感染，準媽媽應多注意：

1. 均衡飲食、適度運動，以加強個人的免疫力。
2. 注意個人衛生，勤洗手。
3. 少到公共場所，避免接觸感染源。
4. 提高警覺，如有不明原因的發燒症狀，應告訴醫師。

孕婦或準備懷孕的婦女可以接種流感疫苗，孕婦為世界衛生組織(WHO)建議的流感疫苗優先接種對象之一，我國也自103年度開始納入公費流感疫苗接種對象。孕婦於懷孕期間生理狀況的改變，會增加流感的嚴重度及後遺症，且研究資料都顯示孕婦接種流感疫苗後對其本身及胎兒均無特殊危險性，因此建議孕婦接種流感疫苗，而準備懷孕的婦女，亦可考慮於流行季來臨前或流行期自費接種疫苗。

បុរការបុរុងបុរយ័តុនសុខភាពនអ្នកមុតាយ

ការឆ្លងរាគខ្លះៗ,បុរហលៃជាឆ្លងពីមុតាយទៅកូនកុនុងអំលុងពលៃមានផ្ទៃពោះ,ឬកុនុងកាលៈទសេះសំរាលកូន,ឆ្លងតាមឈាមមុតាយ,ដូចនេះសូមបុរុងបុរយ័តុនជាពិសសេ,ឧទាហណ៍-ឆ្លងរាគយានី,រាគថ្លើមB,រាគសុវាយ,កញ្ជ្រិលអាលឺមង់,ករុមហាក់តធីបុរភេទ,អ៊ុតសុវាយ,អដេស៍,រាគពោះវៀន។ល។បុរសិនបីហានឆ្លងរាគទាំងនេះ,តុរវធ្វើការពុយាហលជាបនុទាន់,ទីបអាចការពារសុខភាពមុតាយនិងទារកកុនុងផ្ទៃ។

• ការបង្ការការឆ្លងមរោគរបស់ទារកទីបកីត

មុននិងកុរាយពលៃសមុរាល បុរសិនបីសុរដីមានផ្ទៃពោះមានអាការៈគុរុនកុដាឆ្លងមរោគផ្លូវដង្ហើមខាងលើ រាគុរស ឈឺសាច់ដុំធុងើងជំនឺរនិងរលាកសាច់ដុំបេះដូងជាដីម អាចនឹងចមុលងទៅដល់ទារកទីបកីតតាមរយៈការប៉ះពាល់ពលៃសមុរាលនិងកុរាយពលៃសមុរាល។ សុដ្ឋីមានផ្ទៃពោះតុរូវពង្រឹងវិធានការការពារការចមុលងដូចជា លាងដនៃងពាក់ម៉ាស់មាត់មុននិងកុរាយពលៃប៉ះពាល់ទារក ដីមុបីបនុទាបឱកាសនការចមុលងមរោគដល់ទារក។ពលៃចាំហាច់ (ឧទាហរណ៍ មុដាយមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចមីលថៃទៅទារកហន ឬមិនអាចធានាដល់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនជាដីម) អាចពិចារណានាដាច់ពីគុនាបណ្តាៈអាសន្ន។

កុរាយពលៃទារកទីបកីតឆ្លងជម្ងឺ អាចនឹងមានអាការៈ គុរុនកុដាខ្ពីមអាហារកុអូតអនុ្ទៈសារមិនសុខ ទឹកមុខស្លកេស្លាំង ចង្វាក់បេះដូងលាឿនប់ភាពរស់រវើកចុះខ្សោយ ដកដង្ហើមខ្លី សុបកៃឡើងពណិស្វាយ ខ្លួនបុរាណមានចំណុចចញេរាម ជាំ និងជម្ងឺខាន់លឿងជាដីម ឬអាចបណ្តាលឲ្យសុលាប់។ អ្នកមីលថៃទៅតុរូវបុរុងបុរយ័តុនកុនុងការសង្កេតេ បុរសិនបីមានអាការៈខាងលើ តុរូវទៅពុយាហលជាបនុទាន់។

• ដីមុបីចៀសវាងកុំអាយឆ្លងរាគកុនុងពលៃមានផ្ទៃពោះ,អ្នកមុតាយគួរបុរុងបុរយ័តុន

១. ទទួលទានអាហារដលៃមានជីវជាតិគុរប់យ៉ាង,ហាត់បុរាណគួរសម,ដីមុបីអាយមានសុខភាពមាំមួន។
២. បុរុងបុរយ័តុនអនាម័យខ្លួន,ឧសុសាហ៍លាងដៃ។
៣. កុំទៅទីសាធារណៈញឹកញាប់ពក,ចៀសវាងបុរភពមរោគ។
៤. តុរូវបុរុងបុរយ័តុន,បុរសិនបីកុតាខ្លួនដាយគុមានមូលហតេុ,តុរូវជំរាបគុរូពទេុយ។

សុត្ថីមានផ្ទៃពោះឬសុត្ថីដលៃកំពុងតពៃយាយាមដីមុបីកុលាយជាអ្នកមានផ្ទៃពោះអាចចាក់ថ្នាំបង្ការគុរុនផ្តាសាយ ងគុការសុខភាពពិភពលាក(WHO)ដល់យាបល់ដល់ សុត្ថីមានផ្ទៃពោះដលៃជាដគៃ្វរមានអាទិភាពកុនុងចាក់ថ្នាំបង្ការគុរុនផ្តាសាយ។ ងនៅកុនុងបុរទសេរបស់ខ្ញុំចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤ក៏ចាប់ផ្តដីមរួមបញ្ចូលមូលនិធិសាធារណៈសំរាប់អ្នកតុរូវការថ្នាំបង្ការគុរុនផ្តាសាយដរែ។ ការផ្តលាស់បុតូរសុថានភាពខាងសរីរវិទ្យានសុត្ថីដលៃមានផ្ទៃពោះអំឡុងពលៃមានផ្ទៃពោះអាចបង្កនភាពធ្ងន់ធ្ងរនជៃងឺផ្តាសាយនិងផលវបិាកហាយការសិកុសាហនបង្ហាញថា សុរតីមានផ្ទៃពោះបនុទាប់ពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺផ្តាសាយគឺនមាន គុរាៈថ្នាក់ចំឡកៃដល់ខ្លួនគនេងទារកទ។ ហតេុនេះហាយសូមផ្តល់យាបល់ថាសុត្ថីមានផ្ទៃពោះតុរូវរតចាក់ថ្នាំបង្ការគុរុនផ្តាសាយ ដូចគ្នានេះផងដរែចំពោះសុត្ថីជាអ្នកតុរៀមមានផ្ទៃពោះ ក៏គួរពិចារណាដរែនៅមុនរដូវកាលផ្តាសាយមកដល់ ឬនាកុនុងកំឡុងរដូវកាលផ្តាសាយគួរតចាក់ថ្នាំបង្ការដាយចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួន។

準媽媽的健康注意事項

妊娠合併症

◎高血壓及子癲前症

妊娠合併高血壓的情形有下列幾種：

(1) 妊娠性高血壓：

因懷孕而引起的高血壓(指收縮壓≧140mmHg或舒張壓≧90mmHg)，不合併尿蛋白，產後12週內會恢復正常。

(2) 子癲前症（又稱“妊娠毒血症”）：

指妊娠20週以後才出現的高血壓，同時合併有尿蛋白(常合併全身性水腫)。

(3) 子癲症、子癲前症同時合併抽痙、癱瘸

(4) 慢性高血壓：

懷孕以前已經出現高血壓或高血壓出現在妊娠20週之前；另一種情況是妊娠20週以後才出現高血壓，但產後12週內還沒有恢復正常。

妊娠合併高血壓的孕婦，須密切配合醫囑門診追蹤，定期評估胎盤的功能與胎兒的發育狀況。平常要多休息，特別注意血壓及胎動變化，避免產生壓力。飲食方面應注意飲食輸出入量、採高蛋白飲食、控制鹽分攝取。

◎糖尿病

在妊娠合併糖尿病的懷孕婦女，可分為兩種，一種為懷孕前就已經知道是糖尿病患者；而婦女不論是罹患第一型或第二型的糖尿病者，在懷孕後應持續或改用胰島素控制血糖，並與醫師及營養師配合。另一種是妊娠期間首度出現糖尿病明顯症狀者，或經糖尿病篩檢陽性者再經「葡萄糖耐量試驗」，判定為異常者，即稱為妊娠性糖尿病。

糖尿病孕婦於妊娠期間，應洽詢營養師解說及指導適當的孕期飲食治療；提供衛教諮詢；了解孕母高血糖對胎兒可能的影響、如何預防高血糖、認識低血糖症狀與處理、居家自我測試及紀錄血糖。而在產前持續施打胰島素的孕婦，產中應將血糖維持在正常範圍內(70-140mg/dL)，避免母體血糖持續增高，造成新生兒次發性高胰島素血症及新生兒持久性低血糖反應。

(資料來源：中華民國糖尿病衛教學會)

បុរការគួរយកចិត្តទុកដាក់សុខភាពអ្នកមុតាយ

ជំងឺកីតឡើងនៅពេលមានផ្ទៃពោះ

• ជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺក្រឡាតុលីង ជំងឺលើសឈាមនៅពេលមានផ្ទៃពោះមានសុថានភាពដូចខាងក្រោម

(១) ជំងឺលើសឈាមនៅពេលមានផ្ទៃពោះ
លើសឈាមដោយសារមានផ្ទៃពោះ(≧140mmHg≧90mmHg)ទឹកនាមមិនសូរប,នឹងមានបុរកុរតីដូចជីមកុរាយពេលសំរាលកូន១២សប្តាហ៍។

(២) ជំងឺក្រឡាតុលីង ភាពស្មុកស្មុមាញរួមនិងការកន្តុរាក់មុនក្រឡាតុលីង ជំងឺឆ្កួតជ្រូក។
មុនពេលមានជំងឺឈាមពល់ផ្ទៃពោះ-មានន័យថាមានការលើសឈាមក្រាយពេលមានផ្ទៃពោះ២០សប្តាហ៍,មានបុរតអើនទឹកនាមកុនុងពេលជាមួយគ្នា(តង្កែតហើមខ្លួន)

(៣) ជំងឺក្រឡាតុលីងជំងឺលើសឈាមនៅពេលមានផ្ទៃពោះ មមានទាំងការបុរកាច់និង, ជំងឺឆ្កួតជ្រូក

(៤) ជំងឺលើសឈាម
មានជំងឺលើសឈាមមុនពេលមានផ្ទៃពោះឬក្រាយពេលមានផ្ទៃពោះ២០សប្តាហ៍,សុថានភាព១ទៀតគឺមានជំងឺលើសឈាមក្រាយពេលមានផ្ទៃពោះ២០សប្តាហ៍,ប៉ុន្តែមិនធ្លុរសុវាលវិញក្រាយពេលសំរាលកូន១២សប្តាហ៍។សុត្រីមានផ្ទៃពោះដលែមានជំងឺលើសឈាម,ត្រូវតាមដានជំងឺតាមយាបល់គ្រូពទ្យ,រិភាគសុកតាមរលោកំណត់និងសុថានភាពលូតលាស់នទារកកុនុងផ្ទៃ។គ្រូសំរាកអាយហានថ្មីន,យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសសេពីសមុពាធឈាមនិងចលនាទារកកុនុងផ្ទៃ,ចៀសវាងកុំអាយមានសមុពាធ។ផ្នែកអាហារត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីបរិមាណអាហារ,អាហារប្រូតអើនខ្ពស់,គ្រប់គ្រងជាតិអំបិល។

• ជំងឺទឹកនាមជុអមែ

សុត្រីមានផ្ទៃពោះមានជំងឺទឹកនាមជុអមែ,មាន២បុរភេទ,១បុរភេទគឺដឹងថាមានជំងឺទឹកនាមជុអមែមុនពេលមានផ្ទៃពោះ,សុត្រីមិនថាមានជំងឺបុរភេទទី១ឬទី២,អាចគ្រប់គ្រងឈាមជុអមែហានដាយថ្នុនាំអីសូលីន,ហើយសុគាប់បង្កគាប់គ្រូពទ្យនិងគ្រូជីវជាតិ។១បុរភេទទៀតគឺមានជំងឺទឹកនាមជុអមែនៅពេលមានផ្ទៃពោះដលែមានអាការៈចុហស់លាស់,ឬគ្រូតពិនិតុយថាមានជំងឺទឹកនាមជុអមែហើយពិនិតុយគុលុយកូសឃើញថាមិនបុរកុរតី,ក៏ហៅថាជំងឺទឹកនាមជុអមែនៅពេលមានផ្ទៃពោះ។

តុរីមានផ្ទៃពោះដលែមានជំងឺទឹកនាមជុអមែ,តុរូវសាកសួរគ្រូជីវជាតិបកសុវាយនិងណនាំពុយាហាលដាយអាហារកុនុងអំលុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ផ្តល់ពត៌មានអប់រំសុខភាព,យល់ដឹងពីជំងឺទឹកនាមជុអមែបុរហលែនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកកុនុងផ្ទៃ,វិធីបង្កានិងពុយាហាលជំងឺទឹកនាមជុអមែខ្ពស់,សុគាល់ពីជំងឺទឹកនាមជុអមែទាប។សុត្រីដលែចាក់ថ្នុនាំអីសូលីនមុនពេលសំរាលកូន,តុរូវរកុសាជាតិសុករណាមអាយហានលុអក្រាយពេលសំរាលកូន(70-140mg/dL)ចៀសវាងកុំអាយកីនឡើងទៀត,បណ្តាលអាយទារកមានជំងឺអីសូលីនខ្ពស់និងជាតិសុកកុនុងឈាមទាបជាយូរ។

(បុរភពឯកសារ-សមាគមណ៍អប់រំសុខភាពពីជំងឺទឹកនាមជុអមែនតៃវ៉ាន់)

準媽媽的健康注意事項

◎氣喘

氣喘是不可輕忽的疾病，準媽媽不能因為擔心藥物會影響胎兒而擅自減藥或停藥，必須諮詢你的醫師之後做調整。

妊娠合併氣喘的發生率約為1-3%，約有三分之一患有氣喘的婦女於孕期時會惡化，三分之一會維持不變，另外三分之一反而會改善。最好於懷孕前先控制好病情，再懷孕。產檢時請記得告訴醫師“我有氣喘”，方便醫師協助醫療照護。當然，“避開過敏原”是首要的原則。

◎癲癇

大多數女性癲癇患者在懷孕期間痙攣的控制都可維持穩定不變。有些人很少發作，但也會有較難控制的痙攣發作，所以，詳細告訴醫師所有發作的情形，協助控制是相當重要的。懷孕期間若發作，都應被考慮送醫院緊急就診。為了妳及寶寶著想，懷孕期的發作控制是必要且不可缺的。記住不可自行停藥，尤其是當懷孕已達兩、三個月之後，更是應該要規律服用藥物。若隨意停止治療可能會造成極大的危險性，甚至比服用癲癇藥物所造成的影響還大。此外有些抗癲癇藥物會降低血中維他命K，使凝血機轉變得不好，所以在快生產之時應該要補充維生素K，而且小孩出生後也要補充維生素K。

ប្រការគួរយកចិត្តដាក់សុខភាពរបស់អ្នកម្តាយ

• ជំងឺហឺត

ជំងឺហឺតជាជំងឺមិនគួរមើលស្រាល,អ្នកម្តាយមិនអាចបន្ថយថ្នាំឬបញ្ឈប់ថ្នាំដោយខ្លួនឯងដោយសាព្រួយហារម្មណ៍ថ្នាំប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ,ត្រូវធ្វើការប្រែប្រួលក្រោយពេ-លសឹបសួរគ្រូពេទ្យអ្នក។

ជំងឺហឺតនៅពេលមានផ្ទៃពោះមានកើតឡើងក្នុងចំនាន1-3%,មានស្ត្រីមានជំងឺហឺត១ភាគ៣ធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនក្នុងអំលុងពេលមានផ្ទៃពោះ,១ភាគ៣មិនប្រែប្រួល,១ភាគ៣ទៀតមិនធូរស្រាល។យកល្អគួរគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺអោយបានល្អមុនពេលមានផ្ទៃពោះ,ទើបមានផ្ទៃពោះ។សូមប្រាប់គ្រូពេទ្យថា(ខ្ញុំមានជំងឺហឺត)នៅពេលត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ,ដើម្បីអោយគ្រូពេទ្យងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលនិងថែទាំ។ពិតមែនហើយ,(ចៀសវាងប្រភពទំនាស់សុខភាព)ជាគោលការណ៍សំខាន់។

• ជំងឺឆ្កួតជ្រូក

ស្ត្រីមានជំងឺឆ្កួតជ្រូកភាគច្រើនមិនមានអាការៈកើតឡើងនៅពេលមានផ្ទៃពោះទេ។អ្នកខ្លះមានអាការៈតិចតួច,ប៉ុន្តែក៏មានអាការៈដលែពិហាកគ្រប់គ្រងកើតឡើង,ដូចនេះសូមប្រាប់គ្រូពេទ្យអ្នកពីស្ថានភាពអាការៈរបស់អ្នក,ជំនួយគ្រប់គ្រងជាសារៈសំខាន់។ប្រសិនបើមានអាការៈក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ,ត្រូវទៅកាន់មន្ទីពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលជាបន្ទាន់។ដើម្បីកូនរបស់អ្នក,ចំបាច់ត្រូវគ្រប់គ្រងជំងឺក្នុងអំលុងពេលមានផ្ទៃពោះ។សូមកុំបញ្ឈប់ថ្នាំដោយខ្លួនឯង,ជាពិសេសក្រោយពេលមានផ្ទៃពោះ២-៣ខែ,កាន់តែត្រូវការទទួលទានថ្នាំដោយទៀងទាត់។ប្រសិនបើបញ្ឈប់ការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងប្រហែលជាបណ្តាលអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំ,ប៉ះពាល់ច្រើនជាងបរិថ្នាំឆ្កួតទៀត។ក្រៅពីនេះថ្នាំឆ្កួតខ្លះអាចកាត់បន្ថយវីតាមីនKក្នុងខ្លួន,បណ្តាលអោយមានការកកឈាមមិនល្អ,ដូចនេះត្រូវបំប៉នវីតាមីនKមុនពេលសំរាលកូន,ហើយក៏ត្រូវបំប៉នវិតាមីនKក្រោយពេលសំរាលកូន។

亮黃燈！注意危險徵兆

懷孕期間，如果出現下列任何一種症狀時，應該立即就醫！

- 陰道出血(不管量多少)
- 持續或劇烈的頭痛
- 持續或劇烈腹痛
- 持續或嚴重噁心、嘔吐
- 突然發冷發熱
- 視力模糊
- 臉部和手部浮腫
- 尿量明顯變少，或小便時有疼痛或灼熱感
- 胎動停止或比平常活動量少一半
- 陰道有水樣分泌物不停流出(懷疑為破水)
- 持續的腰酸與腹部變硬

可愛的寶貝，是媽媽花下心思及努力的甜美果實！

ភ្លើងសុតុប៉ព
ណ៏លឿង!អាការៈគួរប្រុងប្រយ័ត្ន

អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ,ប្រសិនបើមានអាការៈណា១ដូចខាងក្រោម,សូមប្រញាប់ប្រញាលទទួលការព្យាបាល!

- ឃានីចញ្ចេឈាម(មិនថាបរិមាណប៉ុន្មាន)
- បន្តបឬឈឺក្បាលខ្លាំង
- បន្តបឬឈឺពោះខ្លាំ
- បន្តបឬអើមក្អួតធ្ងន់ធ្ងរ
- រោរក្តៅៗមិនទាងទាត់
- មើលមិនច្បាស់
- ហើមមុខនិងដៃ
- បរិមាណទឹកនាមតិចជាងមុន,ឈឺឬក្តៅនៅពេលបត់ជើងតូច
- ទារកក្នុងផ្ទៃឈប់ចលនាឬចលនាតិចជាងមុនពាក់កណ្តាល
- ឃានីហូរទឹកមិនឈប់ឈរ(សង្ស័យថាបកែទឹកក្នុងផ្ទៃ)
- បន្តការរួយចង្កេះឬរឹងពោះ

កូនជាទីស្រលាញ់,ជាគ្រាប់ផ្លែផ្អែមធ្ងាញ់ដាយសាអ្នកមុតាយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រឹងប្រែ!

認識產後憂鬱症

部分婦女在生產後，會產生一些情緒低落或心情不穩定現象，但這些現象大部分會在幾天後消失，少部分症狀嚴重之個案，便需要專業介入協助治療。但因為這些症狀可能是不自覺，或常被家屬或周遭親友忽視，以致常無法及時給予適當的幫忙，而造成個人及家庭的困擾，甚至傷害等情況，因此；以下將以淺顯的方式簡介產後憂鬱症的可能原因、分類及處理方式等資訊，期喚起大家正確認識產後憂鬱症。

為什麼會發生產後憂鬱症？

產後憂鬱症發生的原因目前仍不明，可能跟生理、心理及社會因子有關，例如：周產期發生重大生活壓力事件、生產時體力耗費及生產經歷重大身心創傷等，亦可能引起產後憂鬱後遺症；此外，產後媽媽須負擔照顧新生兒的角色，或因懷孕造成身體外觀的改變等，也會造成憂鬱。

產後情緒障礙的分類(產後憂鬱症是產後情緒障礙的一種)

名稱	盛行率(%)	常見的發生時間	病程長短	症狀	處理方式
產後情緒低落(postpartum blues)	約有三到八成左右	通常出現於產後3-4天內	情緒低落現象，通常幾天便會消失。	焦慮、心情低落、脾氣暴躁、疲憊、容易流淚、失眠、頭痛、做惡夢等。	1. 屬暫時性症狀：通常不需治療即會自行緩解，但家人需要多給予心理支持。 2. 若症狀持續超過兩星期，便需要尋求進一步之醫療協助及診斷。
產後憂鬱症(postpartum depression)	約一成	通常出現於產後6週內	症狀會持續數週至數個月。	憂鬱、情緒低落、脾氣暴躁、疲憊、失眠；常有罪惡感或無價值感；飲食障礙、容易流淚、無法專心、對週遭生活及喜歡的事物得失去興趣或常覺得無法應付生活；覺得自己無法照顧好嬰兒等情形；嚴重者甚至有自殺的想法。	需要接受醫療協助及照護。

យល់ដឹងពីជំងឺផ្លូវចិត្តក្រោយពេលសំរាលកូន

សរុតីខលះក្រោយពេលសំរាលកូន,មានអារម្មណ៍មិនល្អបន្តិចទៀងទាត់,ប៉ុនតអាការៈទាំងនះនឹងបាត់ទៅវិញនាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយ,ចំនួនតិចតួចដែលធ្ងន់ធ្ងរតំរូវការការពេទ្យាបាលពិអនក្រជំនាញ។ប៉ុនតអាការៈទាំងនះគឺមិនដឹងខ្លួនទៅ,ឬក៏រួមគ្នាវិសានិងញាតិមិត្តមិនចាប់អារម្មណ៍ទុបណាតាលអោយមិនអាចផ្តល់ជំនួយដ្បិលគ្នា,បណាតាលអោយមានកង្វល់ក្នុងខ្លួននិងគ្រួសារ,ឬបណាតាលអោយមានការធ្ងរហាបុ្ល។ដូចនះ,ខាងក្រោមនះជាព័ត៌មានប៉ុះហាលែ៉ជាមូលហាតុ,បុរេទេនិងវិធីពុយាបាលជំងឺក្រាយ៏ពេលសំរាលកូន,ដើម្បីអោយយល់ដឹងអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តក្រាយពេលសំរាលកូន។

• ហាតុអ្វីហានជាមានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រាយពេលសំរាលកូន?

ជំងឺផ្លូវចិត្តក្រាយពេលសំរាលកូនមានមូលហាតុមិនច្បាស់លាស់,ប្រហាលែ្លជាទាក់ទងទៅនិងខ្លួននិងចិត្ត,ឧទាហរណ៍មានរឿងសមុ្ពាធជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរក៏តលងមុនពេលសំរាល,អស់កលាងនៅពេលសំរាលកូនប៉ុន្តលងកាត់រូបសចិត្តកាយ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ល។ក៏អាចបណ្តាលអាយមានជំងឺផ្លូវចិត្តក៏រាយពេលសំរាលកូន,ករាពីនាៈមុតាយក្រាយពេលសំរាលកូនជាអនកូមានបន្ទុកមុលចំកែន,ឬពីពរៈការមានផ្ទុទៃ្ពៈប៉ណាតាលអាយមានរូបរាងខុសប្លែកែពីមុន។ល។ក៏អាចបណ្តាលអាយមានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រាយពេលសំរាលកូនហានដរែ។

• ចំណាត់ថ្នាក់នជំងឺអារម្មណ៍ ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីពេលសម្រាលកូន(ជំងឺផ្លូវចិត្តក្រាយពេលសំរាលកូនជាប្រភេទជំងឺមុយាងនកែារពីការអារម្មណ៍ក្រាយពេលសំរាលកូន)

ឈ្មោះ	មានអារម្មណ៍មិនល្អក្រាយពេលសំរាលកូន	ជំងឺផ្លូវចិត្តក្រាយពេលសំរាលកូន
កីតលឺងចុ្នន(%)	មានប្រហាលែជា30%-80%	10%
ពេលវេលាដលែតងែតមានកីតឡើង	ជាទូទៅមានកីតឡើងនៅថ្ងៃទី៣-៤	ជាទូទៅមានកីតឡើងនៅក្រាយពេលប្រសូតកុនរយៈពេល៦ខែ
ជំងឺដលែមានរលោខ	អាការៈអារម្មណ៍មិនល្អ,ជាទូទៅវាបាត់ទៅវិញក្រាយពេលលេប៉ុន្មានថ្ងៃ	អាការៈនឹងបន្តរាប់សប្តាហ៍ឬរាប់ខែ។
អាការៈ	ព្រួយបារម្ភ,មានអារម្មណ៍មិនល្អ,ឆាប់ខឹង,ហត់នឿយ,ឆាប់យំ,ដកេមិនលក់,ឈឺក្បាល,សុបិន។ល។	ស្រពានចិត្ត,មានអារម្មណ៍មិនល្អ,ឆាប់ខឹង,ឡើយហាត់,ដកេមិនលក់,តងែតបែនទាសខុលួនឬមានអារម្មណ៍គុមានតំលៃ,ពិការកុនុងការទទួលទានអាហារ,ឆាប់យំ,មិនអាចប្រមូលអារម្មណ៍,ហត់ចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះជីវភាពជីរញ្ជាខុលួននិងវត្ថុដលែខុលួនចូលចត្តតឬមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចប្រឈមុខនឹងជីវភាព,មានអារម្មណ៍ថាខុលួនមិនអាចមីលថែរកអាយហានល្អ។ល។អ្នកជង់ជ្រងនឹងមានបំណងសំលាប់ខុលួន។
វិធី	១. អាការៈបណ្តាៈអាសន្ន-ជាទូទៅមិនតូ្រវការពុយាបាលក៏អាចសំរួលដាយខុលួនឯង,ប៉ុន្តកែ្មួគ្រួសារតូ្រវអាយការគាំទ្រផ្លូវចិត្ត។ ២. បុរសនបីអាការៈបន្ទុត២សបុ្តាហ៍,តូ្រវការការជំនួយនិងតូ្រតពិនិត្យពីមនទ្ទីពទេ្យ។	តូ្រវការទទួលការជំនួយពុយាបាលនិងការមីលថែ

認識產後憂鬱症

名稱	盛行率(%)	常見的發生時間	病程長短	症狀	處理方式
產後精神病(postpartum psychosis)	每千例的生產個案，約有一到兩個	通常出現於產後2週內	症狀持續數週至數個月	情緒激動不穩定、哭泣、失眠、個性行為改變；出現妄想或幻覺現象，如：媽媽可能誤認嬰兒已死亡或被掉包；症狀嚴重者，可能會有傷害自己或家人的妄想等。	需要接受醫療照護，及住院觀察治療。

哪些人容易發生產後憂鬱症？

一般認為造成產後憂鬱症的危險因子有下列幾項：

- 過去曾是重度憂鬱症患者或為其他精神疾患，或前胎有產後憂鬱症，或平時有嚴重經前症候群或經前不悅症。
- 懷孕過程中即有憂鬱或焦慮症狀者。
- 生活中遭遇重大事件，如：失去親人、婚姻家庭問題、失業等。
- 社會支持或資源不足者。
- 懷孕或生產時出現併發症，如：妊娠高血壓、早產或生產併發症等。

如何知道自己有沒有可能有產後憂鬱？

我們建議產後媽媽可以利用下面兩個問題，進行簡易評估。

- 過去一個月，是否常被情緒低落、憂鬱或感覺未來沒有希望所困擾？
- 過去一個月，是否常對事物失去興趣或做事沒有愉悅感？

如果上述兩個問題的確發生在您的身上時，我們強烈建議您告訴您的配偶或尋求親友協助，或透過心理衛生機構協談及轉介。同時也可以將您目前的狀況告知您的婦產科醫師，家庭醫學科醫師或兒科醫師，或精神科身心科醫師，以適時提供診斷、會談及必要的藥物協助。如果常常會出現想要傷害自己的念頭時，應立即尋求醫療協助，以避免傷害的發生。

យល់ដឹងពីជំងឺផ្លូវចិត្តក្រោយពេលសំរាលកូន

ឈ្មោះ	ជំងឺសសៃប៉ុសោតក្រោយពេលសំរាលកូន
កើតលើងចុះនៃ(%)	មានអ្នកមានជំងឺនេះ១-២នាក់ក្នុងចំណាន១ពាន់នាក់
ពេលវេលាដែលតង្កៀតមានកើតឡើង	ជាទូទៅមានកើតឡើតក្រោយពេលមានផ្ទៃពោះកុនុងរយៈពេល២សបុតាហ៍
ជំងឺដលៃមានវេលាខ	អាការៈនឹងបន្តរាប់សបុតាហ៍ឬរាប់ខ។
អាការៈ	អារម្មណ៍មិនទៀងទាត់,យំ,ដកេមិនលក់,ចរិកអំពីកប្រែ,មានការគិតផ្តួសេផ្តាស់ឬសុរមើសុរមៃ,ឧទាហរណ៍-មុតាយបុរេហលៃជាគិតថាទារកសុលាប់ហើយឬត្រូវគលេួចផ្តួរ,អ្នកធ្ងន់ធ្ងរខ្លៈ,បុរេហលៃជាគិតផ្តួសេផ្តាស់ធ្វើបាបខ្លួនឯងឬកុរុមគួរសា។
វិធី	តួរការការគាំទ្រនិងការថៃទាំសុខភាព, និងដកេទាមនទ្ទីរពទ្យដើមុបីអងុ្កតេនិងការពុយាបាល។

• អ្នកណាខ្លៈដលៃងាយស្រួលមានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រោយពេលសំរាលកូន?

ជាទូទៅមូលហតេុគ្រាៈថ្នាក់បណ្តាលអាយមានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រោយពេលសំរាលកូនមានប៉ុន្មានបុការដូចខាងក្រោម

- ពីមុនជាអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរឬមានជំងឺសសៃប៉ុសោតដទៃឬមានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រោយពេលសំរាលកូនលើកមុន,ឬអ្នកដលៃមានអាការៈឬអារម្មណ៍មិនល្អមុនពេលមករដួវ។
- អំលុងពេលមានផ្ទៃពោះមានអាការៈអារម្មណ៍មិនល្អឬពួយបារម្ភណ៍។
- មានរឿងធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងកុនុងជីវភាព,រួមមាន-ហតេបង់សាច់ញាតិ,បញ្ហាកុរុមគួរសាអាពាហ៍ពិពាហ៍,គ្មានការងារធ្វើ។ល។
- អ្នកដលៃមានការគាំទ្រឬជំនួយពីសងគមមិនគ្រប់គ្រាន់។
- មានជំងឺនាពេលមានផ្ទៃពោះឬនាពេលសំរាលកូន,រួមមាន-ជំងឺលើសឈាម,សំរាលកូនមិនគ្រប់ខឬជំងឺសំរាលកូន។ល។

• តើយើងដឹងយ៉ាងដូចមេតេចថាខ្លួនមានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រោយពេលសំរាលកូន?

យើងអាយយាបល់អ្នកមុតាយកុាយ៉ពេលសំរាលកូនអាចប្រើប្រាស់បញ្ហាខាងក្រោមទាំង២,ដើមុបីធ្វើការវិភាគ។

- ១ខមែុន,តើមានកង្វល់ដាយសាមានអារម្មណ៍មិនល្អ,ពិបាកចិត្តឬមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអនាគតឬ?
- ១ខមែុន,គ្មានអារម្មណ៍ចំពាៈវត្ថុឬរឿងផ្សងេៗឬ?

បុរសិនបើមានបញ្ហាទាំង២ដូចខាងលើនាលើខ្លួនអ្នក,យើងផ្តល់អនុសាសន៍ថាអ្នកពិតជាគួរបុរាប់បុតីរបស់អ្នកឬសុរងែរកជំនួយពីមិត្តភកេ្តិនិងសាច់ញាតិបាន; ឬទាក់ទងកនុលងែពទ្យេថទៃាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត (សូមមើលឧបសមព័ន្ធ) ដើមុបីពិគ្រាៈយាបល់និងពុយាបាល។ ឬអាចនិយាយជាមួយ គ្រូពទ្យេកុមារឬគ្រូពទ្យេវិកលចរិផ្លូវចិត្តនិងគ្រូពទ្យេមហាវិទ្យាល័យរាងកាយអំពីសុថានភាពបចុប្បនុនរបស់អ្នក, ដើមុបីឱ្យមានការផ្តល់សវោធ្វើតសេុតផ្តល់យាបល់និងការពុយាបាល។ បើសិនជាញ្ជីកញ្ជាប់មានគំនិតប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯង, គួរសុរងែរកជំនួយជុនកៃវជ្ជេសាស្តេ្តរជាបន្ទាន់ដើមុបីជៀសវាងការឧបបត្តិហតេុអកុសល។

認識產後憂鬱症

如何因應情緒低落或產後憂鬱症？

◎自我生活調適，尋求支持與協助

產後情緒低落(postpartum blues)，通常在產後的3-4天發生，而第5天達最明顯；通常產後兩週內就會消失。大部分的個案只需要家屬、朋友多予照顧與支持即可恢復。因此，我們建議新手媽媽照顧新生兒時，需利用嬰兒睡眠時，多讓自己的身體獲得適度休息，不要陷入過度疲憊或睡眠不足的狀態。由於產後媽媽照顧嬰兒時，其體力耗費甚大，所以儘可能由其他家人分擔及減輕產後媽媽的家事清潔等勞力工作，同時提醒產後媽媽不要過分要求清潔。如果可以的話，每天可以撥出一小段時間外出散步，給自己一些喘息休息的機會，同時應適度的向家人或親朋好友說出您的感受，並尋求他們的幫忙。如果可能的話，也可以跟其他產後媽媽分享彼此的經驗與心得，將能得到相當的幫忙。

◎尋求醫療與心理衛生資源

如果產後情緒低落的症狀一直無法改善，甚至持續時間長達兩個禮拜以上時，建議應立即尋求協助。您可至各醫療院所婦產科、家庭醫學科、小兒科或精神科(身心科)尋求協助，或可洽請各縣市衛生局社區心理衛生中心尋求相關心理衛生服務資源。對於產後憂鬱症(postpartum depression)的治療，通常及早診斷及早治療時，越容易成功治癒。如果有產後憂鬱症時，切勿慌張，通常醫師會給予抗憂鬱藥物，並輔以會談諮商或進一步給予心理治療。此時，如果需要持續哺餵母乳者，可與您的醫師密切討論用藥成分及劑量。

◎積極接受診療，避免病症加重

如果發生嚴重產後精神病(postpartum psychosis)時，產後媽媽除了會出現情緒激動不穩定、哭泣、個性行為改變之外，甚至會出現妄想或幻覺現象，有些還會出現誤認嬰兒已死亡或被掉包等幻覺，根據國外統計產後精神病約有5%的自殺率及4%的殺嬰率，必須接受積極治療，以免造成不幸。

ស្គាល់ពីជំងឺដែលនាំអោយមានភាពព្រួយថ្មីនក្រោយពេលសំរាលកូន

- តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃអារម្មណ៍និងជំងឺបារម្ភថ្មីនក្រោយពេលសំរាលកូន?

១.កែសំរួលជីវភាពខ្លួនឯងអោយបានសំស្របស្វែងរកការគាំទ្រនិងជំនួយ

រោគអារម្មណ៍មិនល្អក្រោយពេលសំរាល់កូន (postpartum blues) ជាធម្មតាកើតឡើងក្នុងពេលសំរាល់កូនពី៣ទៅ៤ថ្ងៃ ហើយបង្ហាញច្បាស់ខ្លាំងនៅថ្ងៃទី៥ ជាធម្មតានិងបាត់ទៅវិញក្រោយពេលសំរាល់បាន២សប្តាហ៍។ កត្តាបែបនេះភាគច្រើន និងប្រសើឡើងវិញដោយគ្រាន់តែមានការថែទាំពីក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តអោយបានច្រើន។ ម៉្យាងទៀត សូមស្ត្រីជាម្តាយដែលធ្វើការថែទាំទារកកើតថ្មីៗឈប់ឿតពេលទារកគេង ធ្វើការសំរាកអោយបានគ្រប់គ្រាន់តាមសំរួលការសមស្រប កុំបណ្តោយអោយខ្លួនអ្នកធ្លាក់ក្នុងសារភាពនឿយហត់ខ្លាំងរឺគេងមិនគ្រប់គ្រាន់។ ដោយសារតែពេលដែលស្ត្រីដែលសំរាល់កូនរួចមិនលទ្ធភាពគ្រប់ចំណាយកំលាំងច្រើន ដូចនេះសូមព្យាយាមអោយអ្នកផ្ទះជួយសំរួលនិងកាត់បន្ថយការងារនឿយហត់ក្នុងការសំអាត់ទារកតាមតែអាចធ្វើទៅបាន ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរសូមធ្វើការក្រែនលំលឹកដល់ស្ត្រីដែលសំរាល់កូនរួចកុំធ្វើការសំអាតខ្លួនច្រើនពេក។ ប្រសិនបើអាចជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកគួរតែឈ្មោះឿតពេលបន្តិចបន្តួចមកដើរលំហែកាយ ដើម្បីផ្តល់ឪកាសស្របខ្យល់អាកាសខ្លះសំរាប់ខ្លួនឯង ស្របពេលនោះអ្នកអាចនិយាយពីអារម្មណ៍របស់អ្នកទៅកាន់អ្នកផ្ទះរឺមិត្តភ័ក្តជិតស្និតរបស់ខ្លួនដែលសាក់សម និងសូមអោយពួកគេជួយដល់អ្នក។ ប្រសិនជាអាចអ្នកក៏អាចធ្វើការចែកលំលែកអារម្មណ៍និងបទពិសោធ៍ជាមួយស្ត្រីដែលសំរាល់កូនរួច វានឹងផ្តល់អោយអ្នកនូវចំនួយជាច្រើន។

២.កែសំរួលជីវភាពខ្លួនឯងអោយបានសំស្របស្វែងរកការគាំទ្រនិងជំនួយ

ប្រសិនបើមានរោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយឆ្លងទន្លេរួចគឺមិនអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង, និងសូម្បីតែនៅតែបន្តរហូតដល់ទៅ 2 សប្តាហ៍, ស្ត្រីស្មនីគួរស្វែងរកជំនួយជាបន្ទាន់។ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ផ្នែកសម្ភពជំងឺកុមារឬចិត្តសាស្ត្រ (ផ្លូវចិត្តនិងមហាវិទ្យាល័យរាងកាយ) នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ជំនួយ, ឬប្រហែលជាទៅជាចិត្តវិទូមណ្ឌលសុខភាព (ចិត្តវិទ្យាសុខភាព) នៅសហគមន៍ ស្រុក / ក្រុង (ឧបសម្ព័ន្ធ) នឹងត្រូវបានផ្តល់ជាមួយការថែទាំផ្លូវចិត្តដែលទាក់ទង។ សម្រាប់ការព្យាបាលនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយឆ្លងទន្លេរួច (តានតឹងក្រោយឆ្លងទន្លេរួច), ការរកឃើញជាញឹកញាប់នៅដើមនិងការព្យាបាលនៅដំណាក់កាលដំបូង, ការព្យាបាលបន្ថែមទៀតយ៉ាងងាយស្រួលដោយជោគជ័យ។ ប្រសិនបើស្ត្រីដែលត្រូវបានទទួលរងពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយឆ្លងទន្លេរួច, វាមិនគួរតែកស់ស្លុតនោះទេព្រោះគ្រូពេទ្យធម្មតានឹងចញ្ចេរជៀជបញ្ជាថ្នាំបន្ថយទុក្ខព្រួយ, ការប្រឹក្សាយោបល់និងវិធានការបន្ថែមទៀតបានអនុវត្តឬខាងចិត្តតិកិច្ឆា។ ឥឡូវនេះប្រសិនបើស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបន្តការបំបៅដោះកូន, វាអាចត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងហ្មត់ចត់ជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអំពីសមាសភាពនិងកិតើថ្នាំបន្ថយទុក្ខព្រួយ។

៣.ស្វែងរកជំពុកវិជ្ចាសាស្ត្រនិងសុខាភិបាលផ្លូវចិត្ត

ប្រសិនបើកើតមានជំងឺសរសៃប្រសាទធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលកើត (postpartum psychosis) ស្ត្រីជាម្តាយដែលកើតកូនរួចក្រៅពីមានអាការៈអារម្មណ៍មិននឹងនរ យំ និងការប្រប្រួលនៃទង្វើទៅនោះ រហូតដល់មានការស្រមាលស្រមនើ្វងការមមើលមាយ មានខ្លះស្រមៃឃើញថាកូនរបស់ខ្លួនស្លាប់ហើយរឺ ត្រូវបានលួចប្តូរជាដើម យោងតាមការសរុបនៃអ្នកមានរោគសរសៃប្រសាទបមានប្រមាណជា៥%ធ្វើការសំលាប់ខ្លួននិង៤%ទៀតសំលាប់កូន គប្បីធ្វើការទទួលយកការព្យាបាលអោយបានទាន់ពេល ដើម្បីជាស់វាងភាពអគុសល។

認識產後憂鬱症

◎結語

透過上述產後憂鬱症的介紹，能讓孕期、產後媽媽及家人們辨識產後媽媽是否處於高風險狀態，進而予以尋求家人支持與醫療照護。此外，大部分的產後媽媽都會有輕微產後憂鬱現象，而這些不舒服的症狀，可在家人及朋友的關懷與支持下可以很快的獲得緩解，所以不要羞於表達自己的情感，一旦出現症狀加重或久久不能改善時，應立即協同家人尋找醫療的幫助。

產後憂鬱症如果能夠及早發現，及早治療，其預後是良好的，不要擔心自己會受到家人或朋友的歧視，很多人都願意幫助您度過難關的。

◎給家屬的一段話

產後憂鬱或產後憂鬱症可能常被忽視或不自覺，因此常無法得到家人或親友即時的支持及抒發。我們希望透過產後憂鬱症介紹，讓家屬們了解，經由一些簡單的對談聊天，給予傾聽、陪伴及支持。是能讓產後媽媽們自在的談敘個人想法及感受，並讓其情緒獲得抒發。同時，產後媽媽在照顧新生兒時，需耗費相當的體力，也常致睡眠不足，因此，所有的家人應該去分擔照顧新生兒及家庭勞務，減輕產後媽媽的身體負擔；平時多關心產後媽媽，如果發現有產後憂鬱的現象且長時間無法緩解，甚至加重時，應立即尋求醫療協助。

心理衛生資源

一、衛生福利部安心專線0800788995(請幫幫　救救我)：提供24小時免費心理諮詢服務。

二、各縣市社區心理衛生中心：提供心理衛生宣導、教育訓練、諮詢、轉介、轉銜服務、資源網絡聯結、自殺防治、物質濫用防治及其他心理衛生等事項。

三、倘若您有哺餵母乳困擾時，可以打免付費諮詢專線：0800-870870，尋求協助。

សុគាល់ពីជំងឺពួយហារម្មកថីនក្នុងពេលសំរាលកូនរួច

• សេចក្តីសរុប

យោងតាមការរៀបរាប់នវៃគហារម្មមណ៍ច្រើន វាអាចធ្វើការអោយស្ត្រីជាមុតាយដែលកើតកូនរួចរឹតែក្រុមគ្រួរសាររបស់ស្ត្រីដែលសំរាល់កូនរួចដឹងពីអាការៈគ្រុនថ្នាក់ និងអាចធ្វើការស្នើរឆែកក្រុមគ្រួរសារជាជំនួយដ៏មុបីអាយពទ្យធ្វើការពុយាហាល។ ម៉ុយាងទៀតសុតុ្រជាមុតាយភាគច្រើនតែងមានអការៈជំងឺហារម្មមណ៍ច្រើនក្នុងពេលកើត អការៈមិនស្រួលបបែនរៈ គឺអាចទទួលហាននូវភាពកក់ក្តៅពីការយកចិត្តទុកុដាក់និងគ្រាំទ្រពីសំនាក់ក្រុមគ្រួរសារនិងមិត្តភ័ក្តិខហានយ៉ាងឆាប់រហាស ដូចនរៈសូមកុំខ្មាស់ក្នុងការបង្ហាញពីអារម្មមណ៍របស់អ្នកអី នាពេលអការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងវិញក៏មិនមានសភាពបុរសើរឡើងក្នុងរយៈពេលវែងនារៈ គួធ្វើការស្នើរឆែកជំនួយពីក្រុមគ្រួរសារជំរុញក្នុងការពុយាហាល។

បុរសិនបីឆាប់រកឃើញមានអការៈជំងឺហារម្មមណ៍ច្រើន និងឆាប់ធ្វើការពុយាហាលគឺជាកត្តាល្អ កុំហារម្មមណ៍ថាអ្នកនឹងទទួលនូវការមើលងាយពីក្រុមគ្រួរសារវីមិត្តភក្តិរបស់អ្នក មានមនុស្សជាច្រើនយល់ព្រមជួយអ្នកពីការលំបាកនរៈហាន។

• ពាក្យមួយឃ្លាទុក្ខជូនទៅកាន់អ្នកផ្ទុះ

ការហារម្មមណ៍ច្រើនរឹតហារម្មមណ៍ច្រើនបុរហាលែជាអ្នកកាល់គ្នាតងែតវីមើលរំលងរឺមិនចាប់អារម្មមណ៍ ដូចនរៈមិនអាចទទួលហានការគាំមទ្រនិងជុំរុញពីសំណាក់ក្រុមគ្រួរសារនិងមិត្តសុនិតសុនាលហានទាន់ពលេ។ យើងសង្ឃឹមថាយោងតាមការបង្ហាញពីអាការៈនជំងឺហារម្មមណ៍ច្រើន អាចធ្វើអាយគ្រប់ក្រុមគ្រួរសារទាំងអស់ហានដឹងច្បាស់ អាចធ្វើការនិយាយគ្នាបបែងាយ។ ដឹមុបីសួរនាំ កំដរនិងគាំមទ្រ។ វាអាចធ្វើអាយស្ត្រីដែលសំរាល់កូនហើយនិយាយចញេនូវគំនិតនិងអារម្មមណ៍របស់ខ្លួនដាយសបុាយរឹតរាយ ធ្វើអាយអារម្មមណ៍ទទួលហានភាពបុរសើរឡើង។ ម៉ុយាងទៀតស្ត្រីជាមុតាយដែលទីបនិងសំរាល់កូនរួច តួរការសំណាយកំលាំងជាច្រើន ក៏តងែតតែងែមិនហានគ្រប់គ្រាន់ ដូចនរៈគ្រប់សមុាជិកនគ្រួរសារទាំងអស់គួធ្វើការជួយសំរួលការងារមើលថទាែក ដឹមុបីកាត់បន្ថយអំរកេនស្មុខភាពមុតាយដែលទីបសំរាលកូន ជាធមុមតាគួរយកចិត្តទុកុដាក់ចំពៈមុតាយដែលសំរាល់កូនហើយ បុរសិនបីសង្កតែឃើញមានអការៈរាគគិតហារម្មមណ៍ច្រើនក្នុងពេលកើតនិងក្បួនកៃាដោះស្រាយ ម៉ុយាងទៀតនាពេលដែលមានអការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង គួធ្វើការស្នើរឆែកជំនួយនកៃាពុយាហាល។

ទំព័រជំនួយសុតីពីសុខាភិបាលផ្លូវចិត្ត

១. លេខទំនាក់ទំនងទីសុតីការសុខាភាព0800788995(សូមជួយដល់ខ្ញុំផង) ផ្តល់ជូននូវសវោកមុមផ្តល់ពត៌មានផ្លូវចិត្ត២៤ម៉ាងដាយមិនគិតថ្លៃ។
២. រាល់អង្គការសុខាភិបាលផ្លូវចិត្តទូទាំងខត្តកុង ៖ផ្តល់ជូនការណែនាំផ្លូវចិត្ត ការបង្រៀនបង្ហាត់ ពណ៌មាន ការពិនិត្យ សវោកមុមនិងជំពុកនកៃាទំនាក់ទំនងតាមអីនធ័រនតេ ការសំលាប់ខ្លួន ការហាមខ្មុវាត់ការបុរីបុរាស់សំការៈនិងបុរការសុខាភិបាលផ្លូវចិត្តជាដឹម។
៣. បុរសិនបីអ្នកជួបបុរទៈបញ្ហាកុនុងការបំបាដោះកូន អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមបុរព័ន្ធទូរសទ្ទ័សន៍មិនគិតថ្លៃ 0800-870870

準媽媽健康操

每日宜適當運動，並注意運動相關安全事項。產前運動可以減少陣痛時的疼痛，減少產時情緒及全身肌肉的緊張、增加產道肌肉的強韌性，以便順利生產。但有些準媽媽的情況可能不適合產前運動，最好請醫護人員評估及指導。

美國婦產科學會(ACOG)建議準媽媽運動時心跳應低於每分鐘140下，身體溫度應低於38℃，所以不宜從事劇烈運動。

運動時，需注意：

- 做前先排空膀胱。
- 應穿寬鬆之衣服，並解開帶扣。
- 最好在硬板上做。
- 最好在就寢前和早餐前做。

●常見的產前運動種類：

腿部運動：(早期開始做)

目的：增加骨盆附近肌肉及會陰部彈性。

作法：手扶椅背(需注意椅子穩固)，左腿固定，右腳呈360度的轉動，做畢後還原，再換腿繼續做。

腳部運動：(早期開始做)

目的：雙腿抬高運動

1. 促進下肢靜脈血之回流。
2. 伸展脊椎及臀部肌肉張力。

作法：平躺仰臥，雙腿垂直抬高，足部抵住牆，可維持3-5分鐘，每天反覆數次。

腹部深呼吸：(懷孕末期)

目的：幫助放鬆肌肉，減少宮縮產生腹部的壓力。

使用時間：有宮縮產生時。

作法：集中注意力，慢慢將氣深吸入至腹腔，使腹部凸出。盡量緩慢吐氣至全部呼出後感覺肌肉的放鬆。

速度依宮縮劇烈程度調整，每分鐘6-9次，每次練習一分鐘。做時緩慢吐氣及完全吐氣，可預防頭暈現象。

លំហាត់ប្រាណសុខភាពស្ត្រីទ្រាមក្លាយជាម្តាយ

ការធ្វើលំហាត់ប្រាណសមរម្យជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពាះបញ្ហាកីឡាទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព។ការធ្វើលំហាត់ប្រាណមុនសម្រាលកូនអាចកាត់បន្ថយការឈឺពលេឈឺពាះកីត កាត់បន្ថយអារម្មណ៍ម្ទម៉ៅនិងភាពតានតឹងសាច់ដុំពលេសម្រាលកូនបង្កីនកំលាំងសាច់ដុំយានី ដីម្បីឲ្យមានភាពរលូននិងងាយសម្រាល។តស្ថែថានភាពរបស់ម្តាយខ្លះមិនសក្ដិសមនឹងធ្វើលំហាត់ប្រាណមុនសម្រាលកូន យកល្អត្រូវស្នើរសុំឲ្យគ្រូពទ្យេ ឆ្មបជួយវាយតម្លសៃុខភាពនិងធ្វើការណនៃាំ។

ផ្នាក់ងារផ្នកែសំរាល់កូននប្រែទេសអាមរិេច(ACOG)ននាំស្ត្រីទ្រាមក្លាយជាម្តាយពលេហាតប្រាណគួរក្សារចង្វាក់បេះដូងក្រាម១៩០ក្នុងមួយនាទី កំដាក្នុងខ្លួនត្រូវរក្សារអោយបានទាបជាង៣៨□ដូចនះេមិនត្រូវធ្វើការហាតប្រាណខ្លាំងពទេឡើយ។

• ពលេហាត់ប្រាណត្រូវយកចិត្តទុក្ខដាក់ចំពាះ៖

- ត្រូវសំអាតប្លាកនាមមុនពលេហាត់ប្រាណ
- រ្វស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ធូរ,ហើយដស់ខ្សវែលវេ
- យកល្អគួរហាត់ប្រាណនៅលីក្តារ
- យកល្អគួរហាត់ប្រាណមុនពលេចូលដំណាកេនិងមុនពលេអាហារពលេព្រឹក

• ប្រភេទហាត់ប្រាណទូទៅមុនពលេកីត

ការហាត់ប្រាណត្រុងចំនុចផ្លូវ ៖ (ចាប់ផ្តើមហាត់ពីតំណាក់កាលដំបូង)

គាលបំណាង ៖ ▸ បង្កីនសាច់ដុំដលៃនៅជាប់និងឆ្អឹងត្រគាកនិងភាពយឺនប្រែដាប់ភទេ។

ពីធីធ្វើ ៖ ▸ ដច្រៃតចង្កះេដច្រៃតចង្កះេ ជីងឆ្វេងនៅស្ងាម ជីងស្តាំមបង្វិលទៅមក៣៦០ដឺការ៉េ រួចត្រឡប់មកដូចដីមវិញ បន្ទាប់មកដូរជីងម្ខាងទៀត។

ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលំនឹងរបស់កៅអី

លំហាត់ប្រាណនដើង ៖ (ចាប់ផ្តើមធ្វើពីដំណាក់កាលដំបូង)

គាលបំណាង ៖ ▸ ជីងទាំងពីធ្វើលំហាត់ប្រាណលីកឡើងខ្ពស់
១.ធ្វើអោយដំណើរឈាមជីងរត់ទៅមក។
២.ចលនាសាច់ដុំខ្នងនិងគូត។buttock.

វិធីអនុវត្តះដកេរាប ▸ ជីងទាំងពីរលើកឡើងខ្ពស់ ផ្ននកែជីងផ្អឹបជាប់នឹងជណ្តាំងអាយបាន៣ទៅ៥នាទី ធ្វើវាម្តងហើយម្តងទៀតជារាងលាស់ថ្ងៃ។



ការដក់ដង្ហើមវែងៗនក្បេហាលពាះ ៖ (ដំណាក់កាលចុងក្រោយនាពលេពាពាះ)

គាលបំណាង៖ ▸ ជួយសំរួលសាច់ដុំអាយមានសភាពធូស្រាល ដីម្បីកុំអាយមានសភាពទទូលសំពាតពិក្បហាលពាះ។

រ្វិបាស់ពលេវលោ៖ ▸ នៅពលេដលៃមានការរួញស្បូន

វិធីធ្វើ ៖ ▸ ប្រមូលផ្តុំអារម្មណ៍ ស្រូបដង្ហើមយឺតៗវែងៗចូលទៅក្នុងពាះ ធ្វើអោយផ្ននកែពាះមានសភាពប៉ោងចញ្ចេក្រៅ។ព្យាយាមធ្វើការដកដង្ហើមចញ្ចេយឺៗរហូតដល់អស់រួចនឹងមានអារម្មណ៍ធូស្រាល។ ល្បឿនរួញស្បូនតាមរយះកំរិតពី៦ទៅ៩ដងរាល់មួយនាទី វិកហាត់វាមួយនាទីម្តង។ នៅពលេហាត់ដកដង្ហើមចញ្ចេយឺៗអាចបងហាត់អាការះវិលមុខបាន។



準媽媽健康操

盤腳坐式：(三個月後)
目的：1. 鍛鍊腹股溝之肌肉及關節處韌帶之張力。
2. 防止懷孕末期，由於膨大的子宮壓力所產生的痙攣或抽筋。
作法：平坐於床墊上，兩小腿平行交接，一前一後，兩膝遠遠分開。
每天一次，每次由五分增至三十分鐘。

腰部運動：(六個月後)
目的：減少腰部之酸痛，幫助生產時腹壓增強及會陰部之彈性，以利生產。
作法：手扶椅背(需注意椅子穩固)，慢慢吸氣，同時手臂用力，
使身體的重力集中於椅背，腳尖立起，使身體抬高，
腰部挺直，然後慢慢吐氣，手臂放鬆、腳還原。

胸式呼吸（懷孕末期）
目的：同腹部深呼吸。
使用時間：於第一產程腹部深呼吸仍無法放鬆時執行。
作法：1. 集中注意力輕吸氣直到胸部完全充盈。
2. 吐氣至全部呼出吐盡，並感肌肉放鬆。
3. 呼吸速度依宮縮劇烈程度調整為6-9次/分鐘以上，每次練習一分鐘。
4. 呼吸時注意盡量放慢，並至最後盡量吐盡，可預防頭暈。

លំហាត់ប្រាណសុខភាពសុតរីទ្រាមកូលាយជាមុតាយ

របៀបអង្គុយបត់ជើង៖ (រយៈពលេបីខ)

គាលបំណង៖ ▸ ១.ហាត់សាច់ដុំក្បាលពោះនិងតូតនិងសួសកែនុលាក់ឆ្អឹង។
២.អំលងពលេកូាយកូនងការមានផ្ទៃពោះ,រមួលក្រពើដាយសារសមុ្ពាធសុបូនធ្ងន់។

វិធីអនុវត្តន៍ ▸ អង្គុយលីតូរ,ដាក់ជើងសមីរតូនា,ខាងមុខ១ខាងកូាយ១,ជង្គង់២ផ្ងាយពីតូនា។មួយថ្ងៃងមៃ្តង,មុតង់ពី៥នាទីទៅ៣០នាទី។

លំហាត់ប្រាណចងកេះ ៖ (កូាយពលេ៦ខ)

គាលបំណង៖ ▸ កាត់បន្ថយូភាពឈឺសនុលាក់ផ្នែកៃចងកេះ ជយបងកិនកំលាងរញ្ជាននផ្នែកៃពាះដីមបីសំដាក់ដជ្រៃតទ្រានិងវិធីអនុវត្តតដូាក់ដជ្រៃតទ្រានិងខនង(តូរបុរងបុរយ៉តូនអំពីលំនឹងរូបសំកាអី)ដកដង្ហើមចូលយឺ។សូរបូពលេនាៈប្រកែលាំងដច្រេហាថ្ពផ្នែកៃខ្នង ចង្កេតជីងតូរង ធ្វើអាយខ្លួនងយឡុង ផ្នែកៃចងកេះតូរង ហើយដង់ដង្ហើមចេះមួយៗ ដំលៅវិញហើយតូរឡបដូចដើម។

កូបួនដក់ដង្ហើមផ្នែកៃទូង (ដំណាក់កាលចុងក្រាយនការពាពោះ)

គាលបំណង ៖ ▸ ដកដង្ហើមរវែងៗសូរបជាមួយផ្នែកៃពាះ
ពលេវលោប្ ៖ ▸ ប៊ុរុាស់ៈអនុវត្តតពលេតិចកូនលើកទី១ដលៃនៅតមែិនអាចធ្វើអាយផ្នែកៃពាះមានភាពធូសុាល។
វិធីអនុវត្តន៍ ▸ ១. បុរមូលអារមុមណ៍សូរូបខុយល់តិចៗរហូតដល់ពញតូរង។
២. ដកដង្ហើមចញ្ជរហូតដល់អស់ ហើយមានអារមុមណ៍ធូសុាល។
៣.លុបៀនដង្ហើមយាងទៅតាមកំរិតូញសូបូន,ពី៦ទៅ៩ដងកុនុង១នាទី,មុតង១នាទី។
៤. ពលេដកដង្ហើមសូមធ្វើាដាយភាពយឺៗ ហើយដកដង្ហើមចញ្ជរហូតដល់អស់អាចបង្ការភាពវិលមុខហន។

婦女健康的守門員-子宮頸抹片檢查

子宮頸抹片檢查可以早期發現子宮頸癌，經治療而延長存活期，如在癌前病變時發現，可經由治療而阻斷後續發展為癌症。各位準媽媽們，請於產後惡露排乾淨時，記得至各健保特約醫院或診所接受子宮頸抹片檢查。

1. 誰需要做子宮頸抹片檢查？

大部分的子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒所引起，凡曾有過性經驗的婦女，都可能罹患子宮頸癌，特別是30歲以上，故建議30歲以上婦女每三年做一次子宮頸抹片檢查。另，依資料顯示，每篩檢70位婦女，就可以找到一位癌前病變或癌症個案。

2. 子宮頸抹片檢查怎麼做？

子宮頸抹片檢查過程簡單，大多不會感到疼痛，採檢過程係將擴陰器置入陰道，擴張陰道,再以小木棒或小刷子在子宮頸上，輕輕刮取子宮頸少量剝落的細胞，塗抹於玻片上，經過染色後，透過顯微鏡檢查是否有可疑性的癌前病變及癌細胞存在。

3. 子宮頸抹片檢查前要注意什麼？

不要沖洗陰道、避免盆浴、勿放置塞劑、前一夜不要有性行為、避開月經期間。

4. 當子宮頸抹片異常時怎麼辦？

子宮頸抹片異常並不代表已經患有癌症，必須請醫師做進一步陰道鏡檢查及切片，來確認是否為子宮頸癌。

＊提醒您，任何一項篩檢都會有偽陰性個案發生，所以即使抹片檢查結果正常，仍應每三年做抹片檢查，且如有任何異狀時，均應儘速就醫。

5. 接種(HPV)疫苗後，還需要定期做子宮頸抹片檢查嗎？

例行的子宮頸抹片檢查仍是必要的，因為仍有3-4成子宮頸癌是HPV疫苗無法預防的其他HPV型別所造成。

ការគាំពារសុខាភាពស្ត្រីត ការពិនិត្យសុបូន

ការពិនិត្យមាត់ស្បូនអាចជាការរកឃើញដំបូងនជៃងឺមហារីកមាត់ស្បូន បនទាប់ពីការពុយាហាលនិងការពនយាពលេរស់វានមានជីវិត ហានឃើញការបុរប្រែរួលជំងឺមុនពលេមហារីក តាមរយៈការពុយាហាលអាចរារាំងការវិវឌ្ឍន៍ជាបនតកុលាយជាជំងឺមហារីក។សុតុរីជាមុតាយទាំងឡាយ សូមចាំថា កុរាយពលេសមុរាលហើយពលេដលៃឈាមអាកុរក់ហូរអស់សុអាតហាត តូរវទៅការពិនិត្យមាត់ស្បូននៅតាមមនទីរពទេយឬ គុលីនិកដលៃប្រឹកាតសុខភាព។

១.តីអ្នកណាខុលៈតូរវការការពិនិត្យស្បូន?

សុរតីដលៃមានជំងឺមហារីកស្បូនភាគចុរីនសុទ្បតឆៃលងតាមមរោគនការរួមភរទេ អាយតជៅសុតុរីដលៃមានបទពិសាធ៌រួមភរទេ សុទ្បតអោចឆៃលងជំងឺមហារីកស្បូនទាំងអស់ ជាពិសសេគឺសុតុរីដលៃមានអាយុចាប់ពី៣០ឆ្នាំមឡើងទៅ ដូចនេះសូមសំណូមពរដល់សុរតីដលៃមានអាយុ៣០ឆ្នាំមឡើងទៅធ្វើការពិនិត្យស្បូនយ៉ាងតិចអាយហានមុតង។ កុរាពីនេះ តាមការសុរាវជ្រាវហានបង្ហាញឲ្យឃើញថា រាល់ការពិនិត្យទៅលើសុរដីចំនួន៧០រូប រកឃើញករណីជមុងឺមុនពលេកីតមហារីក ឬករណីអ្នកជមុងឺមហារីកមុនាក់។

២.ការពិនិត្យសុបូនធ្វើឡើងដាយវិធីណា?

ដំណាក់កាលពិនិត្យដសៃ្បូនមានភាពងាយសួល ជាទូទៅគឺគុមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ឡើយ។ ពលេធ្វើតសេ្ត គយកឧបករណ៍ដាក់ចូលបុរដាប់ភទេសុរតី ហើយយកបនទះឈើតូចរឹកូនចុរាស់តូចៗដុះសុរាលៗនៅតុរង់ខាងលើដសៃ្បូន ដើមុបីយកកាសិកា និងធ្វើការពិនិត្យតាមម៉ាសីនពិនិត្យកូរម៉ូស្កូមតីមានជំងឺមហារីកដលៃរឺអត់។

៣.មុនពលេធ្វើការពិនិត្យសុបូនតីតូរវយកចិតុតទុកុខដាក់បញ្ហាណាខុលៈ?

សូមកុំធ្វើការលាងបុរដាប់ភទេ ចៀសវាងកុំតុរាំទឹកកុំដាក់ថុនាំនៅខាងកុនុងកុំធ្វើការរួមភរទេមុនមួយថុងដៃ ជាងវាងពលេមករដូរ។

៤.នៅពលេដលៃពិនិត្យឃើញសុបូនមានសភាពមិនបុរកុរដីតីគួធ្វើបែណា?

ភាពមិនបុរកុរដីនដៃសៃ្បូនមិនបញ្ជាក់ថាមានជំងឺមហារីកសុបូនឡើយ តូរវធ្វើការពិនិត្យតាមរយៈគួរពទេយជាមុខសិន ដើមុបីអាយច្បាស់ថាតីមានជំងឺមហារីកសុបូនដលៃរឺអត់។

* រំលឹក៖រាល់ការពិនិត្យទាំងឡាយសុទ្បតមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក៏តឡើង ដូចនេះគិតថាលិតផល់នការពិនិត្យមានភាពបុរកុរដី តនៅពលេមានបញ្ហាគួរធ្វើការសុរងៃរកគួរពទេយអាយហានទាន់ពលេ។

១.បនទាប់ពីពលេហានចាក់ថុនាំវ៉ាក់សាំងការពារមហារីកសុបូនរួចតីតូរវការធ្វើតសេ្តសុបូនឬទេ?

ការពិនិត្យកាសិកាកសុបូន (Pap smear) នៅតមានភាពចាំបាច់ ពុរៈមានមហារីកកសុបូន ៣០ ទៅ ៤០ភាគរយ បណ្តាលមកពីបុរភទេ HPV ដទៃ ដលៃថុនាំបង្កការ HPV មិនអាចបង្កការហានទ។

新生兒篩檢

新生兒篩檢的目的為何？有哪些好處？如何接受新生兒篩檢及得知新生兒篩檢結果？

新生兒篩檢是「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」的簡稱，早期發現症狀不明顯的先天性代謝異常疾病，提供適當的確診、治療或預防措施；使得患病的孩子能夠正常發育，不致造成身心障礙與家庭的遺憾。

我的寶寶如何接受新生兒篩檢？

在您的寶寶出生後滿48小時，接生的醫療院所（助產所）會採取寶寶少許的腳跟血液，並寄交國民健康署新生兒篩檢合約實驗室進行相關檢驗。

如何得知新生兒篩檢結果？

篩檢結果約於採檢後1週，即可透過新生兒篩檢中心網站查詢篩檢結果。在尚未知道篩檢結果之前，請不要讓寶寶接觸荼丸（俗稱臭丸；樟腦丸），也不可任意服用藥物；如有健康上的問題，請務必詢問您的小兒科或家庭醫學科醫師。

新生兒篩檢可以發現哪些疾病？

由於醫療科技的進步，遺傳檢測技術已被臨床廣泛運用。但是，並非所有疾病，都適合在新生兒期進行篩檢或能偵測出來。目前經國民健康署認定之篩檢項目，係依優生保健措施減免或補助費用辦法訂定，包括：苯酮尿症、先天性甲狀腺低能症、高胱胺酸尿症、半乳糖血症、葡萄糖六磷酸鹽去氫酶缺乏症、先天性腎上腺增生症、楓糖漿尿病、中鏈醯輔酶A去氫酶缺乏症、戊二酸血症第一型、異戊酸血症、及甲基丙二酸血症等共11項；係基於新生兒最佳利益考量而建議，每個新生兒均應接受篩檢服務。至於目前已提供而尚未納入衛生福利部認定的新生兒篩檢項目，因考量須釐清其臨床效力、或有無確診後續發展及有效的治療方法等，均需採先趨性研究進一步探究；亦應經過家長知情同意，並獲得父母簽署之書面同意書，方可進行篩檢。

政府提供新生兒篩檢之檢驗費用減免

國民健康署認定11項新生兒篩檢減免費用，一般新生兒每案減免新臺幣200元；但列案低收入戶、優生保健措施醫療資源不足地區之醫療機構（助產所）出生者，每案減免新臺幣550元，政府全額補助，民眾無須負擔檢驗費用（民眾仍須自付採檢醫院行政費用或相關材料費，視各醫院收費額度而定）。

ត្រួតពិនិត្យទារកថ្មី

តើគោលបំណងនៃការពិនិត្យទារកទើបកើតដើម្បីអ្វី? តើមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? តើធ្វើដូចម្តេចអាចទទួលយកការពិនិត្យទារកទើបកើត និងដឹងពីលទ្ធផលក្រោយការពិនិត្យទារកទើបកើត?

ការពិនិត្យទារកទើបកើតជាពាក្យកាត់របស់"ការពិនិត្យតាមដានទារកទើបកើតដើម្បីរកជំងឺសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងសរីរាង្គមិនប្រក្រតីពីកំណើត "រកឃើញដំបូងនៃរោគសញ្ញាមិនជាក់លាក់របស់សារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងសរីរាង្គមិនប្រក្រតីពីកំណើតផ្តល់នូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដែលសមស្របនឹងការព្យាបាលឬវិធានការការពារ។ធ្វើឱ្យកុមារដែលមានជំងឺនេះអាចនឹងវិវឌ្ឍន៍បានតាមធម្មតា មិនបណ្តាលឲ្យក្លាយជាជនពិការនិងការសោកស្តាយនៃក្រុមគ្រួសារ។

កូនរបស់ខ្ញុំទទួលយកការពិនិត្យទារកទើបកើតរបៀបណា?

បន្ទាប់ពីកូនរបស់អ្នកកើតពេញ ៤៨ ម៉ោងនៅមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលបង្កើតកូន(កន្លែងបង្កើតកូន)នឹងជួសយកឈាមនៅកែងជើងទារកបន្តិច ហើយបញ្ជូនទៅកាន់ មន្ទីរពិសោធន៍របស់មន្ទីរសុខាភិបាលជាតិដែលមានកិច្ចសន្យាទាក់ទងនឹងការពិនិត្យទារកទើបកើតសម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យ។

វិធីដូចម្តេចទើបដឹងពីលទ្ធផលក្រោយការពិនិត្យទារកទើបកើត?

អាចដឹងលទ្ធផលពិនិត្យប្រហែលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការជួសឈាម ក៏អាចតាមរយៈវេបសាយមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យទារកទើបកើតរាវរកលទ្ធផលនៃការពិនិត្យ។មុនពេលដឹងលទ្ធផលនៃការពិនិត្យ ចូរកុំឱ្យទារកប៉ះគ្រាប់ប្រដៅកាតម្យ៉ាង(គ្រាប់ថ្មស្អុយ គ្រាប់ថ្នាំក្រឡាត) ក៏មិនអាចប្រើថ្នាំអ្វីទាំងអស់ ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាសុខភាពត្រូវតែពេទ្យកុមារឬគ្រូពេទ្យក្រុមគ្រួសារ របស់អ្នក។

ការពិនិត្យទារកទើបកើតអាចរកឃើញជំងឺ?

ដោយសារតែបច្ចេកទេសផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រតើរីកចំរើន បច្ចេកវិទ្យាធ្វើតេស្តហ្សេនៃបន្តពូជត្រូវបានមន្ទីរព្យាបាលប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយ។ប៉ុន្តែមិនមែនរាល់ជំងឺទាំងអស់ដែលស័ក្ដិសមនឹងធ្វើការពិនិត្យឬអាចរកឃើញសម្រាប់ទារកវ័យតូចនោះទេ។បច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលជាតិបានកំណត់ករណីសំរាប់ពិនិត្យ យោងតាមវិធានការនាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាពល្អ កំណត់វិធីកាត់បន្ថយឬផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំណាយ រួមមាន៖ ហ្វេនើលកឺតូក្នុងទឹកនោម ខ្សោយថាមពលក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដពីកំណើត សារធាតុស៊ីស្ទីនខ្ពស់ក្នុងទឹកនោម កំណើនជាតិស្ករក្នុងឈាម កង្វះខាតG៦PD អ៊ីពប៉េលាស៊ៀនៅលីតំរងនោមពីកំណើត ស៊ីរ៉ូក្នុងទឹកនោមអាស៊ីតអមើញ៉ា គ្លុយតារិកប្រភេទទី១ អាស៊ីតអមើញ៉ា អ៊ីស្វ៉ាឡេរិក និងអាស៊ីតអមើញ៉ា ម៉ទើលម៉ាឡូនិក សរុបចំនួន ១១។ត្រូវបានផ្អែកលើការពិចារណានូវផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់ទារកទើបនឹងកើតនិងការផ្ដល់អនុសាសន៍ថារាល់ទារកទើបកើត គួរតែទទួលបាននូវសេវាកម្មពិនិត្យដូចគ្នា។យ៉ាងហោចណាស់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ធ្លាប់ផ្ដល់តែមិនទាន់បញ្ចូលក្នុងភ្នាក់ងារសុខាភិបាលជាតិបានកំណត់គម្រោងពិនិត្យទារកទើបកើត ព្រោះដោយសារពិចារណាថាត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលឬមានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់និងការវិវឌ្ឍន៍ទៅថ្ងៃក្រោយនិងប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល។ល។ជាទូទៅត្រូវការប្រមូលសាកល្បងការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់បន្ថែមទៀត បន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ ព្រមទាំងទទួលបានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយឪពុកម្តាយនៅមុនពេលពិនិត្យ។

រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់នូវការពិនិត្យទារកទើបកើតដោយកាត់បន្ថយថ្លៃពិនិត្យ

ភ្នាក់ងារសុខាភិបាលជាតិបានកំណត់១១ករណីពិនិត្យទារកទើបកើតដោយកាត់បន្ថយតម្លៃ តាមធម្មតារាល់ករណីទារកទើបកើតកាត់បន្ថយថ្លៃពិនិត្យ២០០យានល្មយតៃវ៉ាន់។តែបើក្នុងករណីនៃគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រនាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាព(កន្លែងសំរាល) ខ្វះធនធានវេជ្ជសាស្ត្រ កាត់បន្ថយថ្លៃពិនិត្យ៥៥០យានល្មយតៃវ៉ាន់រាល់ករណី។ រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជំនួយទាំងស្រុង ប្រជាជនមិនបាច់ខ្វល់ពីការបង់ប្រាក់ថ្លៃពិនិត្យ(តែប្រជាជននៅតែបង់ប្រាក់ថ្លៃកិច្ចរដ្ឋបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យឬបង់ប្រាក់ថ្លៃឯកសារដែលទាក់ទងទៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិមួយៗដែលបានកំនត់ទទួលចំនួនទឹកប្រាក់។)

寶寶健康的第一道防線

給準父母貼心的小叮嚀

在尚未知道新生兒篩檢結果之前，請不要讓寶寶、衣物或用品接觸萘丸(俗稱臭丸；樟腦丸)或其氣味，以避免溶血性貧血之可能發生。也請提醒接生醫院將寶寶的篩檢結果，記錄於「兒童健康手冊」內，以提供寶寶就醫參考；篩檢結果在正常範圍的寶寶，並不代表健康狀況沒有問題，仍須按時接受兒童預防保健服務，保障寶寶的健康權益喔！

嬰兒搖晃症候群首先在1972年提出，是指因劇烈搖晃嬰兒，導致嬰兒頭骨內的腦組織在短時間內快速晃動，造成腦部表面的血管破裂，引發硬腦膜下血腫或蜘蛛膜下腔出血，並常伴隨有視網膜出血及腦水腫；大部分發生在兩歲以下兒童，尤其是小於六個月的嬰兒。嬰兒搖晃症候群，常是因為照顧者不耐嬰幼兒哭鬧不停且無法安撫而動怒，故用力搖動嬰兒企圖阻止哭鬧，但因搖動過於劇烈而導致腦部傷害；一般的輕微晃動並不會導致嬰兒搖晃症候群。因此即使沒有明顯外傷，嬰兒搖晃症候群仍被視為一種兒童虐待的行為，歸類為虐待性頭部傷害的一種。

發生嬰兒搖晃症候群時可能出現的症狀包括：嗜睡、急躁不安、抽筋、意識受損、嘔吐、食慾不振及呼吸異常等，一旦發現應盡速就醫，由醫護人員給予適當的治療；由於致命率很高，且容易有發展遲緩、癲癇、腦性麻痺等長期後遺症，因此預防嬰兒搖晃症候群的發生十分重要，照顧者須注意，無論如何都不可以用力搖晃寶寶、甩耳光或將寶寶拋到床上，也盡量不要抱著寶寶用力旋轉。抱著孩子或與孩子玩耍時一定要保護頭頸部，尤其是六個月以下的嬰兒要給予頭頸部適當的支持。此外，所有的寶寶的照顧者都需要了解搖晃嬰幼兒的危險性，並學習如何安撫哭鬧嬰幼兒的技巧，以免因情緒失控時做出不利嬰兒的錯誤舉動。

ការគាំពារសុខភាពកូនៗទាំងអស់

សចេក្តីសុនីសុំទាំកាន់ឪពុកម្តាយ

នាពលេដលែមិនទាន់ដឹងពីលិតផលនកែារពិនិត្យរបស់ទារកទីបនិងកីត សូមកុំបន្តាយអាយទារក ប៉ះពាលទាំនឹងសំលៀកបំពាក់រឹសំភារៈនាៗប៉ះពាល់ជាមួយនិងថ្នាំណាវ៉ែន(គេតែងតែហៅថាថ្នាំឆ្លូវ៉ែន,ថ្នាំចាងណា)រឺយ៉ូឌីន ដឹមុបីជាងវាងជំងឺខ្លះគ្រាប់ឈាមកុរហាមកឹតឡឹង។ក៏សូមធ្វើការរំលឹកគ្នូរពទ្យេដែលធ្វើការពិនិតកត់ត្រាលិតផល់ការពិនិត្យចូលកុនុង(សៀវភៅសុខាភាពកុមារនិងទារក)ផង។ ដឹមុបីធ្វើការពិចារនាពលេធ្វើការពិនិត្យកូនៗ លិតផលនកែារពិនិត្យទារកមានភាពបុរកុរដឹមិនមនែមាននថៃាសុខាភាពមិនមានបញ្ហាទាំងសុរុងនាៈទ។ នាតត្រែូវធ្វើការទទួលយកសវោគាំពារសុខាភាពកុមារនិងទារកអាយហានទៀងពលេដដែ។ សូមធានាសុខាភាពរបស់កូនៗអ្នកណា។

បុរជុំជមុងឺអង្សួនទារក តូរ្វហានលីកឡឹងជាលីកដំបូងកុនុងឆ្នាំ១៩៧២សំដៅទាំលីការអង្សួនទារកខុលាំង។ បណ្តាលឲ្យបណ្តុំខ្លួរកុហាលកុនុងលលាដ៍កុហាលទារកកុរឡកដាយលុបឿនលឿនកុនុងរយៈពលេខុលី បង្កឲ្យដាច់សសលៃាមផ្ទខ្លៃរកុហាល នាំឲ្យកកឈាមនាំកុរាមសុរាមខ្លួរឹង ឬហូរឈាមកុនុងសុរាមខ្លួរកុហាល ពុរមទាំងបណ្តាលឲ្យមានហូរឈាមកុនុងសុរទាប់រទើននិងហឹមខ្លួរកុហាល។ ភាគចុរនែកីតមានចំពាៈទារកអាយុកុរាម២ឆ្នាំ ជាពិសសេទារកអាយុកុរាម៦ខ។ែបុរជុំជមុងឺអង្សួនទារក តងែកីតឡឹងដាយសារកំហឹងរបស់អ្នកមីលថទាំងចំពាៈទារកដលែយំមិនឈប់ឈរ និងលួងមិនហាត់ ហាតេុនៈពួកគកេ៏បុរកមុលាំងអង្សួនទារកកុំឲ្យពួកគយេំតទាំទៀត ប៉ុនុដដាយសារការអង្សួនខុលាំងហួសហាតេុពកេកេ៏បណ្តាលឲ្យមានរបួសខ្លួរកុហាល។ ការអង្សួនថ្នមៗមិនអាចបង្កឲ្យមានបុរជុំជមុងឺអង្សួនទារកឡីយ។ហាតេុដូចនៈទាៈបីគ្មានរបួសខាងកុរា ប៉ុនុដបែុរជុំជមុងឺអង្សួនទារកតូរ្វរាប់បញ្ចូលជាការធ្ងៃរទុក្ខទាសទាំលីកុមារ តូរ្វហានចាប់បញ្ចូលកុនុងការបង្កករបួសផ្ទនែកខ្លួរកុហាលបុរតទេធ្ងៃរទុក្ខទាស។

រាគសញ្ញានបែុរជុំជមុងឺអង្សួនទារកូរមមានៈ ដកេចុរែន អនុទៈសារនាមិនសុខបុរគុរែវកាច់ខ្លួចខាតសតិ កុអួត គ្មានចំណង់អាហារ និងដកដង្ហើមខុសបុរកុរតីជាដឹម។បុរសិនបីបុរទៈឃើញអាការៈទាំងនេះ តូរ្វទទួលការព្យាបាលជាបនទាន់។ ដាយហាតេុអតុរាន គែារៈថ្នាក់ដល់ជីវិតខុពស់ ពុរមទាំងងាយសួរលបន្សល់នូវជមុងឺរែកលួតលាស់យឺតយ៉ាវ ជមុងឺឆ្កួតជ្រួក និងជមុងឺសុពឹកខ្លួរកុហាលជាដឹម។ហាតេុដូចនៈការទប់សុកាត់កំណើតឡឹងនបែុរជុំជមុងឺអង្សួនទារកពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ អ្នកមីលថទាំទាំហាច់តូរ្វបុរុងបុរយ័តុន ដាយទាៈបីជាយ៉ាងណាក៏មិនតូរ្វបុរែកមុលាំងអង្សួនទារក ទៈកំជុលៀង ឬហាៈទារកទាំលីគុនែាៈទ។ ហឹយក៏ជៀសវាងការឱបទារកូរចបុរែកមុលាំងបង្ហៃលខុលួនផងដដែ។ពលេឱបកូន ឬលេងជាមួយកូន តូរ្វការពារផ្ទនែកកុហាលនិងករបស់ពួកគជាពិសសេទារកអាយុកុរាម៦ខ។ែ តូរ្វផ្ទដល់នូវការគាំទុរសមលុមមទាំដល់ផ្ទនែកកុហាលនិងករបស់ពួកគ។កុរាពីនេះ អ្នកមីលថទាំទារកទាំងឡាយ តូរ្វយល់ចុហាស់អំពីគ្រាៈថ្នាក់នការអង្សួនទារកកុមារ ពុរមទាំងរៀនពិវិធីលួងលាមពលេពួកគយេំ ដឹមុបីជៀសវាងទង្វើខុសឆ្គងដលែប៉ះពាល់ដល់ទារកពលេមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហាន។

預防嬰幼兒感染百日咳

百日咳是一種急性呼吸道傳染性疾病，係透過飛沫或近距離接觸而感染。

小於6個月的寶寶是感染百日咳的高危險群，主要的感染源為親密照顧的媽媽及其他照顧者。新生兒一旦感染會產生咳嗽、嘔吐、呼吸困難等症狀，嚴重者造成休克，併發肺炎、腦病變甚至導致死亡。

預防嬰幼兒感染百日咳「不論過去的破傷風、減量白喉混合疫苗（Td）或減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap）接種史，每次懷孕應接種1劑Tdap疫苗，可在任何孕程接種(自費)。但為使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，建議於懷孕第28-36週接種；若懷孕時未接種，則應於生產後立即接種。另，會照顧寶寶的其他家屬親人，也建議同時接種，除保護新生兒，也保護自己。」

ការពារទារកឆ្លងជំងឺកុអក់មាន់

ជំងឺកុអក់មាន់គឺជាជំងឺឆ្លងតាមរយៈបំពងដង្ហើម គឺឆ្លងតាមរយៈមរោគកុនុងខ្យល់ដលែយើងហានប៉ះពាល់

ជំងឺកុអក់មាន់គឺជាជំងឺឆ្លងតាមរយៈបំពងដង្ហើម គឺឆ្លងតាមរយៈមរោគកុនុងខ្យល់ដលែយើងហានប៉ះពាល់

កូនដលែមានអាយុតូចជាង៦ខគែឺជាមុខសញ្ញាគ្រាះថ្នាក់កុនុងការឆ្លងជំងឺកុអក់មាន់ បុរភពចំបងនការចំលងមរោគតាមរយៈសុរតីដលែថទៅមកូននិងអុនកមីលថទៅរកផ្សងេៗទារកទីបនិងកីតពលេដលែឆ្លងជំងឺបុរភេទនេះនិងមានអការៈកុអក់ គុអូត អការៈពិហាកដក់ដង្ហើម ខុលៈមានសាភាពធ្ងន់ធ្ងរបណ្តាលអាយហាត់បង់ជីវិត បញ្ហតាលអាយមានជំងឺរលាកសួតជំងឺខួលក្បាលរហ្វត់ដល់សុលាប់។

បង្ការការឆ្លងមរោគកុអកមាន់ដល់ទារកទារៈបីកន្លងមកធ្លាប់មានតគោណូស ថ្នាំបង្ការាគខាន់សុលាក់រួមបញ្ចូលគុនា (Td) ឬថ្នាំបង្កាតគោណូស រាគខាន់សុលាក់មិនមនែកាសិកាជម្ងឺកុអកមាន់ (ថ្នាំបង្ការ Tdap) បុរវត្តិទទួលថ្នាំបង្ការ ជារៀងរាល់ពលេមានផ្ទៃពោះគួរទទួលវ៉ាក់សាំងមុដង អាចចាក់នាដំណាក់កាលត្រីមាសណាក៏ហាន(បង់ថ្លដៃាយខ្លួនឯង)។ប៉ុន្តដើមុបីធ្វឱ្យអង់ទីកររបស់មុតាយហានបញ្ជូនដល់ទារកដាយបុរសិទ្ធិភាពយ៉ាងល្អនាៈ សូមផ្តាំដល់ថាគួរថ្នាំបង្ការពលេគិតអាយុ២៨-៣៦ សបុតាហ៍។បុរសិនបីពលេមានគិតមិនហានាក់ថ្នាំបង្ការ បនទាប់ពីសំរាលបុតុរួចគួរតថ្នែាំបង្ការភ្លាម ។ម៉ុយាងទៀតកុនុងពលេជាមួយគុនានៈសំណូមពរឲ្យសមាជិកកុនុងគួរសារដលែជួយថរែកូនង៉ែត ក៏គួរថាក់ថ្នាំបង្ការដរែ ដើមុបីការពារកូនង៉ែតនិងការពារខ្លួនឯង។

新生兒卡介苗接種資訊

預防重於治療，接種卡介苗可避免幼童發生結核性腦膜炎及粟粒性結核病，研究顯示，未接種卡介苗的幼童較接種卡介苗者罹患結核性腦膜炎增加了47倍的風險(我國未接種卡介苗之幼童結核性腦膜炎發生率約為百萬分之152.5)，此類疾病若未及早診治會造成腦積水、脊髓障礙、腦血管病變、腦梗塞等不可逆病變，最後導致終身殘疾(無法行走及自理生活、長期臥床、智商受損、發展遲緩)的後遺症，且其伴隨著高致死率(約20%-40%)。嬰幼兒的抵抗力弱，如受到結核菌的感染，可能發生急性結核病（如結核性腦膜炎或粟粒性結核病）而危及生命，因此，對於沒有接種卡介苗禁忌症的嬰幼兒，宜於出生24小時後及早接種，至遲為出生滿1個月時，併B型肝炎疫苗第二劑一起施打。

我國目前尚屬結核病中度負擔之國家，且結核菌之傳播途徑為空氣傳染，任何人都有受感染的機會。依照我國目前出生率及國內結核病發生資料推估，倘國內停止施打疫苗，則每年將新增約30例之幼兒結核性腦膜炎病例。而目前鄰近國家包括南韓、泰國、越南，甚至結核病發生率較我國低的日本、新加坡等，也都實施全面性新生兒接種卡介苗，尚未有選擇性接種的情形。

卡介苗為一減毒活菌疫苗，當大規模接種時，確實會有少數的小孩因某些尚未可確定的因素，產生副作用，而目前確也無法以簡單的方式篩選出可能發生副作用的小孩。部分兒童在接種後，可能發生局部膿瘍、淋巴結炎等較常見但不嚴重的不良反應，極少數幼童可能發生較嚴重的副作用，如：骨炎、骨髓炎等。經過醫療照顧後，幼童多半能恢復正常生活。

在接種前，請父母確認父母雙方家人沒有疑似先天性免疫缺失之家族史（如幼年因不明原因感染而死亡）。另對於後天免疫不全病毒(HIV)感染的母親所生之新生兒，請諮詢感染科醫師後，始得接種。

自2007年我國開始主動監測卡介苗不良反應，而近幾年之發生數已可掌握且穩定，除了芬蘭、瑞典及加拿大之外，其他國家尚未建立該項目之監測系統。監測資料亦顯示，我國卡介苗接種後造成骨炎、骨髓炎發生比率約百萬分之55，尚在世界衛生組織估計的範圍內。

國際間亦非常重視卡介苗相關問題，並已花費相當長的時間及資源積極開發新的疫苗以取代卡介苗，倘有所成，我國亦會主動進行疫苗之調整，以減輕不良反應之風險。在此之前，疑似因接種卡介苗受傷害者，得透過接種地之縣市衛生局的說明與協助，申請預防接種受害救濟。

ប្រការប្រុងប្រយ័ត្ននៃការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCGសម្រាប់ទារកទើបកើត

ការបង្ការមានសារៈសំខាន់ជាងការព្យាបាល។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG អាចបញ្ជៀសទារកពីជម្ងឺរបេងសួតមុខរុក្ខាល និងជម្ងឺរបេងគ្រាប់ពងបាយ (Miliary tuberculosis)។ តាមការសុវាជ្ជវិហានបង្ហាញឲ្យឃើញថា កុមារដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការរបេង មានហានិភ័យកើតជម្ងឺរបេងសួតមុខរុក្ខាល៥៧ដងខ្ពស់ជាងកុមារដែលចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG (អត្រាននៃការកើតជម្ងឺរបេងសួតមុខរុក្ខាលរបស់កុមារតវ៉ាន់ដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCGមានបុរមាណ ១៥២.៥ ភាគ១លាន) ជម្ងឺបេរុតទេនេះបុរសិនបីមិនព្យាបាលទាន់ពេលវេលាទេ នឹងបណ្តាលឲ្យមានជម្ងឺដក់ទឹកកនុងខួរក្បាល ជម្ងឺឆ្អឹងខួរនង ជម្ងឺសសឈើមខួរក្បាល និងជម្ងឺងាប់ខួរក្បាល នាទីបញ្ចប់បណ្តាលឲ្យពិការមួយជីវិត (មិនអាចធ្វើចលនានិងចាត់ចែងការរស់នៅដាយខ្លួនឯងបាន ដកេឈីរយៈពេលវែង ខូចខាតបញ្ញា និង រីករលូតលាស់យឺតយ៉ាវ) មុយ៉ាងទៀតវាមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ (បុរមាណ ២០% ទៅ ៤០%)។ ទារកមានភាពស៊ាំខុសាយ បុរសិនបីតួរបានចមុលងដាយចាក់តពីជម្ងឺរបេង អាចនឹងបង្កឲ្យកើតជម្ងឺរបេងធ្ងន់ធ្ងរ (មានដូចជា ជម្ងឺរបេងសួតមុខរុក្ខាល ឬជម្ងឺរបេងគ្រាប់ពងបាយ (Miliary tuberculosis)) ដែលបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត។ ហេតុដូចនេះ ទារកដែលគ្មានជម្ងឺតំណមថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG គបបិទទូលចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យបានលឿនបំផុតក្នុងរយពេលចាប់កំណើត២៤ម៉ាង និងយូរបំផុតក្នុងរយពេលកើត១ខែ ដាយចាក់ពុរមគ្នាជាមួយថ្នាំបង្ការជម្ងឺរលាកថ្លើមបុរតេទBលើកទី២។

តវ៉ាន់សព្វថ្ងៃនៅតតែរួវបានរាប់បញ្ចូលកុនុងបុរទេសេមានបនទុកជម្ងឺរបេងកម្រិតមធ្យម។មធ្យាហាយចមុលងបាក់តពីជម្ងឺរបេង គឺតាម រយៈខួយលអាកាស ដាយមនុស្សគួរបបូរបមានឱកាសឆ្លងគ្រប់គ្នា។ យាងទៅតាមសចេកុដ្ឋីសន្ននិដ្ឋានដាយផ្អកទៅលើអត្តរាកំណើត និងទិន្នន័យនកើការកើតជម្ងឺរបេងកុនុងបុរទេសនាពលបច្ចុបបនន បុរសិនបីកុនុងបុរទេសេបញ្ឈប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការ នាៈជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងមានកំណើនករណីទារកកើតជម្ងឺរបេងសួតមុខរុក្ខាលចំនួន៣០ករណី។ មុយ៉ាងទៀតបុរទេសេជិតខាងដែលមានអត្រាកើតជម្ងឺរបេងទាបជាងតវ៉ាន់ រួមមានជប៉ុន សឹង្ហបុរី ក្រុខោងតុង ថ ិ និងវៀតណាមសុទ្ធតដៅកំអនុវត្តដការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCGគ្រប់ជុំរុងជុរាយសមុរាប់ទារកទើបកើត តមិនមានការចាក់ថ្នាំបង្ការដាយជ្រើសរើសឡើយ។

ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG គឺជាបុរភេទថ្នាំបង្ការដលែមានមូរោគខុសាយ ពលេដលែចាក់ថ្នាំបង្ការបុរភេទនេះកុនុងបរិមាណចុរែន វាបណ្តាលឲ្យមានផលប៉ៈពាល់ទៅដល់កុមារមួយចំនួនតូចដាយសារកតុដាមិនចុរាស់លាស់មួយចំនួន។ មុយ៉ាងទៀតបច្ចុបបននន្នក៏ពិហាកនឹងជ្រើសយកកុមារដលែអាចនឹងកើតមានផលប៉ៈពាល់នេះដាយវិធីសាមញ្ញដរែ។ កុរាយពលេចាក់ថ្នាំបង្ការ កុមារមួយចំនួនអាចនឹងកើតមានខ្ទុះតាមផ្ទនកៃខ្លៈនរៃងកាយឬរលាកកុរពញទឹករងៃ ដលែជាអាការៈទូទៅនិងមិនធ្ងន់ធ្ងរ។ តមានកុមារភាគតិចដលែអាចនឹងកើតមានបុរតិកមមដូចជាៈ រលាកឆ្អឹង និងរលាកខួរឆ្អឹង ជាដើម។ កុរាយពលេព្យាបាល កុមារភាគចុរែនអាចតុរលប់មកការរស់នៅជាធមមតាវិញ។

មុនពលេចាក់ថ្នាំបង្ការ សូមមុដាយឪពុកបញ្ជាក់ឲ្យបានចុបាស់ថាគួរសារទាំងសងខាងធ្លាប់មានបុរវត្តិដិបុរព័ន្ធស៊ាំរាងកាយមិនគ្រប់គ្រានពីកំណើតដរែឬទេ (ដូចជា សុលាប់ទាំងកុមងេដាយឆ្លងដជម្ងឺដាយមិនដឹងមូលហាតុ)។ កុរាពីនេះ ចំពៈទារកដលែមានមុដាយដលែឆ្លងវរុីសដលែបណ្តាលឲ្យបុរព័ន្ធស៊ាំមិនពញេលញេ (HIV) សូមពិគ្រាៈជាមួយវជ្ជបណ្ឌិតជុនកែជម្ងឺឆ្លងមុននឹងចាក់ថ្នាំបង្ការ។

ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៧មក តវ៉ាន់ចាប់ផ្តើមផ្តួចផ្តើមធ្វើការអង្កេតទៅលើបុរតិកមមអវិជ្ជមាននថ្ងៃនាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG។ កុនុងប៉ុនមានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ចំនួនករណីដលែកើតមានឡើងមានលំនឹងនិងអាចគ្រប់គ្រងបាន។ កុរាពីបុរទេសេហ្វាងឡុង សុរីស និងកាណាដា បុរទេសេដទៃតកុនុងពិភពលាកមិនទាន់បានបង្ហកើតបុរព័ន្ធអង្កេតនេះនៅឡើយទេ។ ទិន្នន័យនការអង្កេតគំហានបង្ហាញឲ្យឃើញថា តវ៉ាន់មានអត្រានការកើតជម្ងឺរលាកឆ្អឹង និងជម្ងឺរលាកខួរឆ្អឹងកុរាយពលេចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCGបុរមាណ ៥៥ ភាគ១លាន ដលែសុចិតកុនុងទំហំនៃការប់ាន់សុមានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលាក។

លីឆាកអនុដរជាតិ គយេកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG ព្រមទាំងបានចំណាយពេលវេលានិងធនធានយ៉ាងច្រើនកុនុងការសុវាជ្ជវរកថ្នាំបង្ការថ្មីជំនួសថ្នាំបង្ការនេះ។ បុរសិនបីទទួលបានជាគជ័យ តវ៉ាន់ក៏នឹងផ្តួចផ្តើមធ្វើការកបែរថ្នាំបង្ការ ដើមបីកាត់បនថយហានិភ័យនដែលប៉ៈពាល់អវិជ្ជមាន។ បុគ្គលសង្ស័យថារងគ្រាៈដាយការចាក់ថ្នាំបង្ការ តូរធ្វើការសុនីសុំជំនួយឧបត្ថម្ភជនរងគ្រាៈដាយការចាក់ថ្នាំបង្ការ តាមរយៈជំនួយនិងសចេកុដ៏បញ្ជាក់ពីមនុទិរសុខាតិហាលសុរុកកុរុងដលែខ្លួនចាក់ថ្នាំបង្ការ។

新生兒卡介苗接種資訊

接種卡介苗後之1至2週內，注射部位會呈現一個小紅結節，之後逐漸變大，微有痛癢但不發燒。4至6週後會變成膿瘍或潰爛，不必擦藥或包紮，只要保持清潔及乾燥，如果有膿流出可用無菌紗布或棉花拭淨，應避免擠壓。平均2至3個月會自動癒合結痂，留下一個淡紅色小疤痕，經過一段時間後會變成膚色。

5歲以下幼童如果出現局部膿瘍/腫脹等疑似卡介苗不良反應時，宜提醒醫師將卡介苗接種因素納入評估；或洽地方衛生局(所)協助轉介醫院小兒科診治(或請小兒科醫師進行會診)，以便進一步釐清病因，經過適當處置後，絕大多數均可康復，不會留下長期傷害。

卡介苗建議於出生24小時後及早接種，目前新生兒篩檢項目中自費進行篩檢之其中一項為嚴重複合型免疫缺乏症(SCID)，它是一種罕見先天遺傳疾病，據統計資料顯示每年10萬人口之發生率約為1.4例。而此類新生兒若接種卡介苗，則有感染卡介苗內之結核菌的疑慮，因此，已知罹患嚴重複合型免疫缺乏症的新生兒，不應接種卡介苗。

家長於權衡疫苗的效益和風險後，可以選擇於未知結果報告下，於出院前即接種卡介苗。倘未於住院期間完成卡介苗接種，則可於篩檢後，依報告結果進行後續作為：

一、報告異常者，不應接種卡介苗，且應指示至轉介醫院做進一步治療；

二、報告正常且未於住院期間完成卡介苗接種者，至遲應於出生滿1個月接種B型肝炎疫苗第二劑時，同時完成接種卡介苗。

惟延後接種卡介苗，可能會有感染機率升高之危險，未接種卡介苗者如果感染結核菌，會有47倍的風險得到結核性腦膜炎，所以於該段延後接種期間內，應避免讓新生兒接觸可能的結核病患者(如避免咳嗽中的親友來訪或照顧寶寶等。)

如果您需要其他卡介苗相關訊息，歡迎至衛生福利部疾病管制署全球資訊網http://www.cdc.gov.tw之傳染病介紹/結核病主題網查閱。

ឃ្នាការប្រុងប្រយ័ត្ននការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCGសម្រាប់ទារកទើបកើត

រាយពលេចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG១ទៅ២សប្តាហ៍ចំនុចចាក់ថ្នាំបង្ការនឹងប្រែជាដុំពកតូចពណ៌ក្រហមហើយនឹងប្រែជាធំបន្តិចមុដង។មានអាការៈរមាស់បន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមិនក្ដៅខ្លួន។៤ទៅ៦សប្តាហ៍នឹងក្លាយទៅជាខ្ទុះ មិនចាំបាច់លាបថ្នាំឬរុំរបួសឡើយដោយគ្រាន់តរក្សាតំបន់នោះឲ្យមានអនាម័យនិងសង្ឃឹតជាការស្រេច។ បុរសិនបីមានទឹកខ្ទុះហូរចេញអាចយកសូបដៃលែគុមានមរោគឬសំឡមែកជូតសមុអាត ជ្រលាងការចេ្រាច។ ជាមធ្យមពី ២ ទៅ ៣ខែវានឹងជាសៈស្បើយដាយខ្លួនឯងដាយបន្សល់នូវស្នាមតូចពណ៌ក្រហមនិងមួយរយៈក្រាយមកប្រែជាពណ៌សាច់។

កុមារអាយុក្រាម៥ឆ្នាំ បុរសិនបីកើតខ្ទុះ និងហើមជាំតាមផ្នែកែខ្លះនែាងកាយ ដលែសង្ស័យថាជាបុរតិកមុមដាយសារការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG ត្រូវរំលឹកឲ្យវជ្ជបណ្ឌិតយកកតុដាចាក់ថ្នាំបង្ការដាក់បញ្ចូលក្នុងការិភាគ ឬ ទំនាក់ទំនងមន្ទីរ (មណ្ឌលសុខាភិបាលបុរចាំតំបន់ ជួយធ្វើការបញ្ជូនផ្នលាសំបុដូរទៅពុយាបាលនាផ្នែកែកុមារ (ឬអញ្ជើញវជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកែកុមារធ្វើការពិភាកុសាជម្ងឺ) ដើមបីវកែញកែឲ្យដឹងពីមូលហតេុនដែមុងឺ។ ឆ្លងកាត់ការពុយាបាលគ្រឹមត្រូវ មានកុមារភាគចុរនបំផុតអាចជាសៈសុបើយ ដាយមិនបន្សល់គ្រៈថ្នាក់រយៈពលេវែង។

ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG សូមបុរញ្ជាប់រូសរាន់ចាក់ឲ្យហានឆាប់បំផុតក្រាយពលេកើតរយៈពល២៤ម៉ាង។ បច្ចុប្បននកុនុងការពិនិត្យទារកទើបកើត មានការពិនិត្យដាយគិតថ្លមួយសុដីអំពីជម្ងឺកង្វះបុរព័ន្ធស៊ាំបុរភេទសុាំញាំធ្ងង់ធ្ងរ (SCID) វាគឺជាជម្ងឺតពូជពីកំណើតដ៏កម្រមាន ដាយយាងទៅតាមទិននន័យសុិតិហានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានអត្រាកើតបុរមាណ ១.៤ករណី កុនុងចំណាម១០មឺននាក់។ ទារកទើបកើតក្រុមនេះបុរសិនបីចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG គេព្យួរយហារមុខុលាចឆ្លងមរោគរបេងពីថ្នាំបង្ការនេះ ហតេុដូចនេះ ទារកទើបកើតដលែមានជម្ងឺកង្វះបុរព័ន្ធស៊ាំបុរភេទសុាំញាំធ្ងង់ធ្ងរ មិនត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG ឡើយ។

អាណាពុយាហាលគបុបីធ្វើការថ្លឹងថ្លលែងអំពីបុរសិទ្ធិភាព និងហានិភ័យនថ្នាំបង្ការ ដាយអាចសមុរេចចិត្តទទួលចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCGមុនពលេចញពីមន្ទីរពទ្យនាកុរាមសុថានភាពមិនដឹងអំពីលទ្ធផលរបាយការណ៍។ បុរសិនបីកុនុងកំឡុងពលេសមុាកនាមនុទីរពទ្យមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG នាៈអាចធ្វើការសមុរេចចិត្តដាយយាងទៅតាមលទ្ធផលរបាយការណ៍កុរាយពលេធ្វើការពិនិត្យរួចៈ

១. ទារកដលែមានលទ្ធផលមិនបុរក្រតើ មិនត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG និងត្រូវធ្វើការពុយាហាលបនុដទៀតនាមនុទីរពទ្យដលែបានកំណត់។

២. ទារកដលែមានលទ្ធផលបុរក្រតើ និងមិនទាន់បានចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG កុនុងកំឡុងពលេសមុាកនាមនុទីរពទ្យ ត្រូវទទួលចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរលាកថ្លើមបុរភេទBលើកទី២ និងថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG ជាមួយគ្នា យ៉ាងយូរបំផុត១ខែក្រាយពលេកើត។

ខ្លាចក្រែងការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG អាចមានគ្រៈថ្នាក់នការកើនឡើងនៃការឆ្លង។ បុរសិនបីឆ្លងជម្ងឺរបេងដាយមិនទាន់បានចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCG នឹងបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យ ៤៧ដងនការកើតជម្ងឺរបេងសុរាមខ្លួរក្បាល។ ហតេុដូចនេះកុនុងកំឡុងពលេនការពន្យាចាក់ថ្នាំបង្ការ ត្រូវជ្រាសាងកុំឲ្យទារកទៅជិតអ្នកដលែអាចមានជម្ងឺរបេង (ដូចជា ជ្រាសាងការមកសួរសុខទុក្ខរបស់សាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិ ឬអ្នកមីលថទៅទារកដលែកំពុងក្អក)។

បុរសិនបីអ្នកចង់ដឹងពីពតិមានអំពីថ្នាំបង្ការជម្ងឺរបេងBCGដទៃទៀត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពតិមានទូទាំងពិភពលាក នទើសុនាក់ការគ្រប់គ្រងជម្ងឺ នកែៃរសួងសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថម្ភhttp://www.cdc.gov.tw ឧទសេនាមអំពីជម្ងឺឆ្លងទំព័របុរធានបទសុដីអំពីជម្ងឺរបេង

最貼心的哺育方式

母乳是最適合嬰兒的食品，它含有多種好處，可以增進兒童的智力發展，降低腹瀉及肺炎的感染率，減少過敏發生及嚴重度，它不需花費，乾淨而方便。哺育母乳可使媽媽的子宮早日恢復至正常大小，也可更快的恢復到孕前體重、減少乳癌、卵巢癌的發生率等，增強女性自信能力，並促進和寶寶間親密關係。

從懷孕開始就要有哺餵母乳的心理準備，一旦感覺到胎動之後，就應開始進行乳房及乳頭的保養工作。

母乳哺育Q&A

◎ 準媽媽要何時準備母乳哺育？哺育要多久？

準媽媽從懷孕開始，就可以對於母乳哺育及相關的嬰幼兒營養有所認識，在懷孕二個月後便可以開始計畫收集哺乳相關資料。世界衛生組織建議寶寶生下的頭六月可以純餵母乳，不必餵食水和其他任何食物，六個月後開始添加適當的副食品，並持續哺乳到兩歲或兩歲以上。

◎ 媽媽什麼時候會有奶水？

媽媽懷孕20週左右，乳腺會開始製造-初乳。懷孕過程順利時，每個媽媽產後就有奶水，生產後第1、2天分泌的初乳，量不多但是濃稠而且營養。

◎ 剛出生的寶寶胃容量有多大？

一天大的新生兒胃容量只有5cc(像龍眼大小)、第4至5天約25cc(像荔枝大小)，7天大的時候也不過50cc左右(像桃子大小)。足月健康新生兒的胃容量不大，所以需求量也不大，正好配合初乳量。只要15公克的初乳就可以滿足1至2天的營養。

◎ 媽媽產後及早和寶寶肌膚接觸有什麼好處？

產後儘快讓母子有肌膚直接接觸，讓寶寶感受媽媽的溫暖並嘗試尋找媽媽的乳頭。一方面享受親情，一方面刺激泌乳激素，讓奶水及早開始分泌。

កុបូនដលៃមានភាពសុនិតសុនាលជាងគនៃការបំបៅដោះ

ការបំបៅដោះរបស់មុតាយគឺជាចំនីអាហារដលៃសាកសមជាងគសេំរាប់ទារក វាមានផលបុរយោជន៍លអៗជាច្រនៃ អាចបងុ្កីនភាពឆ្លាត់រនៃិងភាពលូតលាស់ដល់កុមារ កាត់បនុ្ថយភាពរាគនិងអតុ្រភាគរយនកៃារឆ្លងជំងឺរលាកសួត កាត់បនុ្ថយបញ្ហាអាឡែកសីនិងភាពធុងន់ធុង រ វាមិនចាំបាច់ចំណាយបុរាក់ អានាម័យនិងងាយសួ្រល ក៏អាចជួយធ្រីអាយសុ្រតឹតុឡ្រប់ទៅកាន់ទំងន់មុនពលៃកីតវិញ កាត់បនុ្ថយមហារីកដោះ អាតុ្រភាគរយនដៃំងឹមហារីពង ជាដីមបងុ្កីនអាយសុ្តុីមានជំនឿចិតុ្ត និងធ្រីអាយកូនមានភាពសុនិតសុនាលជាមួយកូនៗ។

គូ្រធ្រីការចាប់ផ្តើមទំលាប់នកៃារបំបៅដោះនៅពលៃពាពោះ នៅពលៃដលៃមានអារម្មណ៍ថាមានកូនកុនុងផ្ទៃកំពុងធ្រីចលនា គូ្រចាប់ផ្តើមធ្រីការថៃទាំមកុបាលដោះនិងដោះអាយហានលអ។

ការបំបៅដោះQ&A

១.តីសុ្រតីទុកមកុលាយជាមុតាយគួ្រធ្រីការបំបៅដោះកូននៅពលៃណា? ការបំបៅដោះគួ្រវការរយៈពលៃប៉ុនុ្មាន?

រៀមមាតាចាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមមានគិតអាចសុគាល់ពីការបំបៅដោះកូននិងអាហារូបតុ្ថមុតទារក បនុ្ទាប់ពីមានគិតពីរខអែាចចាប់ផ្តើមផនៃការនិងបុរមូលឯកសារដលៃពាក់ព័នុ្ធ។ អងុ្គការសុខភាពពិភពលាកហានផ្តល់ដំបូនុ្មានថាទារកទីបកីតមកដល់អាយុ៦ខដៃំបូងអាចបំបៅទឹកដោះមុដាយសុទ្ធ មិនហាច់ឲុ្យបៅទឹកនិងអាហារផុសងេៗ ។ អាយុកុរាយ៦ខអែាចចាប់ផ្តើមបនុ្ថមមៃអាហារដលៃសកុ្តិសម ពុ្រមទាំងបនុ្តបំបៅទឹកដោះមុដាយរហូតដល់អាយុ២ឆ្នាំឬលីសពី២ឆ្នាំ

២.សុ្រតីជាមុតាយមានទឹកដោះនៅពលៃណា?

មុតាយដលៃពាពោះរយៈ២០សបុតាហ៍ ទឹកដោះហានចាប់ផ្តើមកកីតជាទឹកដោះដំបូង។នៅពលៃដលៃកំឡុងពលៃមានផ្ទៃពោះមានភាពលូន គុ្រប់សុ្រតីជាមុតាយដលៃសំរាល់កូនរួមនិងមានទឹកដោះ ទឹកដោះដលៃមានកុរាយពលៃកីតហានពីថ្ងៃទៅ១និងទី២ មានចំណុះតិចប៉ុនុ្តខៃាប់និងមានជីជាតិ។

៣.កុរពៈទារកទីបកីតគីមានចំណុះប៉ុនុ្មាន?

ចំណុះនកៃុរពៈរបស់ទារកដលៃទីបកីតហាន១ថ្ងៃមានតុ្រឹម5cc(បុរៀបហានទៅទំហំផ្លមៃាន) ថ្ងៃទី៤ដល់ថ្ងៃទី៥បុរហារ25cc(បុរៀបហានទៅនិងផ្លកៃគូលនេ) ពលៃហានរយៈ៧ថ្ងៃកៃ៏ចំណុះហានតុ្រឹមត50cc ប៉ុនុ្តនាៈ(បុរៀបហានទៅនិងផ្លកៃប៉សេ)។ចំណុះនទៃារកទីបកីតមិនធំទ ដូចនេះចំណុះនតៃមុ្រវការក៏មិនច្រនដរ វាសំលុមមជាមួយនិងទឹកដោះដំបូង។គុរាន់តទឹកដោះ១៥កុរាម ប៉ុនុ្តនាៈអាចបំពញតមុ្រវការជីវិជាតិហានគុ្រប់គុរាន់ពី១ទៅ២ថ្ងៃ។

៤.ការឆាប់ដាក់អាយមុតាយនិងទារកប៉ៈសាច់គុនារវាងមុតាយនិងទារកតីមានបុរយោជន៍អ្រីខ្លៈ?

រយពលៃកីតសូមអាយមុតាយនិងទារកប៉ៈជាមួយមុតាយអាយហានភុ្លាមៗ ដីមុបីអាយកូនៗទទួលហាននូវភាពកក់កុតាពីមុតាយនិងចរៃសុវងែរកកុបាលដោះរបស់មុតាយ។ មួយផ្នុនកៃអាចទទួលហាននូវភាពសុនិតសុនាល មួយផ្នុនកៃទៀតអាចភុ្ញចកំណរកកីតនទៃឹកដោះ ធ្រីអាយឆាប់មានទឹកដោះ។

最貼心的哺育方式

◎ 媽媽產後住院期間和寶寶同室有什麼好處？

讓寶寶與媽媽親子同室，便於隨時應寶寶需求哺餵，同時也減少待在嬰兒室發生集體院內感染的風險，提供媽媽與醫護人員共同觀察寶寶的機會，以及早發現寶寶的問題。

◎ 如何促進奶水分泌？

1. 分娩後儘早哺餵母乳。
2. 新生兒出生後即刻吸吮母乳，並經常的餵奶，不另添加牛奶，不以奶瓶、奶嘴及安撫奶嘴干擾寶寶的學習。
3. 勤於餵奶-寶寶餓了就可餵奶，餵得愈多，奶量會愈多。
4. 除餵母乳外，避免給寶寶配方奶及其他飲料與奶嘴，否則寶寶可能不易有餓的感覺而減少吃奶的頻率，奶量自然會減少。
5. 當寶寶不在身邊時，可用手或擠奶器將奶水擠出，並將奶水冰存起來留給寶寶吃。
6. 正確的吸吮方式及餵奶姿勢。
7. 肚子餓就吃，口渴就喝。
8. 充足的睡眠及愉悅的心情。

◎ 奶脹的預防與處理？

1. 多讓寶寶吸吮。
2. 按摩乳暈擠出一些奶水，使乳暈柔軟後再讓嬰兒吸吮，若有硬塊，則熱敷後再讓嬰兒吸。
3. 有時讓嬰兒變換姿勢吸奶。
4. 媽媽穿戴合適的胸罩。

◎ 預防乳腺炎

乳房內之奶水流出不良形成乳房腫脹，或是輸乳管阻塞後，會發展成乳腺炎。預防乳腺炎的方法：

1. 哺乳時要讓寶寶正確含住乳房，依寶寶的需求哺乳(夜間也要哺乳)，並時常改變哺乳姿勢；
2. 避免4小時以上未哺乳；
3. 避免經常使用安撫奶嘴，以免嬰兒吸吮乳房的時間較少；
4. 哺乳時避免手指用力壓到乳暈或乳房，而阻塞奶水的流出；
5. 避免太緊的胸罩或是其他壓到乳房造成的壓力。

កូបូនបំបៅដោះដែលមានភាពសុនិតសុនាល

Q&A

៦.តើកុំឲ្យពេលកើតកូនគេដោក់សុតុរីជាមួតាយនិងកូននៅបុរទបជាមួយគុនាតើមានបុរយោជន៍អ្វីខុលៈ?

អាយស្រតីជាមួតាយនិងទារកនៅបន្ទុបជាមួយគុនា ដីមុបីធ្វើការបំពញសចក្តីតូរ្វការរបស់កូនកុនុងការបំបៅដោៈ សុរបពលេនាៈដែលក៏អាចកាត់បន្ទុយការឆ្លងមរោគពីការរងចាំទារកផងដរែ វាផ្តល់អាយមួតាយនិងកុរុមគួរូពទ្យមានឧកាសមីលថទារកជាមួយគុនា ដីមុបីរកឃើញបញហាដលែកើតមានលឿទារកហានឆាប់។

៦.តីធ្វើដូចមុតចេអាចធ្វើអាយមានការកកើតនទឹកដោៈ?

១. ផ្តល់ការបំបៅកូរាយពលេទារកធ្វើការបត់ជីងរួច។
២. អាយកូនដលែកើតមកធ្វើការហេៈដោៈតុលាម។ និងធ្វើការបំបៅដោៈមុតាយអាយហានញឹកញាប់ មិនធ្វើការបំបៅទឹកដោៈគារីទឹកដោៈកំពង់ កុហាលបៀមជាជីមដលែធ្វើអាយរំខានការរៀនបំដោៈរបស់ទារក។
៣. ធ្វើការបំបៅអាយហានចុរែន ពលេដលែកូនឈ្លៀនតុលាមធ្វើការបំបៅតុលាម បំបៅកាន់តចុែរែនទឹកដោៈកាន់តចុែរែន។
៤. កុវាពីការបំបៅទឹកដោៈ គួជាងវាងការលាយសារជាតិទឹកដោៈផ្សងេៗរឺផសេផ្ទុចកេផ្សងេៗនិងកុហាលដោៈជាជីម បីមិនដូចឆ្នរៈទទោរកនិងមិនងាយនិងឈ្លៀននោៈធ្វើអាយមានការតាក់បន្ទុយការទទូលទានទឹកដោៈ ធ្វើអាយចំនួនទឹកដោៈថយចុះដាយឯងៗ។
៥. នាពលេដលែកូនៗមិននៅកុហាលខុលួន អាចយកដពីបុរដាប់ចុរហាច់ទឹកដោៈដីមុបីធ្វើការចុរហាត់ទឹកដោៈចញេមក ហើយយកទៅខុលៈសទេកុខអាយកូនហ៊ៅ។
៦. វិធីហ៊ៅនិងការបំបៅតូរែមតូរ្វ
៧. ពលេឈ្លៀនតូរ្វទទូលទាន ពលេសុរកែទឹកតូរ្វផឹក។
៨. គងេអាយហានគួរបំនិងរកុសាអារមុមណ៏រីករាយ។

៧.ការការពារដោៈកុំអាយហ៊ឹមនិងវិធីដោៈសុរាយ?

១. អាយទារកហ៊ៅអាយហានចុរែន។
២. ធ្វើចលនាដោៈនិងចុរហាច់ទឹកដោៈចញេបន្តិច ធ្វើអាយដោៈមានសភាពទន់ហ៊ឹយទីបអាយទារកហ៊ៅ បុរសិនបីមានភាពរឹងកកុនុងដោៈ សូមធ្វើការកំដៅហ៊ឹយទីបអាយទារកហ៊ៅ។
៣. ពលេខុលៈអាយទារកផ្តលាស់ផ្តួលរបៀបកុនុងការហ៊ៅ។
៤. មុតាយគួពាក់អាវកុនុងដលែសំសុរប។

៧.ការបង្ការការរលាកដោៈ

ទឹកដោៈហូរមិនលុអរអាចធ្វើអាយមានអាការៈហ៊ឹមដោៈ រឺសុទៈបំពង់ទឹកដោៈ អាចធ្វើអាយមានជំងឺរលាក់ដោៈ។ការបង្ការជំងឺរលាក់ដោៈ

១. នាពលេធ្វើការបំបៅសូមអាយទារកបៀមកុហាលដោៈអាយហានជាប់ ផ្តល់ការបំបៅតាមតមូរ្វការរបស់ទារក(ពលេយប់ក៏តូរ្វបំបៅដូចគុនា)និងឧសារកុនុងការផ្តលាស់បូតូកាយវិការបំបៅ
២. ជាស់វាងការមិនបំបៅដោៈអាយទារករហូតដល់៤ម៉ាង
៣. ជាស់វាងការបុរីបុរាស់កុហាលបៀមញឹកញាប់ ដីមុបីជាស់វាងការកាត់បន្ទុយការហ៊ៅដោៈ។
៤. ពលេធ្វើការបំបៅសូមជាស់វាងធ្វើការចុរហាច់ដោៈខុលាំងៗហ៊ឹយនិងការសុទៈទឹកដោៈ
៥. ជាស់វាងអារកុនុងដលែមានសភាពតឹងពកេរីអ្វីផ្សងេដលែផ្តល់សមុពាគដល់ដីមទុរង់។

最貼心的哺育方式

◎我如何知道寶寶獲得足夠的奶水？

1. 寶寶飢餓暗示：頻繁的吸吮動作、吐舌頭、舔嘴唇、吸手指，頭轉來轉去或蠕動等主動尋找乳頭的動作。
2. 寶寶飽食暗示：吃飽後很滿足入睡，全身放鬆減少吸吮，推開或遠離乳房。獲得奶水的足夠表現：觀察寶寶的大小便次數及體重變化。

◎ 如何正確哺餵母乳？

注意事項

1. 餵食前應先洗淨雙手。
2. 舒適姿勢:可採取不同姿勢，媽媽須要心情愉快，有益於奶水排出。
3. 媽媽與寶寶必須緊密相貼：抱寶寶的姿勢，無論抱在哪一邊，寶寶的腹部與媽媽的腹部應相貼，頭與雙肩朝向乳房，上嘴唇對著乳頭，頭部不被扭轉或彎曲，頭與身體成一直線。
4. 寶寶正確含住乳房：寶寶口中含入乳暈及下面組織兩大部分，嘴張得很大，下嘴唇外翻，下巴有接觸到乳房，慢而深地吸吮，可以看見寶寶有吞嚥的動作。
5. 哺乳時媽媽手的正確姿勢：以C型握法，大拇指在上，其他手指在下支撐乳房，不要碰到乳暈。



វិធីបំបៅដោះដ៏ល្អឥតល្អន់

តើខ្ញុំបានដឹងយ៉ាងដូចមុតចេថាកូនបៅឆ្អែតហើយឬនូវ?

១. សញ្ញាបុរាប់ថាទារកឃ្លានៈសកម្មភាពជញ្ជក់ញឹកញាប់ លានអណ្តាត លិតបបូរមាត់ បៀមមុរាមដៃ ងាកកុហាលចុះឡើងឬចលនា កម្មភាពសម្លឹងរកកុហាលដោះដោយសុវិយបុរវត្តិ។
២. នាពលដលៃទារកបៅឆ្អែត-កុរាយពលេបៅឆ្អែតទារកនឹងគងេលក់ស្បូល,ហើយមិនស្បូវជញ្ជក់មុរាមដៃ,រុញឬឆ្ងាយពីដោះ។បំបៅដោះឆ្អែត-មីលទៅតាមការបត់ជីងតូចនិងជីងធំប៉ុនុមានដងឬ មីលទៅតាមការបុរប្បែរលនទៃងន់។

តើបំបៅដោះដោយតុរឹមតូរវយ៉ាងដូចមុតចេ?
បុរការគួរយកចិត្តទុក៏ដាក

១. លាងដអៃយសុអាតមុនពលេបំបៅដោះ។
២. របៀបដលៃស្បូលខុលូន-អាចមានរបៀបចុរីនយ៉ាង,មុតាយតូរវមានអារមុមណ៍រីករាយ,នឹងមានទឹក ដោះចុរីន។
៣. មុតាយនិងកូនតូរវពរកូនអាយជិតខុលូន-របៀបពរកូនមិនថាខាងណាទ,កុហាលពោះកូននិងកុ ហាលពោះមុតាយភ្ជាប់នឹងគុនា,កុហាលនឹងសុមាបទៅកាន់ដោះ,បបូរមាត់ខាងលីនាកុហាលដោះ, មិនបរែក,កុហាលនឹងករសុមីរគុនា។
៤. កូនបៀមកុហាលដោះតុរឹមតូរវ-មាត់កូនបៀមកុហាលដោះនិងកុបកែហាលដោះ,ហារមាត់អាយធំ,បបូរមា ត់ខាងកុរាមតូរលាប់,ចង្កាប៉ះនឹងដោះ,ប៊ីតយឺតៗហើយជុរា,អាចមីលឃើញកូនកំពង់លបេ។
៥. របៀបដាក់ដដៃលៃតុរឹមតូរវនៅពលេបំបៅដោះ-ពរកូនរបៀបC,មដេនៅខាងលី,មុរាមដជែ្ញសងេទៀតទុរ កុរាមដោះ,កុប៉ះកុហាលដោះ។

最貼心的哺育方式

舒適哺餵姿勢如圖示：

◎坐姿(搖籃式)

◎斜倚

◎坐姿(橄欖球式)

◎側躺

វិធីបំបៅដោះដ៏ល្អឥតល្អន់

របៀបបំបៅដោះដូចខ្នងរូប

• របៀបអង្គុយ (របៀបអង្សឹង)

• អៀងម្ខាង

• របៀបអង្គុយ (របៀបហាលទាត់)

• របៀបមុខង



最貼心的哺育方式

職業婦女也可輕鬆哺餵母乳喔！

職業婦女在坐月子期間哺餵母乳的方法與一般婦女無異。回到工作崗位後，必須把寶寶託給別人時，只要事先將母乳擠出收集冷藏或冷凍，交由家人或保母回溫餵寶寶，返家再繼續親自哺餵母乳。

而且依性別工作平等法及勞動基準法規定：「子女未滿一歲須受僱者親自哺乳者，除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺乳時間二次，每次以三十分鐘為度，前項哺乳時間，視為工作時間。」

◎ 職場哺乳的小撇步：

穿著適合哺(集)乳的衣服；選擇適當的集奶法(可用手擠法或電動吸奶器)，如果不太會用手擠奶，那就找個適合於自己的擠奶器，既可兼顧擠奶又可挪出雙手做事，一點也不耽擱工作，而且隱密性也相當足夠。如果你的工作時間不是很規律，那最好自己能固定時間來擠奶。

◎ 母乳之儲存及回溫：

1. 擠出來的奶水可放於25度以下的室溫中四至六小時，放於冰箱冷藏室(0-4度)可保存五至八天，若冷凍庫則可存放三個月。
2. 奶水解凍，先用冷水沖涼或置於冰箱冷藏室內，餵食時予以溫熱達室溫，勿用微波爐溫奶或直接在火上加熱，以免破壞營養成分。
3. 母奶經過冰凍便分層而不均勻，需輕輕搖晃，使脂肪混合均勻，並放在裝溫熱水的容器下，邊轉動邊溫熱，讓奶水均勻受熱，以不超過六十度的熱水為佳。
4. 解凍後再加熱之奶水可放室溫四小時，但不能再冷凍，故每次解凍量不宜太多。
5. 解凍加熱後餵剩下的奶水要丟棄，不可再冰藏使用。
6. 母乳和其他奶品一樣容易滋生細菌，所以使用過的奶瓶、奶嘴、吸奶器，都需經煮沸消毒，並保持清潔，選擇適當的集奶法。

វិធីបំបៅដោះដ៏ល្អិតល្អន់

ស្ត្រីដែលមានរបរក៏អាចបំបៅដោះបានដោយងាយស្រួល!

ស្ត្រីដែលមានរបរ,វិធីបំបៅដោះក្នុងអំលុងពេលកូនខ្ចីមិនខុសប្លែកពីស្ត្រីទូទៅទេ។ក្រោយពេលត្រលប់ទៅធ្វើការ,ត្រូវអោយគជ្ជួយមើលកូន,គ្រាន់តច្រៃហាច់ទឹកដោះខ្លាសក្នេុងទូរទឹកកក់,ទុកអោយគបេំបៅកូន,ហើយបំបៅដោះដោយខ្លួនឯងនៅពេលត្រលប់ទៅផ្ទះ។

ហើយយោងទៅតាមមាត្រាសិទ្ធស្មើរគ្នារវាងភេទទាំង២និងច្បាប់ពលកម្ម(បុគ្គលិកដែលមានកូនមានអាយុរមិនគ្រប់១ឆ្នាំ,ក្រៅពីពេលសំរាក,និយោជិកត្រូវផ្តល់ពេលបំបៅដោះ២ដង,ម្តង៣០នាទី,រលោប្រការខាងមុខ,ជាពេលរលោធ្វើការ។)

វិធីបំបៅដោះនៅពេលធ្វើការ

ស្លៀកពាក់សំលាកបំពាក់ដែលងាយស្រួលក្នុងការបំបៅដោះ,ត្រូវជ្រើសរើសវិធីបំបៅដោះដលៃសមស្រប(អាចយកដច្រៃហាច់ឬប្រើប្រដាប់ច្របាច់ដោះ)ប្រសិនបីមិនចេះប្រើដច្រៃហាច់,អាចប្រើប្រដាប់ច្របាច់ទឹកដោះដលៃសមស្រប,នឹងអាចច្របាច់ទឹកដោះហើយដអោចធ្វើការផ្សេងទៀត,មិនរំខានដល់ការងារទេ,ហើយមានសុភាពសំងាត់ទៀត។ប្រសិនបីពេលរលោការងាររបស់អ្នកមិនទាងទាត់,យកល្អគួរកំណត់ពេលរលោច្របាច់ទឹកដោះ។

ការផ្ទុកទឹកដោះនិងកំដៅ

១. ទឹកដោះដលៃច្របាច់ចញ្ចេមកអាចទុកនៅក្រោមកំដៅ25°Cពី៦-៨ម៉ោង,អាចទុកក្នុងទូរទឹកកក (0-4°C)បាន៥-៨ថ្ងៃ,ប្រសិនបីខ្លាសអោចរក្សាទុកបាន៣-៤ខែ។
២. យកទឹកដោះចញ្ចេពីទូរខ្លាសរ,យកទឹកឆ្អុងឬទុកក្នុងទូរទឹកកក់,កំដៅវានៅពេលបំបៅកូន,កុំប្រើចង្ក្រានអាគិស្សនីឬកំដៅដោយចង្ក្រាន,ដើម្បីកុំអោយបំផ្លាញជីវជាតិ។
៣. ទឹកដោះឆ្លងកាត់ការរំលាយទឹកកក់នឹងមានព័ណមិនចូលគ្នា,ត្រូវក្រវីថ្នមៗដើម្បីអោយវាស្មើគ្នា,ហើយដាក់នៅលើឆ្នាំងដលៃមានទឹកក្តៅ,ដើម្បីកំដៅទឹកដោះ,ទឹកដលៃមានកំដៅមិនលើសពី60°C។
៤. ទឹកដោះដលៃកម្ដៅក្រោយពេលរំលាយពីទូកកអាចទុកបាន៤ម៉ោងក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតាតមិនអាចដាក់ចូលក្នុងទូកកវិញ ហើយរាល់ពេលមិនគួររំលាយចំណុះច្រើនពកេទេ។
៥. ក្រោយពេលរំលាយទឹកកក់និងកំដៅ,ត្រូវចាកចាលទឹកដោះដលៃនៅសល់,មិនអាចខ្លាសវិញទេ។
៦. ទឹកដោះម្តាយនិងទឹកដោះផ្សេងទៀតអាចងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតមរោគដូចគ្នា,ដូច្នេះក្រោយពេលប្រើប្រាស់ដបទឹកដោះគោ,ប្រដាប់ទឹកដោះផ្សេងៗ,ត្រូវប្រើដាំក្នុងកំដៅដ៏ក្តៅដើម្បីកំចាត់មរោគ,ហើយរក្សាអោយមានអនាម័យ,ជ្រើសរើសវិធីសន្សំទឹកដោះដ៏ត្រឹមត្រូវ។

最貼心的哺育方式

母乳哺育支持系統相關資源

◎選擇母嬰親善醫療院所(參閱204、206、208、210頁)

衛生福利部國民健康署為了推廣母乳哺育，實施母嬰親善醫療院所認證，提供支持的哺乳環境。準媽媽可從母嬰親善醫療院所提供的服務，接受到下列幾點的相關訊息：

1. 產後早期與嬰兒直接肌膚接觸的意義及重要性。
2. 依嬰兒需要餵食的意義及重要性。
3. 使用奶瓶餵食或奶嘴對母乳哺餵的不良影響。
4. 親子同室的意義及重要性。
5. 孕婦到醫院檢查時向醫療人員索取有關哺餵母乳的相關資料，事先和醫師、護理人員溝通，討論自己對哺乳的問題。

◎免付費諮詢專線：0800-870870

◎網路資源

單位名稱	網址或電話
衛生福利部國民健康署　孕產婦關懷網站	http://mammy.hpa.gov.tw
中華民國寶貝花園母乳推廣協會	http://www.babysgarden.org
臺灣母乳協會	http://www.breastfeeding.org.tw

វិធីបំបៅដោះដ៏ល្អឥតល្អន់

ធនធានទាក់ទងនឹងបុរព័ន្ធធនការគាំទ្រការបំបៅទឹកដោះម្តាយ

រីសេរីសមនុទីពទ្យថវៃកុសាម្តាយនិងកូន(សូមអានទំព័រទី២០៥,២០៦,២០៨,២១១)

កុរសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពបុរជាពលរដ្ឋបីមុបីជុំរុញការបំបៅដោះ,ផ្តល់ការផ្តល់សិទ្ធទៅកាន់មនុទីពទ្យថវៃកុសាម្តាយនិងទារក,ផ្តល់នូរបីសុថានគាំទ្រការបំបៅដោះ។ម្តាយអាចអាចទទួលសវោកម្មមដលៃមនុទីថវៃកុសាម្តាយនិងទារក,ទទួលដំណឹងទាក់ទងប៉ុន្មានចំនុចដូចខាងក្រាម

១. កុរាយពលេសំរាលកូននិងសារៈសំខាន់នកៅរប៉ៈសុទាបសុបកៃទារក។
២. យាងទៅតាមអត្ថន័យនិងសារៈសំខាន់នកៅរបំបៅទារក។
៣. បុរីបុរាស់ដបទឹកដោះគាបំបៅឬបុរីកុបាលដោះជ័រប៉ៈពាល់មិនល្អចំពោះការបំបៅដោះ។
៤. អត្ថន័យនិងសារៈសំខាន់នម្ញែតាយកុនុងបនុទប់ជាមួយទារក។
៥. នាពលេសុរតីមានផុទពៃាៈមកកាន់មនុទីពទ្យតួរតពិនិតួយតួរសុំងកសារទាក់ទងនឹងការបំបៅដោះពីគួរពទ្យ,ពិគារៈជាមួយគួរពទ្យអ្នកធ្វីការកុនុងមនុទីពទ្យជាមុន,ពិគារៈអំពីបញ្ហាបំបៅដោះ។

បណ្តាញសាកសួរដោយឯតគិតថ្លៃ 0800-870870

ធនធានអីនថឺនតេ

ឈ្មោះទីកនុលងៃ	អីនថឺនតេឬទូរស័ព្ទ
កុរសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពបុរជាពលរដ្ឋ គរហទំព័រយកចិត្តទុកដាក់ស្តួដីមានគតិ	http://mammy.hpa.gov.tw
សមាគមន៍ជំរុញការបំបៅដោះប៉ាពហ៊ៃយាននតៃវ៉ាន់	http://www.babysgarden.org
សមាគមន៍ទឹកដោះម្តាយតវ៉ាន់	http://www.breastfeeding.org.tw

最貼心的哺育方式

◎母乳庫資源

早產兒之母親可能因奶水分泌不足，而無法哺育母乳，故於此過渡時期，須利用捐贈母乳庫之母乳，待母親奶水分泌足夠時，即可改以母親親自哺餵之方式為之。對於早產兒，喝母乳相對於喝配方奶，能夠有效降低早產兒之壞死性腸炎。

衛生福利部國民健康署鼓勵目前正在哺乳，而且奶水充足的婦女可發揮愛心，將過剩的母乳捐贈到母乳庫！母乳庫將進行檢驗、消毒等安全處理後，依醫師處方簽提供給早產兒、過敏、特殊需要之病童等。捐乳專線如下：

＊臺北市立聯合醫院和平婦幼院區

母乳庫捐乳專線：02-23581349或 02-23916471分機2051

(服務時間：上午8點至12點，下午1點至5點)

(若忙線中或無人接聽，請稍後再撥)

＊衛生福利部臺中醫院母乳庫衛星站

母乳庫捐乳專線：04-22294411分機2579

(服務時間：上午8點至12點，下午1點半至5點半)

(若忙線中或無人接聽，請稍後再撥)

◎「母乳一指通」APP哺乳資訊隨身帶著走！

為提供友善的哺乳環境，讓媽媽們哺乳更便利，衛生福利部國民健康署製作「母乳一指通」APP，功能有「地圖搜尋」可以快速地搜尋到臨近的「母嬰親善醫療院所」或「公共哺集乳室」，且可一指接通諮詢電話，提供媽媽母乳聚會相關資訊。

IOS系統(QRcode)　　Android系統(QRcode)

Pad　Phone　Pad　Phone

វិធីបំបៅដោះដ៏លំអឹតលុអន់

ធនធានឃ្លាំងដង្កត់ទឹកដោះមុតាយ

មុតាយរបស់កូនមិនគួរប់ខប្រែហាលែជាមានទឹកដោះមិនគួរប់គ្រាន់,ហើយមិនអាចបំបៅដោះហាន,ដូចនេះកុនុងអំលុងពលេនោះ,តួរវបុរីបុរាស់ទឹកដោះកុនុងឃ្លាំងទឹកដោះដលែគបេរិចុចាក,នាពលេមុតាយមានទឹកដោះគួរប់គ្រាន់,អាចបំបៅដោះដាយខ្លួនឯង។ចំពោះកូនមិនគួរប់ខ,ែការបៅដោះមុតាយលុអជាងបៅទឹកដោះគា,អាចកាត់បន្ថយការមានជំងឺពោះវៀននកៃូនមិនគួរប់ខ។ កុរសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពបុរជាពលរដ្ឋបំពង់ផ្ទុកការលើកទឹកចិតបំបៅដោះ,ហើយសុតិ្តដែលមានទឹកដោះគួរប់គ្រាន់អាចបរិចុចាកទឹកដោះដល់ឃ្លាំងទឹកដោះមុតាយ!ឃ្លាំងទឹកដោះមុតាយនឹងធ្វើការតួរួតពិនិតុយ,កំចាត់មេរគ។ល។យោងទៅតាមការពុយាបាលផ្តល់ទៅដល់កូនមិនគួរប់ខ,ទោរកដលែមានជំងឺពិសសេ។ល។បណ្តាញបរិចុចាកទឹកដោះ៖

ទីកុរុងតបែសហាមនុទីរពទេ្យមនុទីរពទេ្យសុរុកហ៊ីតឹងមាតានិងកុមារ

បណ្តាញបរិចុចាកទឹកដោះនឃ្លែាំងទឹកដោះ៖02-23581349/ 02-23916471 #2051
(វរលោសងាកមុម-ពុរឹកម៉ាង8ដល់ម៉ាង12,រសៀលម៉ាង1ដល់ម៉ាង5)
(បុរសិនបីទូរស័ពុទកំពុងជាប់រវល់ ឬគុមានការឆុលើយតប សូមហៅមុដងទៀតនាពលេកុរាយ)

ទីឃ្លាំងទឹកដោះមុតាយនមៃនុទីពទេ្យថថ្ងៃងមនុទីសុខាភិបាល

បណ្តាញបិចុចាកទឹកដោះនឃ្លែាំងទឹកដោះ04-22294411#2579
(ពលេវរលោសងាកមុម-ពុរឹកម៉ាង8កនុលៈដល់12,រសៀលម៉ាង1កនុលៈដល់ម៉ាង5កនុលៈ)
(បុរសិនបីទូរស័ពុទកំពុងជាប់រវល់ ឬគុមានការឆុលើយតប សូមហៅមុដងទៀតនាពលេកុរាយ)

"ទឹកដោះមុដាយ តាមរយៈមុរាមដរ"មានកមុមវិធីAPP ពតិមានបំបៅដោះកូនយកតាមខ្លួននាគ្រប់ទីកនុលងែដលែអុនកទៅ!

ដីមុបីផ្តល់បរិស្ថានជាមិតុតភាពដល់ការបំបៅដោះកូន ធ្វើឲ្យមុតាយងាយស្រួលបំបៅដោះកូន កុរសួងមនុទីរសុខាភិបាលជាតិសុខុមាលភាពនិងសុខភាពបានបង្កើត"ទឹកដោះមុដាយតាមរយៈមុរាមដរ"មានកមុមវិធីAPP មានមុខងារ "សុរវែងរកផនែទី" អាចសុរវែងរកឃើញទីតាំងជិតៗ"មនុទូរពទេ្យមានសុធនុទ:ដល់មុតាយកូន"ហានយ៉ាងឆាប់រហ័សឬ"បនុទប់បំបៅដោះកូនសាធារណៈ" ហើយក៏អាចទូរស័ពុទសាកសួរ ផ្តល់ដល់មុដាយបំបៅដោះកូននូវពតិមានដលែពាក់ព័នុធ។

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ IOS (QRCode)		ប្រព័ន្ធ Android (QRCode)	
Pad	Phone	Pad	Phone

迎接寶寶的準備

一、 嬰兒用品準備

類別	項目	確認	類別	項目	確認
母乳	哺乳衣		衣	護手套1-2雙	
	哺乳胸罩			帽子	
	溢乳墊		住	嬰兒床	
	母乳收集袋			棉被	
配方奶（純餵母乳者此項不用準備）	大奶瓶6支			蚊帳	
	小奶瓶2支			音樂鈴	
	奶瓶奶嘴10個		行	嬰兒推車	
	奶瓶刷2支			安全座椅	
	消毒鍋		沐浴	浴盆1個	
	外出奶粉攜帶盒			小手巾2-3條	
	嬰兒配方奶粉			大浴巾2-3條	
衣	內衣4-6件			嬰兒香皂	
	長袍或和服4-6件			嬰兒洗髮精	
	包巾			嬰兒油或凡士林	
	圍兜4-5條			棉花棒	
	襪子1-2雙			嬰兒專用指甲剪	
	尿布				

1. 準備之物品與數量應視季節和家庭狀況而定。
2. 準備嬰兒立即需要物品，以後視嬰兒成長情形增添。
3. 衣服易穿脫且耐洗，質料以棉質吸汗者為佳。
4. 在尚未知道新生兒篩檢結果之前，請不要讓嬰兒衣物或用品接觸萘丸(俗稱臭丸；樟腦丸)或其氣味，以避免急性溶血性貧血之可能發生。(有關新生兒篩檢詳細資料，請參閱兒童健康手冊)
5. 嬰幼兒乘車時，需使用平躺式汽車安全座椅，且置於後座面向後方。

រៀបចំសុវាគមន៍កូន

១. រៀបចំវត្ថុប្បវិប្រាស់របស់ទារក

ប្រភេទ	ប្រការ	ទទួលស្គាល់
ទឹកដោះមុតាយ	សំលៀកបំពាក់បំបៅដោះ	
	អាវត្រនាប់បំបៅដោះ	
	ក្រណាត់ត្រនាប់ទឹកដោះ	
	ថង់ប្រមូលទឹកដោះមុតាយ	
(អ្នកបំបៅដោះសូមធ្វើមិនអាចរាបចំប្រការនេះ) ទឹកដោះគោ	ដបទឹកដោះធំ៦ដប	
	ដបទឹកដោះតូច២ដប	
	កូហាលដបទឹកដោះ១០	
	ច្រវាស់ដុសទឹកដប២	
	ឆ្នាំងកំចាត់មេរោគ	
	ប្រអប់មូសាទឹកដោះគោ	
	មូសាទឹកដោះគោទារក	
សំលៀកបំពាក់	អាវត្រនាប់៤-៦ underwear	
	សរុលុង៤-៦	
	កន្សែងពោះគោ	
	កន្សែង៤-៥	
	ស្រាមជីង១-២	
	កន្ទបរ	
ប្រភេទ	ប្រការ	ទទួលស្គាល់
អាវ	ស្រាមដ៣-២គូរ	
	មួក	
ស្នាក់នៅ	រីទារក	
	ភួយ	
	មុង	
	កន្ទេរឯកុលឯង	
ជីវ	រទេះទារក	
	កាអីស្បែតិភាព	
មុជទឹក	កន្ទុង១	
	កន្សែងតូច២-៣	
	កន្សែងធំ២-៣	
	សាប៊ូទារក	
	សាប៊ូកក់សក់ទារក	
	លេទារកប្រហ្វានសីលីន	
	ឈើសំលី	
	កន្ទុរកៅត់ក្រចក់ដទារក	

១. វត្ថុនិងចំនួនដលៀបចំត្រូវយោងទៅតាមរដូវនិងស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារ។
២. រៀបចំវត្ថុដលៃទារកត្រូវការជាបន្ទាន់,បន្ទប់មៃទ្បីតក្រាយពលេទារកលូតលាស់។
៣. សំលៀកបំពាក់ងាយស្រួលសុលៀកពាក់និងសំអាត,មានក្រណាត់លុអដលៃអាចបឺតញឹស។
៤. មុនពលេដឹងពីលតុថដលត្រូវតពិនិត្យទារក,សូមកុំអាយទារកប៉ះពាល់ថ្ពាល់ណាដ៏ន(គហៅថាថ្ពាល់ឆ្វេន-ថ្ពាល់ចាងណា)ឬខ្ពស់ន,ដីមុបំច្ចៀសវាងជំងឺខ្ទុះឈាមកីតឡើង។(ឯកសារលំអិតទាក់ទងទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យទារក,សូមមើលសៀវភៅសុខភាពកុមារ)
៥. ពលេទារកជិះឡាន តូរ្វបុរីប្បវិប្រាស់កាអីឡានសុវត្ថិភាពប្រភេទផ្ទុដកេ ដាក់នៅកាអីឡានខាងក្រាយនិងបង្វៃមុខទៅខាងក្រាយ។

迎接寶寶的準備

二、產婦住院用品

類別		項目	確認	類別		項目	確認
掛號		健保卡		媽媽用品	盥洗用具	毛巾	
		孕婦身分證				臉盆	
		掛號證				牙刷、牙膏	
		孕婦健康手冊				肥皂	
媽媽用品	換洗衣物	梳子				衛生紙	
		拖鞋				產墊	
		內衣			餐具	杯子	
		產婦衣物				餐具	
		紙褲				冷熱水瓶	
寶寶用品		出院當日所穿衣服及包巾					

＊ 家長應讓每位嬰兒自出生之後固定看一位醫師，作整體兒童健康之照顧，不要經常換醫師。

早期新生兒聽力篩檢：

先天性聽力損失發生率，比起其他出生時篩檢的先天性疾病高很多，應及早發現矯治，才不會造成一生的遺憾；守護寶寶的聽力健康，請您的寶寶接受新生兒聽力篩檢。

101年起3月15日起，政府全面補助新生兒聽力篩檢，請把握時程(本國籍出生3個月內之新生兒，可接受一次篩檢補助)，至醫療院所(公告於國民健康署網站http://www.hpa.gov.tw/)接受篩檢。

ការត្រៀមលក្ខណៈទទួលស្វាគមន៍កូន

2 សំភារៈប្រើប្រាស់នស្ត្រីសំរាល់កូនដលែស្មនាក់នៅមន្ទីពេទ្យ

ប្រភេទ		ប្រការ	ទទួលស្គាល់	ប្រភេទ		ប្រការ	ទទួលស្គាល់
ចុះឈ្មោះ		កាត់ពិនិត្យសុខាភាព (អាយសីតាត)		សំភារៈម្តាយ	សំភារៈបន្ទប់ទឹក	កន្សសង	
		អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ				កន្សលងៃលាងមុខ	
		កាតចុះឈ្មោះ				ជ្រាស់ដុះធ្មេញ ថ្នាំដុះធ្មេញ	
		សៀវភៅសុខាភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ				សាប៊ូ	
សំភារៈម្តាយ	ការផ្លាស់និងសំរាតសំលៀកបំពាក់	ក្រាស				ក្រដាស់ជូតមាត់	
		ស្រាមជើង				ប្រនាប់ខ្នីយសំរាប់សំរាល់កូន	
		អាវក្នុង			សំភារៈបរិភាគអាហារ	កវៃ	
		សំភារៈនិងសំលៀកបំពាក់ស្ត្រីសំរាល់កូន				សំភារៈបរិភាគអាហារ	
		ខាក្រដាស់				បំពងទឹកក្តៅ និងទឹកត្រជាក់	
សំភារៈកូនៗ		សំលៀកបំពាក់និងកន្សសងៃរំនៅថ្ងៃចេញពីមន្ទីពេទ្យ					

* អន្នាពយ្យាបាលត្រប់រូបគួអាយកុមារីទារកពិនិត្យព្យាបាលដាយគ្រូពេទ្យតម្មែនាក់ សូមកុំធ្វើការប្តូគ្រូពេទ្យញឹកញាប់។

ការពិនិត្យការស្តាប់នទោរកទីបកីតថ្មី

អត្រាភាគរយនដែំងឺហាត់បង់សមត្តិភាពការស្តាប់ពីកំណើត មានភាគរយខ្ពស់ជាងគក្រេនុងចំណាមជំងឺដលែមានពីកំណើត ដូចនះេសូមធ្វើការពិនិត្យនិងព្យាបាលអាយហានទាន់ពលេទីបអាចជាស់វាងពីវិបត្តិសារីមួយជីវិតបាន គាំមពារសុខភាពការស្តាប់របស់កូនៗ សូមធ្វើការទទួលយកការពិនិត្យសុខភាពការស្តាប់នទោរក។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០២ទៅ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជំនួយក្នុងការពិនិត្យការស្តាប់របស់ទារកទីបកីត សូមក្តាបក្តាប់ឪកាស់អាយបានល្អ(នៅក្នុងកំឡុងពលេទារកមានអាយុគ្រប់៣ខៃ គួរធ្វើការទទួលការពិនិត្យអាយបានម្តង) សូមធ្វើការទទួលយកការពិនិត្យនៅមន្ទីពិនត្យ(ទំព័រសចេក្តីប្រកាស់នអែង្គការសុខាភិបាលជាតិ http://www.hpa.gov.tw)

寶寶的誕生

當懷孕進入中期時，準父母就可以開始依您的懷孕及身體狀況跟醫師或助產師討論生產計畫，包括生產方式、生產地點等，例如：醫院、診所及助產所或是由執業助產師(士)至家中為您接生。

認識多元生產模式

現行提供生產服務，包括產科醫療院所由婦產科醫師執行的產檢、接生及相關照護方式外，亦可透過執業的助產師(士)提供相關服務。準父母在選擇何處生產、如何生產時，除了依個別需要評估及規劃不同的生產環境與照護服務外，建議準父母可依孕婦懷孕及健康狀況，與醫師或助產師(士)討論，營造多元選擇的生產環境及權利，讓每個孕婦安心懷孕、安全生產！

健保特約醫事服務機構資訊，可至衛生福利部中央健康保險署查詢(網址：http://www.nhi.gov.tw，路徑：首頁/醫事機構/網路申辦及查詢/特約醫事機構基本資料網路查詢服務，於查詢條件「3.區域別」選取「所在地縣市、區域」及「8.預防保健」選取「孕婦產檢」再按開始查詢，即可產出名冊)。

助產所資訊請至衛生福利部網頁查詢（網址：http://www.mohw.gov.tw，路徑：首頁/常用查詢/醫事機構查詢及醫事人員查詢/醫事機構查詢/機構類別請選「助產機構」，機構名稱請輸入「助產」再開始搜尋，即可查詢到各縣市之助產所），另健保特約開業助產所資訊亦可至衛生福利部中央健康保險署查詢(網址：http://www.nhi.gov.tw，路徑：首頁/醫事機構/網路申辦及查詢/特約醫事機構基本資料網路查詢服務，於查詢條件「5.特約類別」選取「助產所」再按開始查詢即可產出助產所名冊)。

認識生產方式

能夠在以產婦為中心的生產照護環境，適當地使用助產資源與科技，支持產婦的需求，讓產婦充分發揮自己的能力進行生產，生產就不會只是疼痛的回憶，而是珍貴且感動的過程。

生產大致分為陰道生產及剖腹產兩種；大多數的媽媽可以經由陰道自然生產。然而有些孕婦會因為醫療上的理由，需要進行剖腹產。

ការចាប់កំណើតរបស់ទារក

នៅពេលដែលទៅចូលដល់ដំណាក់កាលកណ្តាលតុរៀមមាតាបិតាយោងតាមសុចរិតភាពនៃការមានផ្ទៃពោះនិងវាងកាយអាចពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យឬឆ្មបអំពីផែនការសំរាលបុត្រ រួមទាំងវិធីសំរាលទីតាំងសំរាល ឧទាហរណ៍៖ មនុទីរពេទ្យ គ្លីនិកនឹងមនុទីរសម្ភព ឬដាយអ៊ុនកប្រកបរបរឆ្មបទៅដល់ផ្ទះដើម្បីជួយបង្កើត។

យល់ដឹងពហុវិធីការសំរាលបុត្រ

ផ្តល់ជូននូវសេវាសំរាលបុត្រផ្ទាល់មានសុចរិតនិងវេជ្ជសាស្ត្រតផ្តនកែសម្ភពអនុវត្តតការពិនិត្យដាយគ្រូពេទ្យផ្តនកែពាគសុត្រីកុវាពីឆ្មបនិងវិធីសាស្ត្រតដលែទាក់ទងទៅនឹងការថែទាំដូចគ្នានេះដរែតាមរយៈអ្នកបុរកបរបរឆ្មបក៏អាចផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មមដលែទាក់ទងដរែ។នៅពេលតុរៀមមាតាបិតា ជ្រើសើសកនុលងៃសំរាលសំរាលដាយវិធីណាហើយកុវាពីតម្រូវការរបស់បុគ្គលកនុងការវាយតម្លនៃងផនៃការរកបរិស្ថានសំរាលនិងសេវាកម្មមថែរកុសាម៉ន្តដូចគ្នានាៈសំណើរសុំឲ្យតុរៀមមាតាបិតាអាស្រ័យលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់សុត្រីមានផ្ទៃពោះតូវពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យឬឆ្មបដើម្បីបង្កើតជម្រើសបរិស្ថានសំរាលឲ្យហានច្រើននិងសិទ្ធិរបស់អ្នកធ្វើឲ្យសុត្រីមានផ្ទៃពោះគ្រប់រូបមានទំនុកចិត្តកនុងការមានផ្ទៃពោះនិងសំរាលបុត្រដាយសុវត្ថិភាព!

ការគាំពារសុខភាពសេវាកម្មមវេជ្ជសាស្ត្រពិសេសេពនិងទីភ្នាក់ងារពតិមានអាចចូលទៅកុរស្លងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិធ្រីវរកៈ(គេហទំព័រ៖ http://www.nhi.gov.tw លំនាំ៖ទំព័រដើម/សុថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ/ដាក់ពាកុយសុំនិងរាវរកតាមអីនធឺណេត/ឯកសារជាមូលដ្ឋានរបស់សុថាប័នសខាភិបាលពិសេសសេវារាវរកតាមអីនធឺណេតេលកុខខណុឌនកែារាវរក"៣បុរថាតំបន់"ជ្រើសយក"ទីតាំងកនុងខេតកុរុងតំបន់"និង"៨-បុងការ ការថទាំសុខភាព"ជ្រើសយក"សុត្រីមានផ្ទៃពោះពិនិត្យផ្ទៃពោះ"ចុចចាប់ផ្តើមរាវរក នាៈនឹងឃើញទិន្នផលបញ្ជីឈ្មោៈ)

ពតិមានពិមនុទីរសម្ភពសូមចូលទៅគេហទំព័រកុរស្លងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពរាវរក(គេហទំព័រៈhttp://www.mohw.gov.twលំនាំ៖ទំព័រដើម/រាវរកទូទៅ/រាវរកសុថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រនិងរាវរកបុគ្គលិកពទេយ/រាវរកសុថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ/សូមជ្រើសបុរេទេសុថាប័ន"សុថាប័នឆ្មបប"បញ្ចូល

ឈ្មោៈរបស់សុថាប័ន"ឆ្មបប"ចាប់ផ្តើមសុរងែរក នាៈនឹងរកឃើញមនុទីរសម្ភពនៅតាមបណ្តាសុរុកនិងកុរុង)ម៉្យាងទៀតការគាំពារសុខភាពពិសេសនិងមនុទីរសម្ភពកំពង់ដំណើរការអាចចូលទៅកុរស្លងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិធ្រីវរកៈ(គេហទំព័រៈ http://www.nhi.gov.tw លំនាំ៖ទំព័រដើម/សុថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ /ដាក់ពាកុយសុំនិងរាវរកតាមអីនធឺណេត/ឯកសារជាមូលដ្ឋានរបស់សុថាប័នសុខាភិបាលពិសេសសេវារាវរកតាមអីនធឺណេតេលកុខខណុឌនកែារាវរក"៥.បុរេទេសេ"ជ្រើស "មនុទីរសម្ភព"ចុចចាប់ផ្តើមរាវរកនាៈនឹងឃើញទិន្នផលបញ្ជីឈ្មោៈមនុទីរសម្ភព)

ការយល់ដឹងពីរបៀបនកែារសំរាលបុត្រ

បរិស្ថានថទាំដលែគិតដល់សុត្រីមានផ្ទៃពោះជាចំបងពេលសំរាលបុរីបុរាស់សមស្របនធែនធានឆ្មបនិងបច្ចកេទិយាគាំទ្រតម្រូវការរបស់សុត្រីមានផ្ទៃពោៈ នាកនុងដំណាក់កាលសំរាលញ៉ាំងឲ្យសុត្រីបញ្ចេញសមតថភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសំរាលបុត្រ អាចជួយបំភ្លេចនូវការឈឺចាប់ពេលសំរាលថមែទាំងមានអារម្មមណ៍ថារីភរបនិងមានតម្លទៀតផង។

ការសំរាលបងែជាពីរបុរេទេគឺតាមទុវារមាសនិងវិធីរៈកាត់សុត្រីជាមួតាយភាគច្រើនអាចសំរាលតាមទុវារមាសបបែធម្មមជាតិ។យ៉ាងណាមិញសុត្រីមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនដាយសារតហែតុផលនសុែខភាពតម្រូវឲ្យធ្រីការរៈកាត់។

寶寶的誕生

經陰道自然生產

大多數的產婦可經由陰道順利成功生產，自然生產的好處包括傷口較不會疼痛且恢復快、可以及早下床活動，產後立即擁抱新生兒並且即刻做肌膚接觸及親餵母乳，提高哺餵母乳的成功率，盡早建立親子關係。新生兒在自然生產時經過產道的擠壓及摩擦，可刺激促進呼吸道內羊水的排除與吸收，使寶寶肺部順利展開而擁有良好的換氣功能，對外在壓力適應度較佳，發生呼吸窘迫合併症的機會較低。另外，也有研究指出，自然生產的寶寶免疫系統的活性較高，腸道障壁的保護也較好。一般而言，在臺灣醫療院所內，大部分以躺臥在產檯的姿勢生產，配合醫護人員的指導下在宮縮時用力將胎兒娩出。

有少數的產婦，可能發生外陰部血腫或肛門直腸裂傷，必須進行修補。也有少部分因醫療上理由，需利用產鉗或真空吸引協助生產，導致短暫性的胎兒頭皮血腫。極少部分可能發生胎兒肩難產導致新生兒鎖骨骨折或臂神經叢損傷。當然也可能因產程進展不正常或胎兒窘迫，需行緊急剖腹生產。

生產過程中可能會有產前灌腸、剃除陰毛、禁食、點滴液體補充、人工破水及非藥物性的減痛措施等，建議準爸媽可與您的醫師、助產師(士)，充分討論、諮詢以了解生產過程。此外，在生產進展的狀況，是可能有非如預期的變化，建議仍以醫師、助產師(士)之專業判斷處置，協助您擁有安全的生產經驗。

器械輔助經陰道自然生產

當產婦因用力不對或產婦患有心臟疾患無法用力過強，導致胎頭無法順利下降，使第二產程過久、產婦體力耗竭而過度疲憊，或胎兒窘迫需立即生產等原因，便有可能考慮使用器械輔助經生產，包括真空吸引、產鉗生產。

一、真空吸引輔助經陰道自然生產：利用一個杯狀吸盤接附在胎頭，吸盤銜接一條長型管子，接在高壓真空機，當機器啟動時會造成真空負壓吸力，再藉此牽引力幫助胎頭順利娩出。

二、產鉗輔助經陰道自然生產：產鉗由兩個扁平有彎曲度的鐵片構成，使用時會將其分別伸入產道置放於胎頭兩側，合起來時前端剛好將胎兒的頭部固定住，再由產科醫師握住後面手把，藉由旋轉及拉扯的力量將胎頭娩出。

ការចាប់កំណើតរបស់ទារក

តាមទ្វារមាសសំរាលបបៃធម្មជាតិ

សុតុរីជាមុតាយភាគច្រើនតាមទ្វារមាសអាចសំរាលហានយ៉ាងលូននិងទទួលហានជាគជ័យអត្ថប្រយោជន៍នានាសំរាលបបៃធម្មជាតិរួមមានការបួសមិនសូវមានការឈឺចាប់និងសៈសុបីយវិញលឿនជាងឆាប់ហានច្រៈពីលីគុរធ្វើចលនាកុរាយសំរាលរួចអាចបីទារកហានតុលាមពុរមទាំងផ្ទៅឱ្យសុបកៃមុដាយនិងទារកហានប៉ៈគុនាតុលាម។និងការបំបៅដាៈកូនបងុកីនអតុរានកៃារបំបៅកូនដាយទឹកដាៈមុដាយហានយ៉ាងជាគជ័យបងុកីតទំនាក់ទំនងមិតុតភាពហានឆាប់រវាងមុដាយនិងទារក។ទារកកីតបបៃធម្មជាតិឆ្លងកាត់ការច្រហាច់ចេញនិងការកិតរបស់ល្អាងតុរក្បៀតការបញ្ចេញនិងការស្សរួបយកទឹកតុលាៈ អាចបងុកីនការរំញាចកុនុងផ្លូវដងុហើមធ្វើឲ្យសួតរបស់ទារកពនុលាយ៉ាងលូនហើយមានមុខងារជាអុនកផ្លាស់ប្តូរដងុហើមហានល្អហើយកីតនកៃារផ្សាំជាមួយសម្ពាធខាងកុរាលុអបុរសើរជាងឱកាសវិបត្តិផ្លូវដងុហើមក៏មានកម្រិតទាបដរ។ម៉ុយាងទៀតក៏មានអុនកសុវាជ្ករាហានចងុអុលបងុហាញថាទារកកីតបបៃធម្មជាតិមានបុរព័ន្ធភាពសើសកមុមហើយខុពសជាងរហាងការពាពៈវៀនក៏លុអបុរសើរជាងដរ។ជាទូទៅកុនុងមនុទីរពទ្យគុលិនិកសមុភពនាតវ៉ាន់ភាគច្រើនឲ្យដកេផ្ទងារនៅលីគុរសំរាលកុនុងតរិយាបថសំរាលពុរមទាំងសហការជាមួយការណានៅរបស់បុគុគលិកពទ្យផងដរគឺបុរឹងនាំពលេសុបួនកនុតុរាក់នាៈទារកនឹងកីតចញេមក។

សុតុរីជាមុតាយមួយចំនួនតូចមានបញ្ហាកកដុំឈាមនាបបូរយានីឬដាច់របួសទ្វារលាមកនិងចុងពៈវៀនធំ តុរវតផ្ទៅកៃារពុយាហាល។ក៏មានមួយផ្នុនកៃតូចជាហាតេុផលផ្នុនកៃវជ្ជបសាសុតុរគឺតូរវបុរឹងដងុកៀបឬ ការបីតសូរបទាញដីមុបីជាជំនួយកុនុងការសំរាល បណ្តាលឲ្យសុបកៃកុហាលទារកកកដុំឈាមបណ្តាដាៈអាសនុន។កុនុងលកុខណៈតិចតួចណាស់ ជាភាពពិបាកសំរាល ដាយទារកចញេសុមាមកមុនអាចបណ្តាលឲ្យទារកហាក់ ឆុអឹងដងកាំបិត ឬកញ្ចចុំសរសបៃរសោទនាគល់ឃ្លៀករងរូស។ជាការពិតណាស់វាអាចតូរវហានបងុកឡើងដាយពលេសំរាលមានការរីកចមុើនមិនបុរកុរតីឬភាពដងុហាក់របស់ទារកតមូរឲ្យធ្វើការរៈកាត់សងុគុរាៈបនុទាន់។

នាកុនុងជំណាក់កាលសំរាលវាអាចមានដូចជាហាញ់ទឹកបញ្ចូលកុនុងពៈវៀនមុនពលេសំរាលការមយានី តមអាហារ ចាក់សរ៉ូមជាអាហារបំប៉ន វិធានការបំបាត់ការឈឺចាប់ដាយការបំបកៃកុនាសសិបុបនិមុមិតនិងដាយវិធីផ្សេងដលៃមិនបុរីថ្នាំ។សំណើរសុំឲ្យ តុរៀមមាតាបិតាតូរវពិភាកុសាឲ្យពញេលេញជាមួយវជ្ជបណ្ឌិត ឆុមបរបស់អុនកនិងបុរឹកុសាយាបល់ដីមុបីសុវងែយល់ពីដំណាក់កាលសំរាល។កុវាពីនេះ សុថានភាពវិឧុណន៌នាកុនុងពលេសំរាលគឺអាចធ្វើឲ្យមានការផ្តល់សុតូរដលៃមិនមនៃជាការំពឹងទុក សំណើរសុំឲ្យ អុនកនាតវែកគួរពទ្យ ឆុមបដលៃមានជំនាញជ្ជជាជីវៈ ធ្វើការិនិច្ឆ័យនិងដាៈសុាយដីមុបីជួយឲ្យអុនកជួបនឹងបទពិសាធន៌សំរាលដលៃមានសុវតុថិភាព។

ឧបករណ៍ជំនួយទ្វារមាសសំរាលបបៃធម្មជាតិ

នាពលេសុតុរីឆ្លងទនុលបុរឹងមិនតូរវ ឬដាយមានជំងឺបេះដូងដលៃមិនអាចបុរឹងខុលាំងហាន បណ្តាលឲ្យកុហាលកូនមិនអាចធុលាក់ចុះដាយរលូន។ជំណាក់កាលសំរាលទីពីរយូរពកេ ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់សុតុរីឆ្លងទនុលហោត់នឿយថមៃទាំងអស់កមុលាំងខុលាំងហួសបុរមាណ ឬដាយភាពដងុហាក់របស់ទារកដលៃជាមូលហាតេុ តមូរវឲ្យដាៈសុាយភុលាម។ នាៈបុរហាលៃជាគិតដល់ការបុរឹឧបករណ៍ជំនួយទ្វារមាសំរាលបបៃធម្មជាតិ រួមមាន ឧបករណ៍ប៊ឺតសូរបដងុកៀប។ល។

១. វឧបករណ៍ប៊ឺតសូរបជំនួយទ្វារមាសំរាលបបៃធម្មជាតិៈបុរីបុរដាប់បូមរាងដូចពងៃដាក់តុជាប់នាកុហាលរបស់ទារកបុរដាប់បូមជុសារតុជាប់បំពង់រៃងមួយតុជាប់ទាំនឹងម៉ាសីនបូមតង់សុយុងខុពស់ នាពលេម៉ាសីនចាប់ផ្តើមនឹងបងុកឲ្យមានការ ប៊ឺតសុញ្ញកាសបនុទាប់មកយកក៏អាចជួយទាញកុហាលរបស់ទារកចញេហានយ៉ាងរលូន។

២. ដងុកៀបជំនួយទ្វារមាសសំរាលបបៃធម្មជាតិៈដងុកៀបផ្ទៅឡើងដាយបនុទៈដកៃពីរវាបសុមីរបត់ពុតឲ្យកាង នាពលេបុរឹតូរវញកៃហើយដាក់បញ្ចូលទាំកុនុងទ្វារសំរាលសងខាងកុហាលទារក ពលេគៀបចុងខាងមុខកុហាលរបស់ទារកនាហ្នឹង បនុទាប់មកដរៃរបស់គ្រូពទ្យឆុមបកាន់ដងឲ្យជាប់ ដាយកំលាំងបងុវៃលនិងកមុលាំងទាញកុហាលរបស់ទារកនឹងចញេមក។

寶寶的誕生

剖腹生產

剖腹生產是一種開腹手術，對母體及胎兒仍有潛在的風險。例如：出血較多、傷口較痛、恢復較慢、有腹部傷疤；有時也會合併麻醉過敏、腸沾黏、泌尿道感染；再次懷孕時發生子宮破裂，或是因為前置胎盤合併植入性胎盤的機會較高；新生兒也有較高比例出現呼吸窘迫等肺部合併症。故懷孕婦女除了有產科醫療上之適應症，例如：產程進展遲滯、產前大量出血、胎兒窘迫、胎位不正、巨嬰、前胎剖腹產、前置胎盤、阻礙性生產、催生失敗…等，必須進行剖腹生產外，原則上都鼓勵由陰道自然生產。此外，相關研究發現，小於37週非醫療考量選擇性分娩的新生兒，其發生呼吸困難、心臟問題和癲癇等併發症的機率是足39週出生新生兒的2倍。

另外，若經過一次剖腹產後，當再次懷孕時，是否可以嘗試陰道生產呢？一般認定適合施行「剖腹後改由陰道分娩方式」之條件，包括：前胎剖腹產的子宮切口為下段切開剖腹、適當骨盆結構、有意願準備嘗試「剖腹後之陰道分娩方式」、無其他必須採剖腹生產的適應症；同時必須在具備可立即實施緊急剖腹生產且有能力急救新生兒的一定規模醫療機構生產才行。

倘若您尚未了解「剖腹後之陰道分娩方式」或待產及生產之有關事項，請詢問您的醫療照顧者（醫師、助產師(士)及護理師(士)），充分討論以了解最合適之生產方式。

生產是一門複雜的學問，每一種生產方式都有其優缺點，擁有一個順利安全的分娩，不僅需要醫護人員的專業，也需要您在產前的了解，及相互討論與關鍵時刻的決定，選擇最合適的生產方式。

ការចាប់កំណើតរបស់ទារក

ការរះកាត់

សំរាលបបែរះពាះគឺជាវិធីរះកាត់មួយ ដលែនៅតមែានថាមពលនិងហានិភ័យភាពចំពាះមាតានិងទារកដដលែ។ ដូចជាៈហូរឈាមចុរនិ មុខរបួសឈឺជាងសៈស្បីយឡើងវិញយឺត មានស្នាមនាលឺពាៈ។ពលេខ្លៈអាចប្រតឹកម្មរួមនឹងថ្នាំសន្លប់ សុអិតពាៈរៀនការឆ្លងមរោគលីផ្លូវបង្ហូរទឹក។ពលេមានគិរម្ដងទៀតអាចរហែកសុបូន ឬមួយមានឱកាសកាន់តខ្ពៃស់ដាយសារតសៀកហាំងមាត់សុបូនរួមនឹងចាក់ឬសចូលសាច់សុបូន ។ ទារកដលែទីបនឹងកីតមានសមាមាត្រនដៃមុងធំផ្លូវដង្ហែម ខ្ពស់ផងដរែដូចជាផលវិបាកសួតជាដីម។ ដូចនេះសុត្រីមានផ្ទៃពោៈក្រៅពីផ្សំានឹងការព្យាបាលផ្នែកសមុភពដូចជាៈវិវឌ្ឍន៍យឺតក្នុងដំណាក់កាលសំរាលហូរឈាមចុរនិមុនពលេសមុរាល ភាពដង្ហាក់របស់ទារក ទីតាំងមិនបុរក្រតីរបស់ទារកទារកធំ រះពាៈកាលកីតកូនមុន សុកហាំងមាត់សុបូន រារាំងដល់ការសំរាលបរាជ័យពលេជមុរញ្ជឲ្យកីត ទាំងនេះដលែត្រូវតធ្វែីការរះកាត់ ក្រៅពីនេះជាគាលការណ៍គឺលីកទឹកចិត្តសំរាលតាមទ្វារមាសបបែធមុមជាតិ។ បន្ថមែពីលីនេះការសុវាជ្រវាដលែទាក់ទិនហានឲ្យដឹងថា ទារកដលែកីតអាយុតិចជាង៣៧សបុតាហ៍ជ្រុសរសៃដាយ មិនពិចារណាពីផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ អាចជួបនូវិបត្តដូចជាពិហាកដកដង្ហែម ជំងឺបះដូងនិងជំងឺឆ្កួតជ្រូក ពីទារកកីតគ្រប់៣៩ សប្ដាហ៍ ២ដង។

ម៉្យាងទៀត បីធ្លាប់រះមុដងរួចហើយ នៅពលេមានគភិលីកទីពីរ តីអាចសាកល្បងកីតតាមទ្វារមាសហានទេ?ជាទូទៅលក្ខខណ្ឌដលែសមនឹងអនុវត្ត«ក្រាយកីតដាយវិធីរះកាត់រួចបុត្តរទៅជាកីតតាមទ្វារមាស»រួមមានៈសុនាមរះសុបូនរះនៅផ្នែកែកុរាមកាលពីរះសំរាលកូនលីកមុន រចនាសម្ព័នឆ្អឹងអាងត្រគាកដលែសមរមួយ មានឆន្ទៈត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដីម្បីសាកល្បង «បន្ទាប់ពីកីតដាយការរះកាត់ទៅកីយតាមទ្វារមាស» គួមានផ្សងេទៀត យើងត្រូវតទៃទួលយកតាមការចង្អុលបង្ហាញដាយផ្ទៃការរះកាត់ នៅពលេជាមួយគ្នានេះយើងត្រូវតត្រៀមរះកាត់សង្គ្រះបន្ទាន់ក្លាម ត្រូវតទៅផ្ទៃនៅស្ថាប័នរជ្ជេជសាស្ត្រដលែមានមាត្រដ្ឋានជាក់លាក់ ហើយមានសមត្ថភាពជួយសង្គ្រះដល់ទារកទីបត្រូវ។

បុរសិនបីអ្នកមិនហានយល់អំពី«បន្ទាប់ពីកីតដាយការរះកាត់ទៅកីយតាមទ្វារមាស» ឬបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការរង់ចាំសំរាលនិងពលេសំរាល សូមសួរអ្នកថទែាំសុខភាពរបស់អ្នក(គ្រូពទេយ ឆ្មបនិងគិលានុបដ្ឋាយិកា) ពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងពញលេញនៅក្នុងគាលបំណងដីម្បីយល់ពីវិធីដលែសមរមួយបំផុតនកៃារសំរាល។

ការសំរាលគឺជាមរៀនដលែសុមុគសុមាញ វិធីសំរាលមួយណាក៏មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វា។មានការសំរាលដាយរលូននិងមានសុវត្ថិភាពមិនត្រឹមតមែានបុគ្គលិកគ្រូពទេយ ជំនាញប៉ុណ្ណាៈទេ អ្នកក៏ត្រូវយល់ដឹងពីនេះនៅមុនពលេសំរាលដរែ ព្រមទាំងពិភាក្សាជាមួយគ្នានិងជាការសម្រចេចិត្តដ៏សំខាន់នជ្រែីសរបៀបសំរាលដលែសមរមួយបំផុត។

生產徵兆

接近生產期之前，會出現下列幾種徵象：

1. **輕鬆感：**

   預產期前幾週，胎兒頭部會下降到骨盆腔，孕婦會有輕鬆感，通常食慾較好，呼吸較順暢。

2. **落紅或現血：**

   子宮口漸開，子宮頸的黏液混合少許血液，從陰道口排出。

3. **陣痛或腰痠：**

   因子宮收縮而造成的，會有下列特性：

   - 開始時為不規則疼痛，漸漸的轉變為規則，疼痛隨著時間漸漸加長。
   - 疼痛的部位在整個腹部及背部，尤其是尾骶骨處有痠痛感。
   - 陣痛時子宮變得很硬，不痛時就變軟。
   - 不會因按摩或走動而減輕疼痛。

4. **破水(由陰道流出多量液體)：**

   保護胎兒的羊膜破裂，羊水自陰道流出，此時不管是否規則陣痛，皆應減少走動，儘快到醫院。

何時該到產房待產？

若有下列任一生產的徵兆，應儘速直接到產房：

1. 規則的陣痛：
   第一胎約7-8分鐘陣痛一次，第二胎產婦規則陣痛即可待產。
2. 落紅並伴隨規則的陣痛。
3. 破水。

សញ្ញានៃការសម្រាល

នៅជិតពេលសំរាលកូន,នឹងមានអាការៈប៉ុន្មានយ៉ាងទាំងនេះ

១.មានអារម្មណ៍ធូរសុរាល

មុពេលសំរាលកូនប៉ុន្មាសបួតាហ៍,ក្បាលទារកកុន្ទុងផ្ទៃលាក់ចុះតូរកៀក,ស្បូរតីមានផ្ទៃពោះមានអារម្មណ៍ធូរសុរាល,ជាទូទៅនឹងចូលចិត្តទទួលទានអាហារ,ដកដង្ហើមស្បូលខុលូន។

២.ចញ្ចេឈាម

សុបូនហានបីក,មានសភាពសុអឹតនិងមានឈាមកុន្ទុងសុបូន,ហូរចញ្ចេតាមយានី។

៣.ការឈឺចាប់ឬរួយចង្កេះ

ពីពុរៈការរួញសុបូន,នឹងមានអាការៈដូចខាងក្រោម

- ចាប់ផ្តើមមានការឈឺចាប់មិនទាងទាត់,ចាប់ផ្តើមទាង់ទាត់បន្តិចមុតងៗ,នឹងមានពេលឈឺចាប់យូរជាងមុនបន្តិចមុតងៗ។
- កន្លែងឈឺចាប់នៅលីពោះនិងខ្នង,ជាពិសេសនៅឆ្អឹងតូរកៀកមានអារម្មណ៍រួយខុលាំងណាស់។
- នៅពេលឈឺសុបូនមានសភាពឹងណាស់,វាទន់នៅពេលដែលមិនឈឺ។
- មិនអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដាយសារការម៉ាសាឬដីរ។

៤.ចញ្ចេទឹក(មានទឹកមុយ៉ាងហូរចញ្ចេពីយានី)

តូរនាប់ថវែក្សាទារកកុន្ទុងផ្ទៃហានបែក,ទឹកហូរចញ្ចេពីយានី,នៅពេលនោះមិនថាឈឺឬឥត,គួរកាត់បន្ថយការដីរ,បុរញ្ជាប់បុរញ្ជាលទៅកាន់មន្ទីពេទ្យជាបន្ទាន់។

គួរទៅចាំសំរាលកូននៅបន្ទប់សំរាលកូននៅពេលណា?

បុរសិនបីមានអាការៈណា១កុន្ទុងចំណានខាងក្រោមនេះ,តូរូវទៅកាន់បន្ទប់សំរាលកូនជាបន្ទាន់

១. ឈឺទៀងទាត់

មានផ្ទៃពោះលីកដំបូងគឺ ដង 7-8 នាទីគឺតូរូវឈឺមុតង មានផ្ទៃពោះពីលីកទី២តទៅបុរសិនបីមានការឈឺគឺអាចរង់ចាំសម្រាលកូន

២. ចញ្ចេឈាមហើយឈឺទៀងទាត់

៣. ចញ្ចេទឹក

生產陣痛

產前教育-幫助準備與因應生產陣痛

懷孕、生產是一個正常的生理過程，子宮收縮引發陣痛或腰酸的感覺，陣痛使子宮頸變軟及擴張，因此，生產的陣痛是一種生理的正常變化，代表胎兒即將離開子宮來到外面的世界。疼痛可能帶來不舒服，有些人對這種陣痛因為不瞭解而十分害怕；事實上，陣痛是健康的表徵，表示子宮頸在發揮應有的功能：擴張。把疼痛想成生產時的溝通者，在心理上改變想法可以增加自己的信心，讓身體自己作主，放開身體，肌肉才會比較放鬆，這樣才能比較容易把胎兒推出來。

因為子宮頸是要慢慢張開，胎兒也逐漸迴轉下降離開子宮，產程的長短受到胎次、生產間隔、心理狀態、胎兒的胎方位與姿勢、準媽媽的骨盆形狀與大小及子宮收縮等因素影響。因此，待產的過程需要一段時間，一般第一胎約需要12-18小時，第二胎約需要8-10小時，需要有耐心的等待。由於近年來準媽媽的營養狀態好，運動機會少，而且胎兒常常比較大，所以產程會出現比預期延長的情況，準父母要更加有耐性。準父母最好在生產前幾個月就開始接受產前教育，瞭解生產的變化過程，自然舒緩疼痛的方式和各種鎮痛藥劑。到子宮開始收縮才開始學習疼痛管理技巧，效果經常不彰。

以下就是緩和生產不適感的基本知識與方法:

1. 維持自己在最佳身心狀態：注意營養、保持良好的體能、維持愉快情緒。
2. 產前就先面對恐懼：瞭解自己的害怕、吸收與生產相關的資訊、多跟不怕生產的親友相處、避免回想可怕的經驗及為自己所作的決定負責。
3. 產前做充分準備：充分瞭解待產和生產的過程、學會各種放鬆技巧、備好自己喜歡的音樂、做出自己可以放心的正確決定、溝通與選擇能符合自己生產期望的陪伴者，與陪伴者一起學會正確的撫觸與按摩。
4. 生產時的因應：相信自己是有能力生產的、接受正常生產就是需要一段時間、放鬆身體，盡量讓生產陣痛自然的開始、使用各種不同自然舒緩疼痛的方式、待產過程中自由活動或選擇舒服的姿勢、有持續性的支持與陪伴者、第二產程非平躺而是要順著身體的感覺自發性的用力。

孕婦面對產痛時，絕大部分是可以經由醫師、助產師(士)及護理師(士)的協助，以非藥物的疼痛減輕方法（例如：保持環境安靜、燈光柔和、有意義者的陪伴與支持、鼓勵待產期間走動、按摩舒緩、使用溫水浴、選擇待產與生產的姿勢等），透過語言及肢體協助，增進安心與信心來減輕疼痛，成功達到陰道生產的目標;少部分仍無法承受產痛的孕婦，可經由醫師利用減痛分娩，來減輕疼痛。

ឈឺពាះពលេសំរាល

ការអប់រំមុនសម្រាលកូន អាចជួយរៀបចំនិងទប់ទល់កាឈឺពាះពលេសំរាល

ការមានផ្ទៃពោះ ការសំរាលគឺជាដំណើរការណ៍ធម្មតានៃរីរវិទ្យា ការកន្ត្រាក់សុបូនបណ្តាលឲ្យមានអារម្មមណ៍ឈឺចាប់ឬឈឺចង្កេះ ពលេឈឺហានន័យថាមាត់សុបូនទន់ហើយបើក ដូចនេះឈឺពាះពលេសំរាលគឺការបូរបែរួលធម្មតាខាងសរីរវិទ្យា មាននន័យថាទារកនឹងចាកចេញពីផ្ទៃម្តាយមកពិភពខាងក្រៅ។ការឈឺអាចនាំមកនូវភាពមិនសុខស្រួល មានមនុស្សខ្លះមិនហានយល់ពីការឈឺពាះក៏មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំង តាមពិតទៅការឈឺចាប់គឺការតំណាងឲ្យសុខភាពល្អ មានន័យថាមាត់សុបូនកំពង់បំពេញមុខងារហានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ៖ការពង្រីកនិងបើកចំហ។ចូរយកការឈឺចាប់នេះគិតថាជាការទំនាក់ទំនងពលេសំរាលត្រូវបុរីចិត្តសាស្ត្រជ្រុលាស់បុត្រូវគំនិតរបស់អ្នក អាចនឹងបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់អ្នក បុរគល់ឲ្យរាងកាយធ្វើជាមុចាស់បើកទូលាយរាងកាយ ទីបអាចជួយបន្ធូរសាច់ដុំ ដូចនេះទីបអាចងាយស្រួលកុនុងការជួយជំរុញទារកចញេមក។

ដាយសារមាត់សុបូនបើកចំហាយឺតៗ ទារកក៏ត្រូវបង្ខិលចុះបន្តិចមុតងចាកចញេពីសុបូន រយៈពលេសំរាលយូរឬឆាប់អាចទទួលពីចន្លនសំរាល ចន្លៈពលេសំរាលពីកូនមួយទៅកូនមួយ សុថានភាពផ្លូវចិត្តទីតាំងរបស់ទារកនិងឥរិយាបថទារក រាងនិងទំហំរបស់ឆ្អឹងអាងត្រគាក និងសុបូនកន្ត្រាក់របស់មុដាយទាំងនេះជាកត្តាដលែប៉ះពាល់ ។ ដំណាក់កាលរង់ចាំសំរាលត្រូវការចំណាយពលេមួយរយៈតាមធម្មតាកូនទីមួយត្រូវការ១២-១៨ម៉ាង កូនទីពីរត្រូវការ៨-១០ ម៉ាង ដូចនេះត្រូវមានការអត់ធ្មត់កុនុងការរង់ចាំ។ដាយសារតកុនុងប៉ុនុមានឆ្នាំចុងកុយនេះសុថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់សុតូរីជាមួតាយលុអ ឱកាសធ្វើលំហាត់បុរាណតិចជាងមុន ម៉ុយាងទៀតជាញឹកញាប់ទារកធំជាងមុន ដំណើរការសំរាលនឹងត្រូវបានអូសបន្លាយពលេយូរជាងការពឹងទុក ដូចនេះតុរៀមមាតាបិតាត្រូវមានការអត់ធ្មត់បន្ថមទៀត។ពីរបីខមែុនពលេសំរាលយកលុអតុរៀមមាតាបិតា ត្រូវចាប់ផ្តើមទទួលយកការអប់រំមុនពលេសំរាល ដើមុបីយល់ដឹងអំពីការបូរបែរួលនៅកុនុងដំណើរការសំរាល វិធីសាស្ត្រដើមុបីបន្ថយការឈឺចាប់បបែធម្មជាតិនិងថ្នាំបំហាត់ការឈឺចាប់គួរបបុរតទេ។ចាំដល់ពលេសុបូនចាប់ផ្តើមកន្ត្រាក់ទីបរៀនបចុចកេទសេគួរប់គួរងការឈឺចាប់ ជាញឹកញាប់គឺគុមានបុរសិទ្ធភាព។

ខាងកុរាមនេះគឺចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននិងវិធីសាស្ត្រតដើមុបីបន្ធូរបន្ថយភាពមិនស្រួលនកៃារសំរាល :

១-ចូររក្សាកាយនិងផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងនៅកុនុងសុថានភាពល្អបំផុតៈចូរយកចិត្តទុកដាក់ចំពាៈការអាហារូបត្ថមុត រក្សាកាយសម្ប៉ទាឲ្យលុអ រក្សាអារម្មមណ៍ឲ្យរីករាយ។

២-បុរឈមមុខនឹងភាពភ័យខ្លាចមុនពលេសំរាល យល់ដឹងអំពីការភ័យខ្លាច របស់ខ្លួនឯង ស្វរួបយកពតិមានដលែទាក់ទងនឹងការសំរាល ត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយបងបុអូន មិត្តភក្តិណាដលែមិនខ្លាចការសំរាលបុត្រឲ្យហានចុរិន ជៀសវាងការរំលឹកឡើងវិញនូវបទពិសោធន៍គួរឱ្យខ្លាចនិងមានការទទួលខុសត្រូវនូវាល់ការសម្រេចចិត្តដាយខ្លួនឯងផ្ទាល់។

៣-មុនសំរាលកូនត្រូវរៀបចំយ៉ាងពញេលញេៈយល់ចុហាស់ពីការរង់ចាំសំរាលនិងពីដំណើរការនកៃារសំរាលកូន រៀនបចុចកេទសេសំរាលលំហានា រៀបចំបទភ្លុលង ដលែអ្នកចូលចិត្ត អ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងមានទំនុកចិត្តលីខ្លួនឯង ការបូរាស្រ័យទាក់ទងនិងការជ្រើរសើរសេសការសំរាលដលែសកុដិសមនឹងខ្លួនពុរមទាំងមានអ្នកកមុដរដូចដលែអ្នកចង់ហាន រៀនជាមួយអ្នកកមុដរអំពីការចុរហាច់ម៉ាស្សាឲ្យត្រឹមត្រូវ។

៤-សម្រាលពលេវលោនកៃារឆ្លើយតប:ពលេសំរាលគួរតរៃជឿជាក់ខ្លួនឯងថាមានសមត្ថភាពសំរាលទទួលយកការសំរាលធម្មតាគឺត្រូវចំណាយរយៈពលេមួយរយៈ សម្រាកឱ្យរាងកាយ ចាប់ផ្តើមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការឈឺពាៈតាមបបែធម្មជាតិ សាកបុរីបុរីវិធីបបែធម្មជាតិនានាដើមុបីជួយសម្រួលនិងបំហាត់ការឈឺចាប់ សណីភាពកុនុងការដើរហើរខណៈរងចាំសំរាល ឬជ្រើរសទីតាំងមានជាសុខភាពមួយ មានការគាំទ្រជាបន្តនិងមានអ្នកនៅកមុដរ ដំណាក់កាលទីពីរនពលេសំរាលមិនត្រូវរកផ្ទុងទេ តូវ្រសមុរបតាមអារម្មមណ៍របស់រាងកាយបុរីងដាយឯកឯង។

សុតូរីមានផ្ទៃពោះពលេបុរឈមនឹងការឈឺពាៈសំរាលភាគចុរីនតាមរយៈ:ជំនួយពីតូរួពទេុយ ឆ្មបនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាដាយមិនបុរីថ្នាំបំហាត់ឈឺឬវិធីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ (ដូចជាៈការកុសាការសុងាត់សុងៀមពន្ទលីភ្លុងសុរទន់សារៈសំខាន់ពីអ្នកកមុដរនិងការគាំទ្រ លីកទឹកចិត្តដ៏រពលេរងចាំក៏យម៉ាស្សាសម្រួល ងូតទឹកកុតៅឧណ្ហដ។ អ្នកអាចជ្រើរសការរងចាំសំរាលនិង ឥរិយាបទរងចាំសំរាល។ល។តាមរយៈ:ជំនួយពាកុយសំដីនិងកាយវិកា បងុកីនការសុងប់ចិត្តនិងជំនឿចិត្តបន្ថយការឈឺចាប់ ទទួលហានជាគជ័យកុនុងការសំរាលតាមទុវាមាសដូចបំណង។សុតូរីមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនតូចមិនអាចរងការឈឺចាប់សំរាលកូន អាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដាយគួរពេទ្យហានបុរីថ្នាំកាត់បន្ថយការឈឺចាប់។

給準爸爸的話

在婦女懷孕期、準備生產，甚至進產房生產到產後，這一連串的重要過程，不單僅是準媽媽個人的責任。為了讓準媽媽有個快樂、健康的懷孕期，準爸爸及家人的支持與陪伴扮演著非常重要角色！

從懷胎開始，準媽媽的身心就逐漸開始產生變化，且隨著孕期週數的增加，其身心的負擔也隨之增長。因此，這時候非常需要準爸爸的關懷與照顧。建議準爸爸及家人透過關懷及實際行動(如：傾聽，分享準媽媽的快樂與憂慮、陪準媽媽去醫院做產檢、一同參加產前教育課程及產前運動…)除了可以支持準媽媽孕期的辛苦外，亦可了解胎兒的生長發育情況、促進夫妻感情及建立親子關係的良好基礎。

在懷孕後期至準備生產期間，建議準爸爸及家人一同找好做產檢及生產的醫院；學習拉梅茲分娩呼吸法、認識生產預兆、了解生產過程；與醫師、準媽媽討論及決定生產方式。另外，可以多分擔準媽媽的家事、協助照顧家中其他小孩，讓準媽媽能充分的休息。若醫師許可，建議準爸爸陪伴準媽媽散步，作產前運動；若懷孕後期因身體不適、情緒不穩定、或因擔心身材變形而不開心時，應協助解除不適並多予支持。

準媽媽生產時的疼痛和不舒服是無法言喻的，孤軍奮鬥的無助感更令準媽媽無法提起勇氣，生產的勇氣與迎接新生命的美好感受是增強日後照顧新生兒及育兒自信心的來源，所謂的「為母則強」，其中絕對需要準爸爸來共同參與，況且生產時有了準爸爸的陪伴，更能讓準媽媽有「被愛」、「正向能量」的感受。準爸爸雖然在生產當下不是直接面臨生產的痛苦，但是在未來仍是要扮演為人父的責任，生產時一同奮鬥的滿足感與參與感，能讓準爸爸開始覺察自己成為父親的角色與該盡的責任，這樣的心理調適與角色轉換對於婚姻家庭的關係都有正向的幫助。

សំដីចំពោះឪពុក

អំឡុងពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ,ប្រុងប្រៀបសំរាលកូន,សូម្បីតែក្មេយពេលចូលបន្ទប់សំរាលកូន,ការឈឺចាប់ទាំងនេះមិនមែនជាបន្ទុកអ្នកម្តាយតម្មែនាក់ទេ។ដឹម្បីផ្តល់នូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងសុខភាពល្អអក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ,ឪពុកនិងក្រុមគ្រួសារជាអ្នកគាំទ្រនិងកំដរដ៏សំខាន់!

ចាប់ពីពេលមានផ្ទៃពោះ,កាយនិងចិត្តអ្នកម្តាយចាប់ផ្តើមមានការប្រែប្រួល,ហើយក៏នឡើងតាមចំនួនសប្តាហ៍,បន្ទុកកាយនិងចិត្តនឹងក៏នឡើងដរែ។ដូចនេះ,ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់និងការថែរក្សានៅពេលនេះ។អាយយោបល់ឪពុកនិងគ្រួសារយកចិត្តទុកដាក់និងសកម្មភាព(មានដូចជា-សុតាប់,រំលែកសេចក្តីសប្បាយនិងលំហាក់,កំដរអ្នកម្តាយទៅជ្រំការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះ,ចូលរួមទទួលការអប់រំមុនពេលសំរាលកូននិងហាត់ប្រាណមុនពេលសំរាលកូន,,,)កូវ៧ពីអាចគាំទ្រអ្នកម្តាយដលៃលំហាកកុនុងអំលុងពេលមានផ្ទៃពោះ,ក៏អាចយល់ដឹងពីស្ថានភាពការលូតលាស់របស់ទារក,បណ្តាលអាយមនាសញ្ជនាគូស្វាមីភរិយាភ្ជាប់នឹងការសំរាលកូន។

អំឡុងពេលចុងក្រាយកុនុងពេលមានផ្ទៃពោះដល់ពេលប្រុងប្រៀបសំរាលកូន,អាយយោបល់ឪពុកនិងក្រុមគ្រួសារកមនុទីពទ្យេតត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះនិងសំរាលកូន។រៀនវិធីដក់ដង្ហឹមឡាមីជីនៅពេលសំរាលកូនសុគាល់ពីអាការៈមុនពេលសំរាលកូននិងឆ្លងកាត់វលោសំរាលកូន។ពិភាកុសានិងសំរេចពីវិធីសំរាលកូនជាមួយគ្រូពទ្យេនិងអ្នកម្តាយ។ម៉ូយាងវិញទៀត,អាចរំលេកការងារផ្ទះរបស់អ្នកម្តាយ,ជួយមីលថកៃ្មនដទកៃ្មនុងផ្ទះ,ផ្តល់នូវការសំរាកគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកម្តាយ។ប្រសិនបីគ្រូពទ្យេអនុញ្ញាតិ,អាយយោបល់ឪពុកកំដរអ្នកម្តាយដីរលេង,ហាត់ប្រាណមុនពេលសំរាលកូន។ប្រសិនបីមិនស្រួលខ្លួនឬមានអារម្មណ៍មិនល្អឬហារម្មណ៍ពីរាងកាយប្រែប្រួលកុនុងអំលុងពេលចុងក្រាយពេលមានផ្ទៃពោះបណ្តាលអាយមិនស្រួលចិត្ត,ត្រូវជួយសំរួលនិងគាំទ្រ។

ការឈឺចាប់របស់មាតាកុនុងពេលសម្រាលគ្មានអ្វីអាចប្រៀបផ្ទឹមហានឡើយ។ភាពឯកាដលៃហានមកពីការតស៊ូតម្មែនាក់ឯងកាន់តនៅឲ្យមាតាកាន់តព្រួយហារម្ត។ភាពកុលាហាន និងបទពិសាធវិជ្ជមានកុនុងការសម្រាលគឺជាបុរតពនជៃនឿចិត្តមួយកុនុងការមីលថទៅនិងអប់រំកូននាថ្ងៃកៃ្រាយដាយកុនុងនាៈត្រូវការចាំហាច់នូវការចូលរួមរបស់ឪពុកព្រៈការកំដររបស់ឪពុកកុនុងការសម្រាលជួយឲ្យមុដាយទទួលហានអារម្មណ៍ “តូរហានសុរលាញ់” និង “ថាមពលវិជ្ជមាន” ។ថ្មីតែបិតតែឪពុកមិនហានទទួលរងការឈឺចាប់ដាយផ្ទាល់កុនុងការសម្រាលប៉ុនុ្តដនៅថ្ងៃកៃ្រាយតូរមានទំនួលខុសតូរកុនុងការដីរតួជាឪពុក។ការចូលរួមនិងការពញេចិត្តកុនុងពេលតស៊ូជាមួយគ្នាកុនុងការសម្រាលជួយឲ្យឪពុកចាប់ផ្តើមដឹងថាខ្លួនហានកុលាយទៅជាឪពុកនិងដឹងពីទំនួលខុសតូរដលៃតូរបំពញ្ច។ការសម្រួលផ្លូវចិត្តនិងការផ្លាស់ប្តូរតួអង្គនេះមានផលវិជ្ជមានចំពោះជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងទំនាក់ទំនងគ្រួសារ។

產後健康管理

生產之後，有哪些照護事項是媽媽要特別注意的呢？

一、陰道生產什麼時候可以下床、可以出院？

A 正常分娩後約6小時即可下床用餐和排尿(第一次下床需家人陪伴)，但仍以休息為佳，若順利約3天左右即可出院。

二、生產之後，怎麼保持會陰部的清潔？

A 產後應該用衛生棉遮護會陰部以吸收排出的惡露，並隨時更換。並且在每次排便後，用溫開水或消毒水由前往後沖洗會陰部。

三、要如何保持全身清潔？

A 滿月前宜採淋浴，不可使用盆浴，以防細菌進入子宮引起發炎。洗髮後迅速吹乾即可。

四、生產後怎麼吃？

A 應均衡攝取各類食物。產後常口渴，可多飲開水、牛奶及熱粥等易消化食物。

五、生產後，什麼時候可以開始有性生活？

A 惡露乾淨、子宮完全恢復才可行性生活，通常約在產後滿月左右，否則易感染或出血。

六、生產後為什麼要運動？

A 產後選擇合適運動可增加腹肌收縮，促進子宮收縮，保持美好身材。

ការគ្រប់គ្រងសុខភាពកុរាយពលេសំរាលកូន

រាយពលេសំរាលកូន,មានបុរការម៉ីលថ្មរែកុសាណាខុលៈដលៃ អ្នកមុតាយគួរយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសសៃ?

Q&A

Q ១.តីការសមុ្រាលតាមទុ្រាមោសពលេណាទីបអាចចុះពីលីគួរនៃងចញ្ចេពីមនុទីរពទុ្យហាន?

A ចំលីយ-អាចចុះពីគួរទៃទូលទានអាហារនិងបត់ជីងតូចកុរាយពលេសំរាលកូន៦ម៉ាង(ចុះពីគួរលើកដំបូងតួរមានកុរុមគួរសារកំដរ)ប៉ុន្តតៃគួសំរាកអាយហានចុ្រនៃន,បុរសិនបីមិនមានបញ្ហាគួរចញ្ចេពីមនុទីពទុ្យកុរាយពលេសំរាលបុរហាលៃ៣ថ្ងៃ។

Q ២.កុរាយពលេសំរាលកូន,គួរកុសាអនាម័យយានីដាយដូចមុតចេ?

A ចំលីយ-កុរាយពលេសំរាលកូនតួរបុ្រីបុរាស់សំឡីអនាម័យដីមុ្បីសួ្រួបឈាមដលៃហួរចញ្ចេមក,ហ៊ីយឧសុសាហ៍ផ្តួរសំឡី។កុរាយពលេបត់ជីង,បុ្រីទឹកអ៊ុនៗឬទឹកសំលាប់មរោគលាងយានីពីមុខទៅកុរាយ។

Q ៣.តីគួរកុសាអនាម័យខុលូនបុរាណយ៉ាងដូចមុតចេ?

A ចំលីយ-នៅពលេកូនខុចី,មុជទឹកមិនអាចតុរាំកុនុងទឹកទ,ដីមុ្បីការពារកុំអាយមរោគចូលកុនុងសុ្បូនបណ្តាលអាយរលោកសុ្បូន។កុរាយពលេកក់សក់តួរវុ្រំសំសក់អាយសុងួតកុ្រាមៗ។

Q ៤.គួរទទួលទានអាហារយ៉ាងដូចមុតចេកុរាយពលេសំរាលកូន?

A ចំលីយ-គួរទទួលទានអាហារគ្រប់បុ្រភទេ។កុរាយពលេសំរាលកូនតវៃងតសៃ្រកេទឹក,គួរផឹកទឹក,ទឹកដោះគានិងបបរកុ្តា។(ដលៃជាអាហារងាយសួ្រលកុនុងការំលាយអាហារ។ល។)អាយហានចុ្រន។

Q ៥.កុរាយពលេសំរាលកូន,តីអាចចាប់ផ្តើមមានអំពីផ្លូវភេទពីពលេណា?

A ចំលីយ-នៅពលេឥតមានឈាមហូរ,ពលេសុ្បូនជាសៈសុ្បីយទីបអាចមានអំពីផ្លូវភេទ,ជាទូទៅកុរាយពលេកូនគ្រប់ខ,ៃបីមិនអញ្ចឹងទនើងឆ្លងឯរាគឬចញ្ចេឈាម។

Q ៦.ហាតុអ៊ីតួរហាត់បុរាណកុរាយពលេសំរាលកូន?

A ចំលីយ-ហាត់បុរាណកុរាយពលេសំរាលកូនអាចមានចលនាសាច់ដុំកុ្រាលពៈ,ធុ្រីអាយរួញសុ្បូន,រកុ្សារាងកាយដ៏សុ្អាត។ឬចញ្ចេឈាម។

避孕方法簡介

滿月後不管有無哺餵母乳，月經來潮之前均可能會懷孕，故不能等月經來潮之後才開始避孕，可先使用保險套避孕。

避孕方式可因個人體質、需求及時間的不同而有不同的選擇，建議與相關醫療人員諮詢後，採取對本身適合的避孕方式。

常用的避孕方式有下列幾種：

● 子宮內避孕器：

係利用銅T、銅7、母體樂等裝置，干擾受精卵著床，而達到避孕的目的。可於產後滿六星期後裝置，避孕效果可達95%以上。

● 口服避孕藥：

係利用賀爾蒙控制排卵週期，而達到避孕的目的。須經醫生診斷並開立處方後再服用，按規定正確服用時，避孕效果可達99%以上。但罹患心臟病、糖尿病及正在哺餵母乳的婦女不宜使用。

● 保險套：

由阻止精子與卵子的結合，而達到避孕的目的。正確使用時，效果可達87%以上，並可以避免感染性病及愛滋病。

● 輸精(卵)管結紮手術：

以阻斷精子與卵子的結合途徑，而達到避孕的目的。適用於不再生育者，效果幾乎可達100%。

珍愛媽媽，就是給寶寶最好的禮物。

ការបកស្រាយអំពីវិធីការពារកុំអោយមានផ្ទៃពោះ

រាយពលេកូនគ្រប់ខមែនថាបំបៅដោះឬឥត,មុនពលេមករដូវក៏អាចមានផ្ទៃពោះដរែ,ដូចនេះសូមកុំចាំដល់ក្រាយពលេមករដូវទើបធ្វើការការពារ,គួបុរីបុរាស់សុរាមអនាម័យការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះ។

ការពន្យាកំណើតមានជម្រើសខុសៗគ្នាទៅតាមរាងកាយ តម្រូវការនិងពលេវលោរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ សូមធ្វើការពិគ្រោះជាមួយគ្រូពទ្យ ក្នុងការជ្រើសរើសយកវិធីពន្យាកំណើតដលែសាកសមចំពោះខ្លួន។

វិធីការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះទូទៅប៉ុន្មានបុរេទេ

បុរដាប់ការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះក្នុងស្បូន

គឺបុរីបុរាស់ទង់ដងែT.ទង់ដងែ7,កងមុតាយ។ល។ដើម្បីទប់សាក់កុំអាយទឹកកាមជួបពង,ហើយអាចការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះហាន។អាចបុរីបុរាស់ហានក្រាយពលេសំរាលកូន៦សបុតាហ៍,បុរសិទ្ធភាពការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះលើសពី95%។.

ទទួលទានថ្នាំការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះ

គឺបុរីបុរាស់ហូមួនគ្រប់គ្រងវលោមានពង,ដើម្បីការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះ។តួរការការតួរតពិនិត្យពីគ្រូពទ្យនិងបុរីបុរាស់ថ្នាំដលែគ្រូពទ្យបីកអាយ,បុរីបុរាស់តាមវលោទីបអាចមានបុរសិទ្ធភាព99%។ប៉ុន្តជែនមានជំងឺបេះដូង,ជំងឺទឹកនាមជុអមែនិងសុរតីកំពង់បំបៅដោះមិនអាចបុរីបុរាស់ហានទេ។

សុរាមអនាម័យ

តាមរយៈទប់សាក់ទឹកកាមនិងពងកុំអាយរួមគ្នា,ដើម្បីការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះ។បុរីបុរាស់អាយហានតុរីមតួរ,នឹងមានលទ្ធផលលើសពី87%,ហើយអាចចៀសវាងឆ្លងជំងឺផ្លូវរេទេនិងជំងឺអដេស៍។

វះកាត់ចងទឹកកាម(ពង)

តាមរយៈសុទះផ្លូវទឹកកាមនិងពងកុំអាយរួមគ្នា,ដើម្បីការពារកុំអាយមានផ្ទៃពោះ។បុរីបុរាស់ទៅលើអ្នកដលែមិនចង់មានកូនទៀត,លតុថផល100%។

ស្រលាញ់អ្នកមតាយ,គឺជាការដ្ឋជំ ល្អ

母嬰親善醫療院所

縣市別	總院所數	院所數	院所名稱	效期
臺北市	21	15	基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院、臺北市立聯合醫院陽明院區、國泰醫療財團法人國泰綜合醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院、協和婦女醫院、財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金會馬偕紀念醫院、臺北市立聯合醫院(和平婦幼院區)、中山醫療社團法人中山醫院、三軍總醫院附設民眾診療服務處、臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理、臺北榮民總醫院、臺北醫學大學附設醫院、長庚醫療財團法人臺北長庚紀念醫院、三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處、臺北市立聯合醫院中興院區	107年底
		2	博仁綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院臺北分院	106年底
		4	臺北市立聯合醫院仁愛院區、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院、振興醫療財團法人振興醫院、財團法人康寧醫院	109年底
新北市	22	14	儷生婦產科診所、蕙生醫院、遠華婦幼診所、辰祐婦產科診所、良品婦幼聯合診所、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院、菡生婦產科診所、佛教慈濟醫療財團法人臺北慈濟醫院、曜生婦產科診所、天給婦產科診所、衛生福利部臺北醫院、榜生婦產科診所、劉遠祺婦產科診所、麥婦產科診所	107年底
		2	御生婦幼診所、遠興婦產科診所	106年底
		6	國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院、財團法人天主教耕莘醫院、財團法人天主教耕莘醫院永和分院、行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院、樂寶兒婦幼診所、財團法人基督長老教會馬偕紀念醫院淡水分院	109年底
基隆市	3	2	衛生福利部基隆醫院、王立文婦產科診所	107年底
		1	長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	109年底

មន្ទីពេទ្យថៃទាំមុតាយនិងទារក

ខេត្តកុរុង	ចំនួនមន្ទីពេទ្យ	ចំនួនសាខាមន្ទីពេទ្យ	មានមន្ទីពេទ្យ	ឯខ្លួនែនាំមានប្រសិទ្ធភាព
ទីកុរុងតបៃ	២១	១៥	សមាគមន៍សាសនាគ្រិស្តហ្វូលីងអានសីយីមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រមន្ទីរពេទ្យតអែន សហគាមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងចឹងកុរុងតបៃ អង្គការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រកាថៃ មន្ទីរពេទ្យទូទៅកាថៃ មន្ទីរពេទ្យភូជាប់កុនុងមហាវិទ្យាល័យជាតិតសវ៉ាន់ មន្ទីរពេទ្យសុគ្រីសៀហ៍មន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណម៉ាជ៊ុ សហមន្ទីរពេទ្យកុរុង((មន្ទីរពេទ្យតំបន់សុគ្រីកុមារហ៊ីកឹង) មន្ទីរពេទ្យជុងសានន្ទសៃហគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រជុងសាន មន្ទីរពេទ្យធំទាហានភូជាប់កុនុងការិយាល័យសវោពិនិត្យសុខភាពបុរជាជន មន្ទីរពេទ្យវ៉ែនហ្គាងកុរុងតបៃ បុរគល់សំទុធ្យមូលនិធិមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រកុរុងតបៃគ្រប់គ្រង មន្ទីរពេទ្យអតីតយុទ្ធជនឡុងជុងកុរុងតបៃមន្ទីរពេទ្យភូជាប់កុនុងមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រតបៃ អង្គការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រឆាងកឹងមន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណឆាងកឹងតបៃ មន្ទីរពេទ្យធំទាហានសាខាពេទ្យសុងសានភូជាប់កុនុងការិយាល័យសវោពិនិត្យសុខភាពបុរជាជនសហភាពមន្ទីរពេទ្យជុងសឹងកុរុងតបៃ	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		២	មន្ទីរពេទ្យទូទៅបីរីនសាខាមន្ទីរពេទ្យកុរុងតបៃសុចិតកុនុងសាកលវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រចិន	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		៤	សហមន្ទីរពេទ្យជាតិកុរុងតបៃ ពេទ្យតំបន់នីនអៃ មន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណអ៊ូបាំរសឹនកឹងនអែងគការមូលនិធិពេទ្យសីនកឹង មន្ទីរពេទ្យជីនសីនអែងគការមូលនិធិពេទ្យជីនសឹង មន្ទីរពេទ្យខាងនីងនអែងគការមូលនិធិ	ចុងឆ្នាំ២០២០
កុរុងតប៉ែថ្មី	២២	១៤	គុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីលីសឹង មន្ទីរពេទ្យហ្គាយសឹង គុលីនិកមាតានិងកូមារយៀនហ្គាវ៉ែ គុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីឆឺនយ៉ូសហគុលីនិកមាតានិងកុមារលាំងកឹងមន្ទីរពេទ្យយ៉ាតុងរំលឹកគុណលាកស៊ុយយៀនជីនមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រឱសថសាស្ត្រអង្គការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រគុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីហាន់សឹង មន្ទីរពេទ្យឆឺជីតបៃ នអែងគការមូលនិធិឆឺជីពុះពុទ្ធសាស គុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីយីវសឹង គុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីជៀនកឺ កុរសួងសុខាភិបាលនិងសុខមាលភាពមន្ទីរពេទ្យតបៃ គុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីប៉ាំងសឹង គុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីលាវយៀនឈី គុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីម៉ៃ	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		២	គុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីអ៊ុយសឹង គុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីយៀនសឹង	ចុងឆ្នាំ២០១៧
		៦	មន្ទីរពេទ្យទូទៅកាថៃនៃមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រកាថៃសឹងឹង មន្ទីរពេទ្យកឹងសីននអែងគការមូលនិធិកាតូលិក សាខាពេទ្យយ៉ុងហ៊ីនអែងគការមូលនិធិកាតូលិក មន្ទីរពេទ្យសឹងជ្យៀនកុនៃនមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រមន្ទីរពេទ្យអឺនជ្ជកុង គុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីឡឺប៉ាអឺ មន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណម៉ាជ៊ុសាខាពេទ្យតាន់សួយនអែងគការមូលនិធិមន្ទីរវេជ្ជសាស្ត្រ	ចុងឆ្នាំ២០២០
កុរុងជីឡុង	៣	២	កុរសួងសុខាភិបាលនិងសុខមាលភាពមន្ទីរពេទ្យជីឡុង គុលីនិកសមុភពនិងភគស្ករតីវែងលីន	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		១	មន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណឆាងកឹងជីឡុងនអែងគការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រឆាងកឹង	ចុងឆ្នាំ២០២០

母嬰親善醫療院所

縣市別	總院所數	院所數	院所名稱	效期
桃園市	12	9	吳鳳昕婦產科診所、宏其醫療社團法人宏其婦幼醫院、周龍生婦產科診所、宋俊宏婦幼醫院、臺北榮民總醫院桃園分院、沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院、天成醫院、怡仁綜合醫院、長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	107年底
		2	陳昌平婦產科診所、福太醫院	106年底
		1	秉坤婦幼醫院	109年底
新竹市	4	3	江婦產科診所、財團法人馬偕紀念醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處	107年底
		1	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	109年底
新竹縣	2	2	東元綜合醫院、臺北榮民總醫院新竹分院	107年底
苗栗縣	2	1	財團法人為恭紀念醫院	107年底
		1	周博治婦產科診所	109年底
臺中市	17	12	光田醫療社團法人光田綜合醫院（大甲院區）、國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處、中國醫藥大學附設醫院、澄清綜合醫院、臺中榮民總醫院、衛生福利部臺中醫院、中山醫學大學附設醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、佛教慈濟醫療財團法人臺中慈濟醫院、莊婦產科診所、衛生福利部豐原醫院、優生婦產科聯合診所	107年底
		3	新惠生醫院、呂維國婦產科診所、林聖凱婦幼診所	106年底
		2	仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院（沙鹿院區）	109年底
彰化縣	4	4	秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	107年底

មន្ទីពេទ្យថ្មៗទាំមុតាយនិងទារក

ខេត្តក្រុង	ចំនួនមន្ទីពេទ្យ	ចំនួនសាខាមន្ទីពេទ្យ	មាៈមន្ទីពេទ្យ	ឆ្នាំដែលបានប្រសិទ្ធភាព
ស្រុកថាឃ្មៀន	១២	៩	គ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្រុតីអ៊ុហ្វុងសឺន មន្ទីរពេទ្យមាតានិងកុមារហ៊ុងឈឺនអែងគការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រហ៊ុងឈឺ គ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្រុតីចូឡុងសឺង មន្ទីរពេទ្យមាតានិងកុមារស៊ុងជុនហ៊ុង មន្ទីរពេទ្យអតីតយុទ្ធជនឡុងជុងក្រុងតបៃសាខាពេទ្យថាឃ្មៀន មន្ទីរពេទ្យសឹងប៉ាលុយនិងសៃមាតមន្ទីមូលនិវេជ្ជសាស្ត្រដូនជីសាអឺទីសឹងប៉ាលុយ មន្ទីរពេទ្យផ្ទៀនឈឺង មន្ទីរពេទ្យថ្មៗទាំអឺយីន មន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណឆាងកឹងឆ្ងាងកឹងខ្វនអែងគការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រឆាងកឹង	ចុងឆ្នាំ២០១៧
		២	គ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្រុតីឆីនឆាងភិង មន្ទីរពេទ្យហ្សូថៃ	ចុងឆ្នាំ២០១៧
		១	មន្ទីរពេទ្យមាតានិងកុមារព័ងឈុន	ចុងឆ្នាំ២០២០
ក្រុងសឺនជូ	៤	៣	គ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្រុតីជាំង មន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណម៉ាជ៊ុសាខាពេទ្យសឺនជូមន្ទីរពេទ្យទាហានជាតិទូទៅសឺនជូសាខាពេទ្យជំរឹងភ្នំជាប់កុន្ទុងការិយាល័យសង្គមពិនិត្យសុខភាពប្រជាជន	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		១	សាខាពេទ្យសឺនជូមន្ទីរពេទ្យភ្នំជាប់កុន្ទុងមហាវិទ្យាល័យជាតិតវ៉ាន់	ចុងឆ្នាំ២០១៥
ស្រុកសឺនជូ	២	២	មន្ទីរពេទ្យទូទៅតុងឃ្មៀន មន្ទីរពេទ្យអតីតយុទ្ធជនឡុងជុងកុរុងតបៃសាខាពេទ្យសឺនជូ	ចុងឆ្នាំ២០១៨
ស្រុកមវៃលើ	២	១	មន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណនអែងកាមូលនិធិវៃក្រែង	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		១	គ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្រុតីចូព័រជឺ	ចុងឆ្នាំ២០២០
កុរុងតបៃ	១៧	១២	មន្ទីរពេទ្យទូទៅកំងជ្មៀន(ពេទ្យតំបន់តាជ៎)នសៃហគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រកំងជ្មៀនមន្ទីរពេទ្យទាហានជាតិទូទៅ តជ្រៃសាខាពេទ្យជំរឹងភ្នំជាប់កុន្ទុងការិយាល័យសង្គមពិនិត្យសុខភាពប្រជាជនមន្ទីរពេទ្យស្ថិតកុន្ទុងសាកលវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រចិនមន្ទីរទូទៅឈឺងឈឺងមន្ទីរពេទ្យអតីតយុទ្ធជនឡុងជុងតជ្រែងកុរុងសុខុមាលភាពនិងសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យតជ្រែងសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រជុងសានដលៃហានភ្នំជាប់ទាំមន្ទីរពេទ្យតុងជុងហឺសង្គមវេជ្ជសាស្ត្រចូហាប់មន្ទីរពេទ្យតុងជុងហឺព្រះពុទ្ធសាសនាឈឺជីវេជ្ជសាស្ត្រនមួលនិធិចូហាប់តចែងមន្ទីរពេទ្យឈឺជីជំងសមុកពគ្លីនិកកគស្រុតីសុខភាពនឹងស្ទូមាភាពបស់ក្រុងសួងមន្ទីរពេទ្យហ៊ុងយនេយ៉ូសិនសមុកពគ្លីនីកសាខារួមគ្នា	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		៣	មន្ទីរពេទ្យស្ទឹងហ៊ុយសិនលីអ៊ុយគ័រសមុកពគ្លីនិកកគស្រុលីងសិនខាយគ្លីនិកម៉ាតានឹងកុមា	ចុងឆ្នាំ២០១៧
		២	មន្ទីរពេទ្យឡិនអាយសង្គមវេជ្ជសាស្ត្រមូលនិធិចូហាប់នមៃនុស្សមន្ទីរពេទ្យតាលីឡិនអាយ,មន្ទីរពេទ្យកំងធានសង្គមវេជ្ជសាស្ត្រមូលនិធិចូហាប់មនុស្សនមៃមន្ទីរពេទ្យកំងធានទូទៅ(សាលាស្រុកសាល)	ចុងឆ្នាំ២០២០
ស្រុកចាំងហ្វា	៤	៤	មន្ទីរពេទ្យសៀវព័លសង្គមវេជ្ជសាស្ត្រមូលនិធិចូហាប់នវៃមនុស្សមន្ទីពេទ្យជីនៀនសៀវព័លមន្ទីរពេទ្យចាំងហ៊ាវជីទូចវៃសង្គមវេជ្ជសាស្ត្រមូលនិធិចូហាប់នមៃនុស្សមន្ទីរពេទ្យជីទូចវៃអឺលីងមន្ទីរពេទ្យសៀវព័លសង្គមវេជ្ជសាស្ត្រមូលនិធិចូហាប់នមៃនុស្សមន្ទីពេទ្យចាំងព័ងសៀវព័រជីនៀនចាំងហ៊ាវជីទូចវៃសង្គមវេជ្ជសាស្ត្រមូលនិធិចូហាប់នមៃនុស្សមន្ទីរពេទ្យជីទូចវៃចាំងហ៊ាវ	ចុងឆ្នាំ២០១៨

母嬰親善醫療院所

縣市別	總院所數	院所數	院所名稱	效期
嘉義市	3	3	戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院、信合美診所	107年底
南投縣	4	3	佑民醫院、竹山秀傳醫院、衛生福利部南投醫院	107年底
		1	新泰宜婦幼醫院	109年底
臺南市	15	10	郭綜合醫院、詠馨婦產科診所、國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營、臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院、臺南市立醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院、佑生婦產科診所	107年底
		3	林錦義婦產科診所、鄭婦產科診所、陳澤彥婦產科醫院	106年底
		2	蘇文彬婦產科診所、康乃心婦產科診所	109年底
雲林縣	2	1	國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	107年底
		1	財團法人天主教若瑟醫院	109年底
高雄市	21	17	德謙醫院、四季臺安醫院、樂生婦幼醫院、高雄市立小港醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）、高雄榮民總醫院、馨蕙馨醫院、國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處、健新醫院、正薪醫院、吳昆哲婦產小兒科醫院、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、高雄市立聯合醫院、生安婦產小兒科醫院、邱正義婦產科診所、優生婦產科醫院、義大醫療財團法人義大醫院	107年底
		1	容婦產科診所	106年底
		3	財團法人天主教聖功醫院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、小港安生婦產科診所	109年底

មន្ទីរពេទ្យថែទាំម្តាយនិងទារក



ខេត្តក្រុង	ចំនួនមន្ទីពេទ្យ	ចំនួនសាខាមន្ទីពេទ្យ	មាះមន្ទីពេទ្យ	ងខែឆ្នាំមានប្រសិទ្ធភាព
ក្រុងជអើ	៣	៣	ចាយទ័រស៊ិនវេជ្ជសាស្ត្រតន្ត្រីមួលនិធិនច្ចៃហាប់មន្ទុស្សមន្ទីរពេទ្យជីទូចវែជអើព្រះវិហាកាតួលិកមូលនិធិកាបងប្អូនសុរិរបស់ប្រទេសចិននៃវេជ្ជសាស្ត្រតន្ត្រីមួលនិធិនច្ចៃហាប់មនុស្សព្រះវិហាកាតួលិកមន្ទីរពេទ្យតាន់មាអីទីងមន្ទីរពេទ្យគ្លីនិកស៊ីងហីម៉ុ	ចុងឆ្នាំ២០១៨
ស្រុកណានថូ	៤	៣	មន្ទីរពេទ្យយ៉ូមីន មន្ទីរពេទ្យជូសានស្យូផ័ន ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពមន្ទីរពេទ្យណានថូ	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		១	មន្ទីរពេទ្យមាតានិងកុមារសីនថអើ	ចុងឆ្នាំ២០២០
ក្រុងតណៃាន់	១៥	១០	មន្ទីរពេទ្យទូទាគួ គ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្ត្រីយ៉ុងសីន មន្ទីរពេទ្យភ្ជាប់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រជាតិឈឹងកុង អង្គការមូលនិធិពេទ្យជីមីមន្ទីរពេទ្យជីមី មន្ទីរពេទ្យលីអានណាន់ក្រុងតណៃាន់ប្រគល់សិទ្ធិឲ្យមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រចិន់ដំណើរការអាជីវកម្មវិហាសាសនាគ្រឹស្ទដតវ៉ៃាន់ អង្គការមូលនិធិពេទ្យសីនឡូ មន្ទីរពេទ្យសីនឡូតណៃាន់ មន្ទីរពេទ្យក្រុងតណៃាន់អង្គការមូលនិធិពេទ្យជីមីមន្ទីរពេទ្យជីមីលារអឺង វិហាសាសនាគ្រឹស្ទដតវ៉ៃាន់ អង្គការមូលនិធិពេទ្យសីនឡូ មន្ទីរពេទ្យសីនឡូម៉ាតូមន្ទីរពេទ្យគ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្ត្រីយ៉ូស៊ឹង	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		៣	លីនិកសម្ភពនិងរាគស្ត្រីលីនជីងអី គ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្ត្រីជឹងមន្ទីរពេទ្យសម្ភពនិងរាគស្ត្រីឈឺនជឹងយៀន	ចុងឆ្នាំ២០១៧
		២	គ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្ត្រីស៊ូវីនពីន គ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្ត្រីខាំងណាសើន	ចុងឆ្នាំ២០២០
ស្រុកអ៊ូនលីន	២	១	មន្ទីរពេទ្យសាខាអ៊ូនលីនភ្ជាប់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រតៃវ៉ាន់	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		១	អង្គការមូលនិធិកាតូលិកមន្ទីរពេទ្យរ៉ាះសឺ	ចុងឆ្នាំ២០២០
ក្រុងកៅស្យុង	២១	១៧	មន្ទីរពេទ្យទីជៀន មន្ទីរពេទ្យសឹជួតអៃាន មន្ទីរពេទ្យមាតានិងកុមារឡឹស៊ឹងមន្ទីរពេទ្យស៊ាវកាំងកាស្យុង(ប្រគល់សិទ្ធិឲ្យអង្គការមូលនិធិមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រឯកជនដំណើរការអាជីវកម្ម មន្ទីរពេទ្យអតីតយុទ្ធជនឡុងជុងកាស្យុងមន្ទីរពេទ្យសីនហ្វយសីន មន្ទីរពេទ្យទាហានជាតិទូទៅកាស្យុងពេទ្យសាខាជ័រអឹងភ្ជាប់ក្នុងការិយាល័យសពោពិនិត្យសុខភាពប្រជាជន មន្ទីរពេទ្យចជៀនសឹនមន្ទីរពេទ្យចជឹងសីន មន្ទីរពេទ្យសម្ភពនិងកុមារអ៊ុយុនជឺ សមាគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រទូទៅលាន់មន្ទីរពេទ្យទូទៅលាន់ អង្គការមូលនិធិពេទ្យឆាងកឹងមន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណឆាងកឹងកាស្យុងសហាមន្ទីរពេទ្យក្រុងកាស្យុង មន្ទីរពេទ្យសម្ភពនិងកុមារស៊ឹងអាន គ្លីនិកសម្ភពឆ្លជឹងអី មន្ទីរពេទ្យសម្ភពយ៉ូស៊ឹង អង្គការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រអឺតាមន្ទីរពេទ្យអឺតា	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		១	គ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្ត្រីរ៉ុង	ចុងឆ្នាំ២០១៧
		៣	អង្គការមូលនិធិកាតូលិកមន្ទីរពេទ្យសឹងកុង អង្គការមូលនិធិមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រឯកជនកាស្យុងភ្ជាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណ គ្លីនិកសម្ភពនិងរាគស្ត្រីអានសឺនស៊ាវកាំង	ចុងឆ្នាំ២០២០

母嬰親善醫療院所

縣市別	總院所數	院所數	院所名稱	效期
屏東縣	4	4	安和醫療社團法人安和醫院、寶建醫療社團法人寶建醫院、屏基醫療財團法人屏東基督教醫院、輔英科技大學附設醫院	107年底
臺東縣	2	2	馬偕紀念醫院臺東分院、財團法人臺東基督教醫院	109年底
花蓮縣	2	2	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院	107年底
宜蘭縣	3	2	國立陽明大學附設醫院、財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院	107年底
		1	財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	109年底
連江縣	1	1	連江縣立醫院	107年底
澎湖縣	1	1	三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處	107年底

註：最新通過「母嬰親善醫療院所」名單，可至國民健康署http://www.hpa.gov.tw/查詢。

មន្ទីពេទ្យថែទាំមុតាយនិងទារក

ខេត្តក្រុង	ចំនួនមន្ទីពេទ្យ	ចំនួនសាខាមន្ទីពេទ្យ	មាន:មន្ទីពេទ្យ	ឆ្នាំដែលទទួលបានការបញ្ជាក់
ស្រុកភីងតុង	៤	៤	សមាគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រអានហឺមន្ទីរពេទ្យអានហឺ សមាគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រប៉ៅជ៊ុនមន្ទីរពេទ្យប៉ៅជ៊ុន អង្គការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រភីងជីមន្ទីរពេទ្យសាសនាគ្រិស្តភីងតុង មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសវិទ្យាហ្សូអីងភូជាប់កុនុងមន្ទីរពេទ្យ	ចុងឆ្នាំ២០១៨
ស្រុកតតែុង	២	២	មន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណម៉ាជ៊ៀសាខាពេទ្យស្រុកតតែុង អង្គការមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យសាសនាគ្រិស្តតតែុង	ចុងឆ្នាំ២០២០
ស្រុកហ័រលាន	២	២	អង្គការមូលនិធិឆឺជុះពុទ្ធសាសនាមន្ទីរពេទ្យឆឺជីហ័រលាន សមាគមន៍សាសនាគ្រីស្ទដំនន័រតវ៉ាន់មូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រមន្ទីរពេទ្យមីនន័រ	ចុងឆ្នាំ២០១៨
ស្រុកអឺឡាន	៣	២	ហាវិទ្យាល័យជាតិយ៉ាងមីងភូជាប់កុនុងមន្ទីរពេទ្យ អង្គការមូលនិធិកាត្ចលិកសមាគមន៍ពេទ្យលីងមន្ទីរពេទ្យលូតុង	ចុងឆ្នាំ២០១៨
		១	អង្គការមូលនិធិលូស៊ុយមន្ទីរពេទ្យប៊ូអរលូតុង	ចុងឆ្នាំ២០២០
ស្រុកលានជាំង	១	១	មន្ទីរពេទ្យស្រុកលានជាំង	ចុងឆ្នាំ២០១៨
ស្រុកផុងភូ	១	១	មន្ទីរពេទ្យធំទាហានពេទ្យសាខាផុងភូភូជាប់កុនុងការិយាល័យសេវាពិនិត្យសុខភាពប្រជាជន	ចុងឆ្នាំ២០១៨

ចំណាំ:ទីបចញ្ចេញថ្មី"សុធនុទ:មាតានិងសុថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ"អាចចូលទៅរកបញ្ជីឈ្មោះនៅមន្ទីរសុខាភិបាលជាតិ http://www.hpa.gov.tw/ រារែក។

社區心理衛生中心

縣市	電話	地址
臺北市	02-33936779#11	臺北市中正區金山南路一段5號
新北市	02-22572623	新北市板橋區英士路192-1號
臺中市	04-25155148	臺中市豐原區瑞安街143號
臺南市	06-3352982(林森) 06-6377232(東興)	臺南市東區林森路一段418號 臺南市新營區東興路163號
高雄市	07-3874649~50	高雄市三民區大順二路468號8樓-2
宜蘭縣	03-9367885	宜蘭縣宜蘭市女中路二段287號
基隆市	02-24300193~5	基隆市安樂區安樂路二段164號5樓
桃園市	03-3325880	桃園市桃園區縣府路55號
新竹縣	03-6567138	新竹縣竹北市光明七街1號
新竹市	03-5234647	新竹市集賢路3號
苗栗縣	037-332565 037-332621	苗栗縣苗栗市國福路6號
南投縣	049-2205885	南投縣南投市復興路6號
彰化縣	04-7127839	彰化縣彰化市中山路二段162號2樓
雲林縣	05-5370885	雲林縣斗六市府文路34號
嘉義縣	05-3621150	嘉義縣太保市祥和二路東段3號
嘉義市	05-2328177	嘉義市德明路1號
屏東縣	08-7370123	屏東縣屏東市自由路272號
臺東縣	089-336575	臺東縣臺東市博愛路336號
花蓮縣	03-8351885	花蓮縣花蓮市林森路391號
澎湖縣	06-9269051	澎湖縣馬公市中正路115號
金門縣	082-337885	金門縣金湖鎮中正路1-1號2樓
連江縣	083-626643	連江縣南竿鄉復興村216號

មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពចិត្តវិជ្ជានសៃហគ្រាមន៍

ស្រុកក្រុង	ទូរស័ព្ទ	អាស័យដ្ឋាន
ទីក្រុងតបៃ	02-33936779#11	ផ្ទះលេខ៥ផ្លូវជើងសានណាន១សង្កាត់ចុងចឹងទីក្រុងតបៃ
ទីក្រុងសីនបី	02-22572623	ផ្ទះលេខ192-1ផ្លូវអឺងសឺសង្កាត់ប៉ានឈវែទីក្រុងសីនបី
ទីក្រុងថច្បែង	04-25155148	ផ្ទះលេខ143ផ្លូវយួយអានសង្កាត់ហ្រុងយានទីក្រុងថច្បែង
ទីក្រុងថណាន	06-3352982 (Linsen) 06-6377232(Dongxing)	ផ្ទះលេខ418ផ្លូវលីនសឹន១សង្កាត់តុងទីក្រុងថណាន ផ្ទះលេខ163 ផ្លូវតុងសឹង ខណ្ឌសីនអឹង ក្រុងតណាន
ទីក្រុងការសុង	07-3874649~50	ផ្ទះលេខ468ជាន់ទី8ផ្លូវតាសុន២សង្កាត់សានមីនទីក្រុងការសុង
ស្រុកអីឡាន	03-9367885	ផ្ទះលេខ287ផ្លូវសឹងហ្វូទីក្រុងអីឡានស្រុកអីឡាន
ទីក្រុងជីឡុង	02-24300193~5	ផ្ទះលេខ164ជាន់ទី5ផ្លូវអានលឺ២សង្កាត់អានលឺទីក្រុងជីលុង
ស្រុកថាវយាន	03-3325880	ផ្ទះលេខ55ផ្លូវហ្ស៊ីទីក្រុងថាវយានស្រុកថាវយាន
ស្រុកសីនជូ	03-6567138	ផ្ទះលេខ1ផ្លូវគ័ងមីងជាទីក្រុងជូបីស្រុកសីនជូ
ទីក្រុងសីនជូ	03-5234647	ផ្ទះលេខ៣ផ្លូវជីសៀនទីក្រុងសីនជូ
ស្រុកមវៃលី	037-332565 037-332621	ផ្ទះលេខ6ផ្លូវគ័ហ្ស៊ីទីក្រុងមវៃលីស្រុកមវៃលី
ស្រុកណានថូវ	049-2205885	ផ្ទះលេខ6ផ្លូវហ្ស៊ីសីនទីក្រុងណានថូវស្រុកណានថូវ
ស្រុកចាងហ៎	04-7127839	ផ្ទះលេខ162ជាន់ទី2ផ្លូវចុងសាន២ទីក្រុងចាងហ៎ស្រុកចាងហ៎
ស្រុកអីលាន	05-5370885	ផ្ទះលេខ34ផ្លូវហ្ស៊ីរីនទីក្រុងតូរលីវស្រុកអីនលីន
ស្រុកជអើ	05-3621150	ផ្ទះលេខ3ផ្លូវសិងៃហឺ២ទីក្រុងថប៉ៅស្រុកជអើ
ទីក្រុងជអើ	05-2328177	ផ្ទះលេខ១ផ្លូវតឺមីងទីក្រុងជអើ
ស្រុកភីងតុង	08-7370123	ផ្ទះលេខ272ផ្លូវជីយូវទីក្រុងភីងតុងស្រុកភីងតុង
ស្រុកភីងតុង	089-336575	ផ្ទះលេខ336ផ្លូវប៉ះអាយទីក្រុងថតែងស្រុកថតែង
ស្រុកហ៎លាន	03-8351885	ផ្ទះលេខ391ផ្លូវលីនសឹនទីក្រុងហ៎លានស្រុកហ៎លាន
ស្រុកធឹងហ្ស៊ូ	06-9269051	ផ្ទះលេខ115ផ្លូវចុងចឹងទីក្រុងម៉ាកុងស្រុកធឹងហ្ស៊ូ
ស្រុកជឹងមឺន	082-337885	ផ្ទះលេខ1-1ជាន់ទី2ផ្លូវចុងចឹងឃុំជឹងហ្ស៊ូស្រុកជឹងមឺន
ស្រុកជ័ងលាន	083-626643	ផ្ទះលេខ216ភូមិហ្ស៊ូសីនឃុំណានឈានស្រុកលានជ័ង

高危險妊娠

隨著懷孕週數增加，孕婦的身體會因為胎兒成長而增加許多額外的工作，例如孕婦的心臟負擔在懷孕後期快速的增加、胎兒所有的新陳代謝必須經由母體的腎臟排出、胎兒生長所需的營養也必須由母體提供等。孕婦的身體會很努力的去適應這些懷孕的變化，但是如果孕婦原本就有某些疾病，如先天性心臟病、慢性腎臟病等，就可能會因為懷孕而導致臨床症狀加重。另外，孕婦也會因懷孕而出現如妊娠糖尿病、妊娠高血壓等疾病，這些都屬母體因素的高危險妊娠。

一般而言，大多數懷孕的胎兒都是正常的，但是也有少數的胎兒患有先天性疾病或有未足月早產之徵象，這是屬胎兒因素的高危險妊娠。

當醫師告知您有上述情形時，表示本次懷孕可能是高危險妊娠，需要經由完整的產前檢查，來早期預防懷孕過程可能發生之併發症，並建議在人力及設備較完善的醫療院所生產，如此，母親及嬰兒的安全較可獲得保障。

下列名單是經過衛生福利部「醫院緊急醫療能力分級評定基準」分級之「高危險妊娠孕產婦及新生兒照顧品質中度級、重度級急救責任醫院」，當您在懷孕過程中出現任何緊急狀況時，這些責任醫院可提供您較完善的緊急醫療照護服務，準爸媽可依您的妊娠情況，選擇就近的責任醫院接受檢查及生產。

សុរតីមានផ្ទៃពោះដែលមានគ្រុនថ្នាក់

ខ្លួនឫភាណសុត្ថីមានផ្ទៃពោះនឹងបន្ថមែការងារជាច្រើនដាយសាទារកកុនុងផ្ទៃដែំឡើងៗជារាងរាល់សបុគាហ៍,ឧទាហរណ៍បេះដូងមានសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនមានលឿនៗនាំដំណាក់កាលកុរាយនាំពលេមានផ្ទៃពោះ,ទារកកុនុងដុតរំលាយអាហារកុនុងកាយតាមរយៈកុរលៀនមុតាយ,ជីវជាតិដំរូវការលូតលាស់របស់ទារកកុនុងផ្ទៃកៃ៏ត្រូវផ្គត់ផ្គង់ឡើងតាមរយៈមុតាយ។ល។ខ្លួនមុតាយអាចខឹតខំសំរួលខ្លួនទៅនឹងការបុរប្រែួលនាំពលេមានផ្ទៃពោះ,ប៉ុន្តបែុរសិនបីសុរតីមានផ្ទៃពោះមានជំងឺពីមុន,ដូចជាជំងឺបេះដូង,ជំងឺកុរលៀន។ល។ក៏បុរហលែជាមកពីជំងឺមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនដាយសាមានផ្ទៃពោះ។ម៉ុយាងវិញទៀត,សុត្ថីមានផ្ទៃពោះក៏អាចមានជំងឺទឹកនាមផ្អមែ,ជំងឺលិសឈាម។ល។ដាយសាមានផ្ទៃពោះ,ទាំងនេះសុទ្ធតែជាគ្រុនថ្នាក់ខ្ពស់ដាយសាមូលហតេុសុខភាពខ្លួនមុតាយ។

ជាទូទៅ,ទារកកុនុងផ្ទៃភាគច្រើនសុទ្ធតែធមែមតាទ,ប៉ុន្តមានទារកកុនុងផ្ទៃមែួយចំនួនមានជំងឺពីធមែមជាតិឬមានសភាពកីតមិនគ្រប់ខ,ែនេះជាគ្រុនថ្នាក់ដាយសាសុខភាពទារក។

នាំពលេដែលគ្រូពទេ្យហុរប់អ្នកពីសុថានភាពដូចខាងលើ,មានន័យថាការផ្ទៃពោះលើកនេះបុរហលែជាមានគ្រុនថ្នាក់ខ្ពស់,ត្រូវត្រួតពិនិត្យមុនពលេសំរាលកូនដាយលុអឹតលុអន់,ដើមុបីការពារកុំអាយមានអាការៈកីតឡើងកុនុងអំលុងពលេមានផ្ទៃពោះ,ហើយអាយយាបល់សំរាលកូននាំមនុទីពទេ្យដែលមានបុគ្គលិកនិងបរិកុខាជំលុអឥតខុចាៈ,សុវត្ថិភាពមុតាយនិងទារកក៏អាចត្រូវបានការពារ។

ឈ្មាៈខាងកុរាមនេះជា(មនុទីពទេ្យទទួលខុសត្រូវថែទាំសុត្ថីនិងទារកមានគ្រុនថ្នាក់ខ្ពស់,សង្គ្រុនជាបនុទាន់ផ្ទុនកៃមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរ)ដែលមានបងៃចកៃកំរិត(កំណត់ឡើងដាយការវិភាគកំរិតលត្ថភាពការពុយាបាលជាបនុទាន់របស់មនុទីពទេ្យ)កំណត់ឡើងដាយមនុទីសុខាភិបាល,កុនុងអំលុងពលេអ្នកមានផ្ទៃពោះមានអាការៈបនុទាន់ណាមួយ,មនុទីពទេ្យទទួលខុសត្រូវទាំងនេះក៏អាចផ្តល់នូវសេវាកមុមថែទាំពុយាបាលជាបនុទាន់ដ៏លុអឥតខុចាៈទៅដល់អ្នក,ឪពុកមុតាយអាចយាងទៅតាមសុថានភាពកុនុងការមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នក,ជុរីសេរីសមនុទីពទេ្យទទួលខុសត្រូវទទួលយកការត្រួតពិនិត្យនិងសំរាលកូន។

高危險妊娠

高危險妊娠孕產婦及新生兒照顧品質中度級、重度級急救責任醫院名單

地區	縣市	中度級	重度級	有效期限
臺北地區	基隆市		長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	107/12/31
	宜蘭縣		財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	106/12/31
	宜蘭縣	國立陽明大學附設醫院		107/12/31
	臺北市		國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	106/12/31
	臺北市		財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金會馬偕紀念醫院	106/12/31
	臺北市		臺北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理	106/12/31
	臺北市		三軍總醫院附設民眾診療服務處	109/12/31
	臺北市		臺北榮民總醫院	109/12/31
	臺北市		國立臺灣大學醫學院附設醫院	109/12/31
	臺北市		新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	109/12/31
	臺北市	基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院		106/12/31
	臺北市	臺北醫學大學附設醫院		111/12/31
	臺北市	長庚醫療財團法人臺北長庚紀念醫院		106/12/31
	新北市		衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)	106/12/31
	新北市		醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	109/12/31
	新北市		財團法人佛教慈濟綜合醫院臺北分院	109/12/31
	新北市	財團法人天主教耕莘醫院		106/12/31
	新北市	國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院		106/12/31
	新北市	財團法人基督長老教會馬偕紀念醫院淡水分院		109/12/31
	新北市	財團法人天主教耕莘醫院永和分院		107/12/31
	金門縣	衛生福利部金門醫院		109/12/31
北部地區	桃園市		長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	109/12/31
	新竹市	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院		107/12/31
	新竹市	財團法人馬偕紀念醫院新竹分院		107/12/31
	新竹縣		東元綜合醫院	107/12/31

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានគ្រោះថ្នាក់

មន្ទីរពេទ្យទទួលខុសត្រូវថែទាំស្ត្រីនិងទារកមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់,សង្គ្រោះជាបន្ទាន់ផ្នែកមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរ

តំបន់	ស្រុកក្រុង	កម្រិតមធ្យម	កម្រិតធ្ងន់	កាលបរិច្ឆេទកំណត់
តំបន់តៃប៉ិ	ក្រុងជីឡុង		អង្គការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រឆាងកឹងមន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណឆាងកឹងជីឡុង	៣១/១២/២០១៨
	ស្រុកអ៊ីឡាន		អង្គការមូលនិធិលូស៊ុយមន្ទីរពេទ្យប៉ូអល្វៃតុង	៣១/១២/២០១៧
	ស្រុកអ៊ីឡាន	ហាវិទ្យាល័យជាតិយ៉ាងមីងភ្ជាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ		៣១/១២/២០១៨
	ក្រុងតៃប៉ិ		អង្គការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រកាថមៃមន្ទីរពេទ្យទូទៅកាថៃ	៣១/១២/២០១៧
	ក្រុងតៃប៉ិ		មន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណម៉ាជៀ	៣១/១២/២០១៧
	ក្រុងតៃប៉ិ		មន្ទីរពេទ្យវៃនហាវ៉ាងក្រុងតៃប៉ិ- ប្រគល់សិទ្ធិឲ្យមូលនិធិមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រឯកជនក្រុងតៃប៉ិគ្រប់គ្រង	៣១/១២/២០១៧
	ក្រុងតៃប៉ិ		មន្ទីរពេទ្យធំទាហានភ្ជាប់ក្នុងការិយាល័យសវៅពនិត្យសុខភាពប្រជាជន	៣១/១២/២០២០
	ក្រុងតៃប៉ិ		មន្ទីរពេទ្យអតីតយុទ្ធជនឡុងជុងក្រុងតៃប៉ិ	៣១/១២/២០២០
	ក្រុងតៃប៉ិ		មន្ទីរពេទ្យភ្ជាប់ក្នុងមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រតៃវ៉ាន់	៣១/១២/២០២០
	ក្រុងតៃប៉ិ		មូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រសឺនក័ងមន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណអ៊ូហ៊ែរសឺនក័ង	៣១/១២/២០២០
	ក្រុងតៃប៉ិ	សម្ព័ន្ធមន៍សាសនាគ្រិស្ដហាវលីង្គអានស៊ីយមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រមៃមន្ទីរពេទ្យតំអាន		៣១/១២/២០១៧
	ក្រុងតៃប៉ិ	មន្ទីរពេទ្យភ្ជាប់ក្នុងមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រតៃប៉ិ		៣១/១២/២០២២
	ក្រុងតៃប៉ិ	អង្គការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រឆាងកឹងមន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណឆាងកឹងតៃប៉ិ		៣១/១២/២០១៧
	ក្រុងតៃប៉ិថ្មី		ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខមាលភាពមន្ទីរពេទ្យស័ងហ៊ា(ប្រគល់សិទ្ធិឲ្យមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រក្រុងតៃប៉ិសឹងធ្វើអាជីវកម្ម)	៣១/១២/២០១៧
	ក្រុងតៃប៉ិថ្មី		អង្គការមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រមូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រឱស៍ថសាស្ត្រលោកស៊ុយយៀនជឺមន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណយ៉ាតុង	៣១/១២/២០២០
	ក្រុងតៃប៉ិថ្មី		អង្គការមូលនិធិធីជីព្រះពុទ្ធសាសនាមន្ទីរពេទ្យទូទៅសាខាក្រុងតៃប៉ិ	៣១/១២/២០២០
	ក្រុងតៃប៉ិថ្មី	អង្គការមូលនិធិកាតូលិកមន្ទីរពេទ្យកឹងស៊ីន		៣១/១២/២០១៧
	ក្រុងតៃប៉ិថ្មី	មូលនិធិវេជ្ជសាស្ត្រកាថសៃជីងមន្ទីរពេទ្យទូទៅកាថៃ		៣១/១២/២០១៧
	ក្រុងតៃប៉ិថ្មី	អង្គការមូលនិធិមន្ទីរវេជ្ជសាស្ត្រមន្ទីរពេទ្យរំលឹកគុណម៉ាជៀសាខាពេទ្យតាន់ស៊ួយ		៣១/១២/២០២០
	ក្រុងតៃប៉ិថ្មី	អង្គការមូលនិធិកាតូលិកមន្ទីរពេទ្យកឹងស៊ីនសាខាពេទ្យយ៉ុងហ៊ា		៣១/១២/២០១៨
	ស្រុកជីនមីន	ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខមាលភាពមន្ទីរពេទ្យជីនមីន		៣១/១២/២០២០
នាទីក្រុង	ខត្រេតថាយអាន		សហគមណ៍ឆ្វាងកិនពយាបាលជំងឺនាលីនខូវកម្ពុណត់សម្កល់មន្ទីរពេទ្យឆាងកិន	៣១/១២/២០២០
	ក្រុងស៊ីនជូរ	មហាវិទ្យាល័យពេទ្យរដ្ឋននាំមន្ទីរពេទ្យស៊ីនជូរទំពីរ		៣១/១២/២០១៨
	ក្រុងស៊ីនជូរ	មហាវិទ្យាល័យពេទ្យរដ្ឋននាំមន្ទីរពេទ្យស៊ីនជូរទំពីរ		៣១/១២/២០១៨
	ក្រុងស៊ីនជូរ		សហគមណ៍មាជឹកម្ពុណត់សម្កល់មន្ទីរពេទ្យស៊ីនជូរទំពីរ	៣១/១២/២០១៨

高危險妊娠

地區	縣市	中度級	重度級	有效期限
中部地區	臺中市		財團法人私立中山醫學大學附設醫院	106/12/31
	臺中市		臺中榮民總醫院	106/12/31
	臺中市		中國醫藥大學附設醫院	106/12/31
	臺中市		童綜合醫療社團法人童綜合醫院	107/12/31
	臺中市		光田醫療社團法人光田醫院（沙鹿總院）	107/12/31
	臺中市		光田醫療社團法人光田醫院（大甲院區）	107/12/31
	臺中市	財團法人佛教慈濟綜合醫院臺中分院		106/12/31
	臺中市	澄清綜合醫院中港分院		107/12/31
	彰化縣		財團法人彰化基督教醫院	106/12/31
	彰化縣		秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	108/12/31
	彰化縣	秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院		107/12/31
南部地區	雲林縣		國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	106/12/31
	雲林縣	財團法人天主教若瑟醫院		107/12/31
	嘉義市		戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	107/12/31
	嘉義市	財團法人天主教聖馬爾定醫院		107/12/31
	嘉義縣		長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	111/12/31
	嘉義縣		財團法人佛教慈濟綜合醫院大林分院	107/12/31
	臺南市		奇美醫療財團法人奇美醫院	106/12/31
	臺南市		國立成功大學醫學院附設醫院	106/12/31
	臺南市	郭綜合醫院		108/12/31
高屏地區	高雄市		財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	106/12/31
	高雄市		義大醫療財團法人義大醫院	106/12/31
	高雄市		高雄榮民總醫院	106/12/31
	高雄市		長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	106/12/31
	屏東縣		安泰醫療社團法人安泰醫院	106/12/31
	澎湖縣	三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處		106/12/31
東部地區	花蓮縣		財團法人佛教慈濟綜合醫院	106/12/31
	臺東縣	馬偕紀念醫院臺東分院		107/12/31

註：最新通過「急救責任醫院」分區名單，可至衛生福利部醫事司http://www.mohw.gov.tw/cht/DOMA/查詢。

សុរតីមានផ្ទៃពោះដែលមានគ្រុនថ្នាក់

តំបន់	សុរុកក្រុង	កម្មវិតមធ្យម	កម្មវិតធ្ងន់	កាលបរិច្ឆេទកំណត់
កណ្ដាលប្រទេស	កុង់ថង់ចុង		សហគមណ៍ចុងសានមហាវិទ្យាល័យពេទ្យអកែជនសម្រាក់មន្ទីរពេទ្យ	៣១/១២/២០១៧
	កុង់ថង់ចុង		ថង់ចុងមន្ទីរពេទ្យប្រជាជន	៣១/១២/២០១៧
	កុង់ថង់ចុង		មហាវិទ្យាល័យយ៉ិចិនសម្រាក់មន្ទីរពេទ្យ	៣១/១២/២០១៧
	កុង់ថង់ចុង		សមាគមណ៍ពុយាហាលជំងឺកុមារនាមន្ទីរពេទ្យកុមារ	៣១/១២/២០១៨
	កុង់ថង់ចុង		សមាគមណ៍កង់ធានមន្ទីរពេទ្យកង់ធាន (មន្ទីរពេទ្យសុរុបសាំឡ)	៣១/១២/២០១៨
	កុង់ថង់ចុង		សមាគមណ៍កង់ធានមន្ទីរពេទ្យកង់ធាន (មន្ទីរពេទ្យសុរុតតាជំ)	៣១/១២/២០១៨
	កុង់ថង់ចុង	សមាគមណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាថង់ចុងជឹកជិមន្ទីរពេទ្យចម្ការទឹក		៣១/១២/២០១៧
	កុង់ថង់ចុង	ទិនឈឹងមន្ទីរពេទ្យចម្ការចុងកាំងទឹក		៣១/១២/២០១៨
	ខត្តែតចាំងហារ		សមាគមណ៍សាសនាកុិះមន្ទីរពេទ្យង្កងចាំងហារ	៣១/១២/២០១៧
	ខត្តែតចាំងហារ		សមាគមណ៍ពុយាហាលសឹថង់មន្ទីរពេទ្យចម្ការសឹថង់	៣១/១២/២០១៨
	ខត្តែតចាំងហារ	សមាគមន៍ពយាហាលសឹថង់សម្រាក់មន្ទីរពេទ្យចាំងកិនសឹថង់		៣១/១២/២០១៧
លិចប្រទេសេ	ខត្តែតតិនលិន		មហាវិទ្យាលយ៉ិពេទ្យរដ្ឋនសម្រាក់មន្ទីរពេទ្យតិនលិនទឹក	៣១/១២/២០១៧
	ខត្តែតតិនលិន	សមាគមណ៍កាក្លលិចមន្ទីរពេទ្យឡលិន		៣១/១២/២០១៨
	កុង់ជង្រៃអំ		សមាគមណ៍ពុយាហាលចាយទឹសិនមន្ទីរពេទ្យសាសនាកុិះនាជង្រៃអំ	៣១/១២/២០១៨
	កុង់ជង្រៃអំ	សមាគមណ៍ពេទ្យសាសនាកុិះមន្ទីរពេទ្យសិនមាអីទិន		៣១/១២/២០១៨
	ខត្តែតជង្រៃអំ		សហគមណ៍ឆាងកិនពុយាហាលជំងឺនាជង្រៃអំកម្ងល់តសម្រាក់មន្ទីរពេទ្យឆាងកិន	៣១/១២/២០២២
	ខត្តែតជង្រៃអំ		សហគមណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាតាលិនមន្ទីរពេទ្យចម្ការទឹក	៣១/១២/២០១៨
	កុង់ថណាន		សហគមណ៍ពុយាហាលជំងឺឈឺមីមន្ទីរពេទ្យឈឺមី	៣១/១២/២០១៧
	កុង់ថណាន		មហាវិទ្យាលយ៉ិដ្ឋនឈិនកុង់សម្រាក់មន្ទីរពេទ្យ	៣១/១២/២០១៧
	កុង់ថណាន	ក្លមន្ទីរពេទ្យចម្ការ		៣១/១២/២០១៩
កុង់ខត្តែតកាកិន	កុង់កាស្ទឹង		សហគមណ៍កាស្ទឹងមហាវិទ្យាលយ៍អកែជនចូលប់ពេទ្យសម្រាក់ចុងហាសំលល់មន្ទីរពេទ្យ	៣១/១២/២០១៧
	កុង់កាស្ទឹង		សមាគមណ៍ពុយាហាលជំងឺអិតានាមន្ទីរពេទ្យអិតា	៣១/១២/២០១៧
	កុង់កាស្ទឹង		កុង់កាស្ទឹងមន្ទីរពេទ្យចម្ការប្រជាជន	៣១/១២/២០១៧
	កុង់កាស្ទឹង		សមាគមណ៍ពុយាហាលជំងឺឆាងកិនកាស្ទឹងឆាងកិនមន្ទីរពេទ្យសម្រាក់	៣១/១២/២០១៧
	ខត្តែតកិនតុង		សហគមណ៍ពុយាហាលជំងឺអាន់ថនៅមន្ទីរពេទ្យអាន់ថ	៣១/១២/២០១៧
	ខត្តែតធឹងហ្ការ	ធឹងហ្ការមន្ទីរពេទ្យទាហានទិពីរនាកន្លងសម្រាក់លបីរប្រជាជន		៣១/១២/២០១៧
កឹតប្រទេសេ	ខត្តែតហ៊ាន		សមាគមណ៍ប្រពុទ្ធសាសនាមន្ទីរពេទ្យចម្ការជឹកជិះ	៣១/១២/២០១៧
	ខត្តែតចង្កែង	មាជិសម្រាក់ថង្កែងមន្ទីរពេទ្យពេទ្យ		៣១/១២/២០១៨

ចំណាំ៖ទីបចញ្ចេថ្មី"សុឆន្ទ:មាតានិងសុថាប័នរវជ្ជសាសុរត"អាចចូលទៅរកបញ្ជីឈ្មោះនៅមន្ទីរសុខាភិបាលជាតិ http://www.hpa.gov.tw/ រាវរក។

保母托育

保母托育管理與托育費用補助

政府為鼓勵國人生育，自97年4月起補助家庭部分托育費用，以減輕家庭負擔，且為妥善照顧幼童，請選擇合法登記之居家托育服務人員或合格立案之托嬰中心，提供兒童及家長最安全、適合的托育與照顧服務。

如果您或您的朋友需要專業托育人員服務、托育費用補助問題、或有意參加托育人員訓練課程或有照顧幼兒問題之諮詢，可逕向衛生福利部社會及家庭署托育人員(保母)登記管理資訊網(http://cwisweb.sfaa.gov.tw)及衛生福利部社會及家庭署網站(http://www.sfaa.gov.tw)查詢，或就所在縣市政府社會局(處)洽詢。

縣市別	社會局(處)電話	縣市別	社會局電話
臺北市政府	(02)27208889轉1624-1625	雲林縣政府	(05)5522575
新北市政府	(02)29603456轉3678-3681	嘉義縣政府	(05)3620900轉2606
臺中市政府	(04)22289111轉37516	屏東縣政府	(08)7320415轉5321
臺南市政府	(06)2991111轉5903 (06)6322231轉6545-6546	臺東縣政府	(089)341373轉262
高雄市政府	(07)3368333轉2495-2498	花蓮縣政府	(038)228995
宜蘭縣政府	(03)9328822轉454	澎湖縣政府	(06)9274400轉395
桃園市政府	(03)3322101轉6322	基隆市政府	(02)24201122轉2203-2205
新竹縣政府	(03)5518101轉3253	新竹市政府	(03)5216121轉558
苗栗縣政府	(037)559643	嘉義市政府	(05)2254321轉155
彰化縣政府	(04)7240249	金門縣政府	(082)318823轉62570
南投縣政府	(049)2247970	連江縣政府	(0836)25022轉309

ថទាំដាយមុតាយមដោះ

ការគ្រប់គ្រងការថទាំដាយមុតាយមដោះនិងជំនួយការចំណាយអាយមុតាយមដោះ

រដ្ឋថាភិបាលដីមុបីសសីរអាយបុរជោជនបនុតកំនីត នាឆ្នាំ២០០៨ខ ដែមកមានជំណួយទឹកបុរាក់កុនុង កុរុមគ្រួសារដីមុបីកុមារចូលរៀន ដីមុបីសំរាលកុរុមគ្រួសារកុនុងការចំនាយ ដូចមនះអាចអាយកុមាររស់នៅហានសមរួល អញជីញជុំសីរីសកនុលងៃរីសាលាដលៃសុរបចុបាប់អាយកុមារចូលរៀន ធុរីអាយកុមារនិងមតុដាបិតុដាយាងសមរួល ជាកនុលងៃដលៃសមសុរបកុនុងការថរៃកុសារកុមារ

បីរអ្នកនំនឹងមិតុតភក្កំអ្នកនំតុរូវការអាយបុកុគលិកណាមានបទពិសាធន៍កុនុងការបង្រៀនថរៃកុសារ កុនុងមូលហាតុជំនួយចូលរៀន រឺក៍មានចំណូលចិតុតចង់ចូលរៀនរមូលហាតុកុនុងការថរៃកុសារកុមារអោចទំនាក់ទំនង សមាគម៍កុរសួងអនាមយ័ដលៃនាជីតនះរឺសហគមណ៍គ្រួសាររីអ្នកនំថរៃកុសារកុមារ(អ្នកថរៃកុសារ)បុរពណ្ឌនជំចុះឈ្មោះ(http://cwisweb.sfaa.gov.tw)និងបុរពណ្ឌនជំកុរសួងអនាមយ័និងសហគមណ៍គ្រួសា(http://www..sfaa.gov.tw)រកមីលរឺក៍សាកសួរការិយ៉ាល័យរដ្ឋបាលសង្កមកិចុចខតេតកុរុង។

ស្រុកកុរុង	ទូរស័ព្ទទនាយកដ្ឋាន(មនុទី)សង្កមកិចុច	ស្រុកកុរុង	ទូរស័ព្ទមនុទីសង្កមកិចុច
រដ្ឋាភិបាលទីកុរុងតបៃ	(02)27208889, ext. 1624-1625	រដ្ឋាភិបាលស្រុកអិនលីន	(05)5522575
រដ្ឋាភិបាលទីកុរុងសីនប៊ី	(02)29603456, ext. 3678-3681	រដ្ឋាភិបាលស្រុកជអើ	(05)3620900, ext. 2606
រដ្ឋាភិបាលទីកុរុងថចុៃង	(04)22289111, ext. 37516	រដ្ឋាភបាលស្រុកកីងតុង	(08)7320415, ext. 5321
រដ្ឋាភិបាលទីកុរុងថចុៃង	(06)2991111, ext. 5903 (06)6322231, ext. 6545-6546	រដ្ឋាភិបាលស្រុកថតៃុង	(089)341373, ext 262
រដ្ឋាភិបាលទីកុរុងការសុង	(07)3368333, ext. 2495-2498	រដ្ឋាភិបាលស្រុកហ៍លាន	(038)228995
រដ្ឋាភិបាលស្រុកអីឡាន	(03)9328822, ext. 454	រដ្ឋាភិបាលស្រុកជីងហ្ស៊ូ	(06)9274400, ext. 395
រដ្ឋាភិបាលស្រុកថាវយាន	(03)3322101, ext. 6322	រដ្ឋាភិបាលទីកុរុងជីឡុង	(02)24201122, ext. 2203-2205
រដ្ឋាភិបាលស្រុកសីនជូ	(03)5518101, ext. 3253	រដ្ឋាភិបាលទីកុរុងសីនជូ	(03)5216121, ext. 558
រដ្ឋាភិបាលស្រុកមវលី	(037)559643	រដ្ឋាភិបាលទីកុរុងជអើ	(05)2254321, ext. 155
រដ្ឋាភិបាលស្រុកចាងហ៍	(04)7240249	រដ្ឋាភិបាលស្រុកជីងមីន	(082)318823, ext. 62570
រដ្ឋាភិបាលស្រុកណានថូវ	(049)2247970	រដ្ឋាភិបាលស្រុកលានជីង	(0836)25022, ext.309

立案產後護理之家

慎選立案產後護理之家，保障母嬰健康

目前提供產婦產後照顧機構分為產後護理機構及坊間所稱之「坐月子中心」兩類，前者依護理人員法向衛生主管機關申請並核准立案之產後護理機構，提供護理服務；後者為提供膳食及住宿，不得執行護理服務。目前衛生福利部已採取多項有效措施，保障產婦及嬰兒安全及權益，包括99年9月公告「產後護理機構及坐月子中心定型化契約應記載不得記載事項」及「產後護理機構及坐月子中心定型化契約範本」，民眾可至衛生福利部網站查詢(http://www.mohw.gov.tw，路徑：首頁/本部簡介/本部單位及所屬機關/護理及健康照護司/業務資訊/產後護理機構管理)，另有關產後護理機構立案資訊亦可至衛生福利部網站查詢(http://www.mohw.gov.tw，路徑：首頁/醫事機構查詢及醫事人員查詢/醫事機構查詢/機構類別請選「護理機構」，機構名稱請輸入「產後」再開始搜尋，即可查詢到全國產後護理機構)。

為提升產後護理機構照護品質，確保產婦及嬰兒安全，衛生福利部於102年度針對產後護理機構辦理首次評鑑，評鑑結果已公告於衛生福利部網站(http://www.mohw.gov.tw，路徑：首頁/本部簡介/本部單位及所屬機關/護理及健康照護司/產後護理機構評鑑專區)，歡迎民眾瀏覽查詢。衛生福利部呼籲準媽媽們及產婦，為了保障您與寶寶的健康，建議選擇產後護理機構時不要只看機構豪華光鮮的裝潢，最重要的是要選擇安全、專業、有品質且是評鑑合格的機構接受產後照護及服務。

ផ្ទះថទាំកុមារលេសំរាលកូនស្របច្បាប់

ជ្រើសរើសផ្ទះថទាំកុមារលេសំរាលកូនស្របច្បាប់,ការពារសុខភាពម្តាយនិងកូន

បច្ចុប្បន្នកុរស្ងេសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថម្ភ ហានដាក់អនុវត្តដរិធានការជាច្រើនកុនុងការការពារសុវត្ថិភាព និងសិទ្ធិបុរយោជន៍របស់សុដ្រីជាមុដាយនិងទារក ដាយរួមមាន “គំរូកិច្ចសនុយានសៃថាប័នមីលថទាំកុមារលេសម្រាលកូននិងមជ្ឈមណ្ឌលកូនខ្ចី” ដលៃហានផ្សវផ្សាយជាសាធារណៈនាខកៃញញា ឆ្នាំ២០១០។ មហាជនអាចសុវងៃរកហាននាលីគហោទំព័រកុរស្ងេសុខាភិបាលនិងរបរឧបត្ថម្ភ (http://www.mohw.gov.tw ទិសដាៃ ទំព័រដីម/ពតិមានអំពីកុរស្ងេ/សុថាប័ននកៃុរស្ងេនិងសុថាប័នចំណុះ/នាយកដ្ឋានមីលថទាំនិងថទាំសុខភាព/ពតិមានសុដីពីសវោកមុម/ការគ្រប់គ្រងសុថាប័នមីលថទាំកុមារលេសម្រាលកូន) (http://www.mohw.gov.tw ទិសដាៃ ទំព័រដីម/ការសុវងៃរកសុថាប័នសុខាភិបាលនិងការសុវងៃរកបុគ្គលិកសុខាភិបាល/ការសុវងៃរកសុថាប័នសុខាភិបាល/បុរេទេសុថាប័នសូមជ្រើសរើស “សុថាប័នមីលថទាំ” ឈុមាៈសុថាប័នសូមវាយអកុសរ “កុមារលេសម្រាល” រួចចាប់ផ្តើមសុវងៃរក នាៈនឹងអាចសុវងៃរកឃើញសុថាប័នមីលថទាំកុមារលេសម្រាលកូនទូទាងបុរេសេ)

ដីមុបីលើកកមុពស់គុណភាពរបស់សុថាប័នមីលថទាំ ធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់សុដ្រីជាមុដាយនិងទារក។ ឆ្នាំ២០១៣ កុរស្ងេសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថម្ភ ហានធ្វើការវាយតមុលលើកដំបូងទាលីសុថាប័នមីលថទាំកុមារលេសម្រាលកូន ដាយលទ្ធផលនវៃងវាយតមុលនឹងបុរកាសនាកុនុងគហោទំព័ររបស់កុរស្ងេផ្ទាល់ (http://www.mohw.gov.tw, ទិសដាៃ ទំព័រដីម/ពតិមានអំពីកុរស្ងេ/សុថាប័ននកៃុរស្ងេនិងសុថាប័នចំណុះ/នាយកដ្ឋានមីលថទាំនិងថទាំសុខភាព/រងវាយតមុលនៃសៃថាប័នមីលថទាំកុមារលេសម្រាលកូន)។ សូមសវាគមន៍មហាជនចូលអាន។ដីមុបីការពារសុខភាពផ្ទាល់ខុលួននិងទារក កុរស្ងេសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថម្ភហានអំពាវនាវទាៅដល់សុរដីមានគតិនិងសុរដីទីបសម្រាលកូនរួច គប្បីកុំជ្រើសរើសយកសុថាប័នមីលថទាំកុមារលេសម្រាលណាដលៃមានតសៃមបកកុ៉ាបុរណិតឆីតឆាយ តួរជ្រើសរើសសុថាប័នដលៃសុវត្ថិភាព មានជំនាញ មានគុណភាព និងជាប់រងវាយតមុលៃ ដីមុបីទទួលយកសវោកមុមនិងការមីលថទាំកុមារលេសម្រាល។

疑似家庭暴力情事之處理

1. 請於知悉家暴案件等情事後，於24小時內電話通報113保護專線，或連結關懷e起來保護資訊系統網頁（網址http://ecare.mohw.gov.tw/進行線上通報，或請醫院之相關工作人員填妥通報表(可由醫院之社會服務室相關部門提供)，逕傳真至各縣市政府家庭暴力及性侵害防治中心，辦理通報事宜，俾提供被害人妥適服務。
2. 依家庭暴力防治法第50條規定，醫事人員有通報義務。未依規定通報者，依同法第62條第1項規定，由直轄市、縣(市)主管機關處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰。但醫事人員為避免被害人身體緊急危難而違反者，不罰。
3. 醫事人員執行醫療義務時，如發現有依法所應強制通報之家暴案件，若當事人表達不願意被通報，可於通報表上註明當事人無意願通報，以提醒各直轄市、縣(市)政府家庭暴力及性侵害防治中心後續處理之技巧。如發現親密關係暴力案件，為儘早辨識高危機個案，應施予臺灣親密關係暴力危險評估表(TIPVDA)，並於次月10日前至衛生福利部家庭暴力資料庫系統完成填報。

វិធីកុនុងការសងស័យថាមានអំពីហិង្សាកុនុងគ្រួសារ

១. រាយពលេដឹងអំពីសុថានការណ៍ទាក់ទងនឹងអំពីហឹង្សាកុនុងគ្រួសារ សូមទូរស័ព្ទមកខុសទ្ងៃ រស័ព្ទគាំពារលេខ ១១៣ ឬ តុជាប់ទាគេហទំព័រនប្ងៃព័ន្ធពតិមានគាំពារនិងយកចិត្តទុកដាក់e (គេហទំព័រhttp://ecare.mohw.gov.tw/)ធ្វើការរាយការណ៍,ឬសូមអ្នកធ្វើការកុនុងមន្ទីពទ្យបំពញតារាងរាយការ(ផ្តល់ឡើងដាយនាយកដ្ឋានការិយាល័យសវោកម្មសង្គមនមៃន្ទីពទ្យ),ទូរលេខទាកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការពារអំពីហិង្សាកុនុងគ្រួសារនិងរំលាភផ្លូវភទេនរដ្ឋហិាលរាល់សុរកុរុង,ធ្វើការរាយការណ៍,ដើម្បីផ្តល់សវោកម្មទាដល់ជនរាងគ្រុះ។

២. យាងទាតាមមាត្រាទី៥០នច្ប្ងាប់ការពារអំពីហិង្សាកុនុងគ្រួសារ,អ្នកបីរីការកុនុងមន្ទីពទ្យមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការរាយការណ៍។អ្នកដលៃមិនរាយការណ៍តាមច្ប្ងាប់,យាងទាតាមមាត្រា៦២-១,ពិន័យទឹកប្រាក់តវ៉ាន់ចំនួន៦ពាន់ទា៣មឺនដាយអង្គការគ្រប់គ្រងកុនុងទីកុរុងសុរុក។ប៉ុន្តប្ងៃសិនបីអ្នកធ្វើការកុនុងមន្ទីពទ្យប្រឆាំងដាយសារជឿសវាងគ្រុះថ្នាក់បន្ទាន់នខ្លួនបុរាណជនរាងគ្រុះ, មិនពិន័យ។

៣. កុនុងពលេបុគ្គលិកសុខាភិបាលកំពុងប្រតិបត្តិការងារ បុរសិនបីបុរទេះឃើញមានករណីអំពីហិង្សាកុនុងគ្រួសារ តប្ងៃសិនបីជនរងគ្រុះមិនពុរមរាយការណ៍ នាះសូមធ្វើការបញ្ជាក់នាលើតារាងរាយការណ៍ថា ជនរងគ្រុះគ្មានបំណងរាយការណ៍ ដើម្បីជាការរំលឹកទាដល់វិធីដោះសុរាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបុរឆាំងអំពីហិង្សាកុនុងគ្រួសារនិងការរំលាភបំពានផ្លូវភទេនអៃាជ្ញាធរសុរុក (កុរុង) ។បុរសិនបីបុរទេះឃើញករណីអំពីហិង្សានទំនាក់ទំនងជិតសុនិត គួរបំពញតារាងវាយតមុលគ្រុះថ្នាក់នអ៊ែពីហិង្សាទំនាក់ទំនងជិតសុនិតតវ៉ាន់(TIPVDA) ព្រមទាំងរាយការណ៍ទាកុនុងបុរព័ន្ធទិន្នន័យអំពីហិង្សាកុនុងគ្រួសារនកុរសួងសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថម្ភឲ្យហានមុនថ្ងៃទី១០ នខែបែនទាប់ ដើម្បីឆាប់កំណត់អំពីករណីអំពីហិង្សាគ្រុះថ្នាក់កម៉ុតខ្ពស់។

相關資源訊息

單位名稱	提供服務	聯絡方式
衛生福利部國民健康署健康九九網站	衛生教育訊息	(02)2351-9047 http://health99.hpa.gov.tw/
衛生福利部國民健康署健遺傳疾病諮詢服務窗口	提供正確與多元的遺傳疾病相關知識訊息	http://gene.hpa.gov.tw/
臺灣癲癇醫學會	提供癲癇婦女妊娠資料登錄、衛教諮詢、個案管理，讓醫護人員知道如何協助您	02-2876-2890 http://www.epilepsy.org.tw
財團法人臺灣早產兒基金會	提供方案讓早產兒獲得適當的醫療，提升早產兒醫療照護品質，並從事早產的防治與教育宣導服務	0800-00-3595 02-2511-1608 http://www.pbf.org.tw
臺灣早產防治學會	推動早產防治	02-2523-7490
財團法人罕見疾病基金會	提供罕見疾病的資訊與協助	02-25210717-8 http://www.tfrd.org.tw
臺灣海洋性貧血協會	為全國海洋性貧血患者及其家庭提供積極正確的醫療照護資訊與協助	02-2389-1250 http://www.thala.org.tw/
中華民國心臟病兒童基金會	協助患有心臟病兒童得到適當的醫療照顧	02-2331-9494 http://www.ccft.org.tw
財團法人羅慧夫顱顏基金會	協助先天性的頭顱及顏面的發育不良者如唇顎裂、小耳症及其它顱顏畸形患者	0800-012378 02-27190408 http://www.nncf.org
財團法人中華民國唐氏症基金會	結合唐氏症者家長、監護及關心唐氏症者人士團體及學者專家，促進教養經驗之溝通或護理保健之諮詢	02-2278-9888 http://www.rocdown-syndrome.org.tw
社團法人臺灣關懷地中海型貧血協會	提供病友就業輔導、醫療協助、社會教育等服務	04-2529-8232 https://www.facebook.com/groups/119062884788125/
中華民國發展遲緩兒童早期療育協會	協助各類發展遲緩兒童及其家庭，進行早期療育工作	03-8239335 http://www.caeip.org.tw
財團法人中華民國發展遲緩兒童基金會	協助推動建立發展遲緩兒童早期療育及諮詢服務等工作	02-2753-0855 http://www.fcdd.org.tw
家庭教育網站及諮詢專線	親職教養、親子關係、夫妻關係、姻親關係、婚前交往、親密關係、家庭資源與管理、家庭生活調適等	412-8185(手機撥打請加02) http://moe.familyedu.moe.gov.tw
衛生福利部社會救助及社工司	社會福利諮詢	1957 http://1957.mohw.gov.tw/
勞動部	促進受僱者工作與生活平衡，鼓勵生育並建構友善懷孕受僱者及其配偶之工作職場	02-8995-6866 http://www.mol.gov.tw/(勞動部)、 http://eeweb.mol.gov.tw/(就業平等網)
國稅局、地方稅務局	綜合所得稅幼兒學前特別扣除額服務	0800-000-321(國稅局)、 0800-086-969(地方稅務局) http://www.ntbca.gov.tw/etwmain
全國未成年懷孕諮詢專線	提供青少女懷孕者、一般青少年等電話諮詢及轉介服務	0800-25-7085 http://www.257085.org.tw/index.php

ធនធានដលៃទាក់ទង

មាៈអង្គភាព	ផ្ដល់សវោ	វិធីទំនាក់ទំនង
មនុទីរសុខាភិបាលជាតិនកៃស្ងួងសុខាភិបាលសុខុមាលភាពនិងសុខភាពបសាយកាសៃបបុរាំបួន	សារដលៃបានអប់រំសុខភាព	(02)2351-9047 http://health99.hpa.gov.tw/
ជំងឺហុសនៃដលៃបង្កអ្វូចសវោសុខភាពសុខុមាលភាពរបស់កុរស្ងួងសុខាភិបាលជាតិកុរស្ងួងសុខាភិបាលនិង	ផ្ដល់នូវជំងឺហុសនៃដលៃគុំមតូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយសារចំណៈដឹងចមុរៈ	http://gene.hpa.gov.tw/
សមាគមវរជ្ដសាសុគុរតង៉ាន់ជំងឺឆ្កួតជ្ងរក	ការផ្ដល់សុគុរីមានផ្ទុចពោៈដលៃការបញ្ចូលទិននន័យជំងឺឆ្កួតជ្ងរកផ្ដល់ការប៊ុកសាការអប៊ំសុខភាពគុរប់គុរងករណីអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកពទេ្យហានដឹងពីរបៀបដីមុបីជួយអ្នន	02-2876-2890 http://www.epilepsy.org.tw
មូលនិធិកុមារតង៉ាន់មិនគុរប់ខ	ជំណាៈសុវាយការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឱ្យកុមារមិនគុរប់ខទេ្ទលហានការថទាំរវជ្ដជសាសួតដលៃសមមូយលើកកំពស់គុណភាពនការថទាំសុខភាពនាកុនុងកុមារមិនគុរប់ខនិងហានចូលរួមនាកុនុងការការពារកើតមិនគុរប់ខនិងការផ្ដល់សវោការតសូមតិការអប៊ំ	0800-00-3595 02-2511-1608 http://www.pbf.org.tw
វិទ្យាសុថានតង៉ាន់នការការពារមិនគុរប់ខ	លើកកមុពស់ការបង្ការការកើតមិនគុរប់ខ	02-2523-7490
មូលនិធិជំងឺកមុរមួយមូលនិធិ	ផ្ដល់នូវជំងឺកមុរមួយនិងជំនួយ	02-25210717-8 http://www.tfrd.org.tw
សមាគមតង៉ាន់ជំងឺខុរៈឈាម	អ្នកជំងឺដលៃមានជំងឺខុរៈឈាមជាតិនិងគ្រួសាររបស់ពួកគនៅខាងសុជ៊ាជ្ដដល់ពថទាំសុខភាពនិងការផ្ដល់ជំនួយ	02-2389-1250 http://www.thala.org.tw/
សាធារណរដ្ឋចបុរជាមានិតចិនកុមារជំងឺបៈដួងនឹងមូលនិធិ	ជួយដល់កុមារដលៃមានជំងឺបៈដួងទទេ្ទលហានការថទាំរវជ្ដជសាសុរតហានសមសុរប	02-2331-9494 http://www.ccft.org.tw
មូលនិធិចុហាប់ពទេ្យលើហ្ស៊ីយហ្ស៊ូ	ជួយដល់កុហាលនិងមុខខុសពីកំណើតដូចជាឆបែបបូរមោតនិងកុរអ្ងមមាត់តុរធ្មៀតគ្លួចនិងរាគសញ្ញាផ្ដុសដេទៀតចំពោៈអ្នកជំងឺដលៃមានការខ្ជួចទុរដ៏ទុកាយឆ្អឹងកុហាល	0800-012378 02-27190408 http://www.nncf.org
សាធារណរដ្ឋចបុរជាមានិតចិនកុរុមហ៊ុនហ៊ិរញ្ញវតុថ្មការធ្លាក់ចុះរាគសញ្ញាមូលនិធិ	រួមបញ្ចូលគ្នានដលៃមានជម្ងឺតួរហានឪពុកមុតាយអាណាពុយាហាលនិងការខុរល់អំពីអ្នកដលៃមានជម្ងឺដាយកុមុអ្នកជំនាញខាងនិងអ្នកសិកសាជីមុបីលើកកមុពស់ទំនាក់ទំនងនិងដំបូនុមានឬបទពិសាធនាកុនុងការថទាំ	02-2278-9888 http://www.rocdown-syndrome.org.tw
សមាគមតង៉ាន់ថទាំនដៃជំងឺខុរៈឈាម	ផ្ដល់នូវអ្នកជំងឺដលៃផ្ដល់ការប៊ុកសាការងារ ការផ្ដល់ជំនួយផ្ទុកៃរវជ្ដជសាសួតអប៊ំនិងសវោសង្គមផ្ដុសដេទៀ	04-2529-8232 https://www.facebook.com/groups/119062884788125/
សាធារណរដ្ឋបនកៃមាដលៃមានការពនុយាពលការអភិវឌ្ឍការពុយាហាលមុននិងសមាគមមិសិយអប៊ំ	ជួយដល់កុមារនិងគ្រួសាររបស់ពួកគគេរប់បុរភទនកៃារលូតលាស់យឺត ការពុយាហាលជំបូងនិងការអប៊ំ	03-8239335 http://www.caeip.org.tw
មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍យឺងខុញ្ចឺយឺតយ៉ាវយូនីសហ្កវ	ជួយជំរុញការបង្កើតនកៃារពនុយារពលេកុនុងការអភិវឌ្ឍកុមារតួចនិងសវោប៊ុកសាយាបល់។ល។នេ	02-2753-0855 http://www.fcdd.org.tw
ទំព័រការអប់រំគ្រួសារនិងបនុទាត់ដំបូនុមាន	ការចិញ្ចឹមកូនអប់រំ ទំនាក់ទំនងមកេូនទំនាក់ទំនងគ្រួសារ ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិបុរពនុធ្ងមកទេមុនរៀបការ ភាពសនិទ្ធសនាល ធនធានកុនុងកុមុគ្រួសារនិងការគុរប់គុរងជីវិតគ្រួសារនិងការគមួរផ្ដុសដេទៀត	412-8185(ទូរស័ពទដៃមុបីហៅទូរស័ពទសូមបនុថមែ 02) http://moe.familyedu.moe.gov.tw
ឧបការីសង្គមសមូរាប់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពនិងកមុមការសង្គម	សុខុមាលភាពសង្គមបុរីកុសាយាបល់	1957 http://1957.mohw.gov.tw/
កុរស្ងួងការងារ	បុគ្គលិកដលៃហានលើកកមុពស់ឱ្យមានការងារជីវិតលើកទឹកចិតុតឱ្យមានកំណនិងការតសាងនិយាជិតដលៃងាយស្រួលថទាំដលៃអ្នកមានផ្ទុចពោៃនិងការធ្វើការងារនាកន្លៃងការងារបុគ្គិបុរពន្	02-8995-6866 http://www.mol.gov.tw/ (កុរស្ងួងការងារ), http://eeweb.mol.gov.tw/ (បណ្ដាញសមភាពការងារ)
ហានពនុធដារការិយាល័យកុនុងស្សុក	កុមារៀនដលៃមានបុរាក់ចំណូលរួមសវោកមុមកាត់ពិសសេមុនពលេ	0800-000-321 (ពនុធដារការិយាល័យ), 0800-086-969 (កុនុងស្សុកពនុធដារការិយាល័យ) http://www.ntbca.gov.tw/etwmain
បនុទាត់ដំបូនុមានផ្ទុចពោៃកុនុងវ័យជំទង់ជាតិ	មងេសុរីមានផ្ទុចពោៃវ័យជំទង់ផ្ដុលជូននូវ មនុស្សវ័យជំទង់និងការប៊ុកសាយាបល់តាមទូរស័ពទទូទាំងសវោការបញ្ជូន	0800-25-7085 http://www.257085.org.tw/index.php

聯絡地址及電話

各縣市衛生局聯絡地址及聯絡電話

各縣市衛生局	地址、網址	電話	預防接種專線
基隆市衛生局	20147 基隆市信義區信二路266號 http://www.klchb.gov.tw	02-24230181	02-2427-6154
臺北市政府衛生局	11008臺北市信義區市府路1號 http://www.health.gov.tw	02-27208889	02-23754341
新北市政府衛生局	22006新北市板橋區英士路192-1號 http://www.health.ntpc.gov.tw	02-22577155	02-22588923
桃園市政府衛生局	33053桃園市桃園區縣府路55號 http://www.tychb.gov.tw	03-3340935	03-3363270 03-3382157
新竹縣政府衛生局	30210新竹縣竹北市光明七街1號 http://www.hcshb.gov.tw/	03-5518160	03-5511287
新竹市衛生局	30041新竹市東區中央路241號10-12樓 http://dep.hcchb.gov.tw	03-5355191	03-5355130
苗栗縣政府衛生局	36043苗栗縣後龍鎮大庄里21鄰光華路373號 http://www.mlshb.gov.tw	037-558080	037-558100
臺中市政府衛生局	42053臺中市豐原區中興路136號 http://www.health.taichung.gov.tw	04-25265394	04-25270780
彰化縣衛生局	50049 彰化縣彰化市中山路二段162號 http://www.chshb.gov.tw	04-7115141	04-7115141#103 04-7115141#104
南投縣政府衛生局	54062南投縣南投市復興路6號 http://www.ntshb.gov.tw	049-2222473	049-2220904 049-2230607
雲林縣衛生局	64054雲林縣斗六市府文路34號 http://www.ylshb.gov.tw	05-5373488	05-534-5811
嘉義縣衛生局	61249嘉義縣太保市祥和二路東段3號 http://www.cyshb.gov.tw	05-3620600	05-362-0607 05-3620600#205

ទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋាននិងទូរស័ព្ទ

ទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋាននិងទូរស័ព្ទមន្ទីរសុខាភិបាលរាល់ខេត្តក្នុង

មន្ទីរសុខាភិបាលរាល់ខេត្តក្នុង	អាស័យដ្ឋាន អ៊ីនធឺណេត	ទូរស័ព្ទ	សំទូរស័ព្ទចាក់ថ្នាំបង្ការ
មន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងជីឡុង	ផ្ទះលេខ266ផ្លូវសីនអឺទីក្រុងជីឡុង20147	02-24230181	02-2427-6154
	http://www.klchb.gov.tw		
មន្ទីរសុខាភិបាលស៊ុរកអ៊ីឡាន	ផ្ទះលេខ1ផ្លូវសឺហ៊ូសង្កាត់សីនអឺទីក្រុងតបៃ11008	02-27208889	02-23754341
	http://www.health.gov.tw		
មន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងជីឡុង	ផ្ទះលេខ192-1ផ្លូវអឺងសឺសង្កាត់ប៉ានឈៀទីក្រុងសីនប៊ី22006	02-22577155	02-22588923
	http://www.health.ntpc.gov.tw		
ការិយាល័យសុខភាពនាទីក្រុងធាយនេ	33053 នាក្រុងខត្តេតស្រុកធាយនេផ្លូវ55	03-3340935	03-3363270
	http://www.tychb. gov.tw		03-3382157
មន្ទីរសុខាភិបាលស៊ុរកចាវ៉ាន	ផ្ទះលេខ1ផ្លូវគីងមីងជាទីក្រុងជូប៊ីស្រុកសីនជួ30210	03-5518160	03-5511287
	http://www.hcshb.gov.tw/		
ក្រុងស៊ីងជូគ្លារិយាល័យសុខាភិបាល	30041 ក្រុងស៊ីងជូខាងកីតផ្លូវ 241 លេខ10-12	03-5355191	03-5355130
	http://dep.hcchb.gov.tw		
គ្លារិយាល័យសុខាភិបាលមវ៉ែល	36043 ស្រុកមវ៉ែលីសង្កាត់កុវយនាគនាភូមិ21 ផ្លូវលេខ 373	037-558080	037-558100
	http://www.mlshb.gov.tw		
មន្ទីរសុខាភិបាលក្រុងតថ្ងែង	ផ្ទះលេខ136ផ្លូវចុងសឹងសង្កាត់ហ៊ុងយានទីក្រុងថថ្ងែង42053	04-25265394	04-25270780
	http://www.health.taichung.gov.tw		
មន្ទីរសុខាភិបាលស៊ុរកចាងហ៊ា	ផ្ទះលេខ162ផ្លូវចុងសាន២ទីក្រុងចាងហ៊ា50049	04-7115141	04-7115141#103
	http://www.chshb.gov.tw		04-7115141#104
មន្ទីរសុខាភិបាលស៊ុរកណានថ្ង	ផ្ទះលេខ6ផ្លូវហ៊ូសឹងក្រុងណានថ្ងស្រុកណានថ្ង54062	049-2222473	049-2220904
	http://www.ntshb.gov.tw		049-2230607
មន្ទីរសុខាភិបាលស៊ុរកអ៊ីនលន	ផ្ទះលេខ34ផ្លូវហ៊ូរីនក្រុងតូវលីវស្រុកអ៊ីនលន64054	05-5373488	05-534-5811
	http://www.ylshb.gov.tw		
លមន្ទីរសុខាភិបាលស៊ុរក	ផ្ទះលេខ3ផ្លូវសិងៃហ៊ី២តុងក្រុងថយ៉ៅស្រុកជវ៉ែ61249	05-3620600	05-362-0607
	http://www.cyshb.gov.tw		05-3620600#205

聯絡地址及電話

各縣市衛生局聯絡地址及聯絡電話

各縣市衛生局	地址、網址	電話	預防接種專線
嘉義市政府衛生局	60097嘉義市西區德明路1號	05-2338066	05-2341150
	http://www.cichb.gov.tw		
臺南市政府衛生局	73064臺南市新營區東興路163號（東興辦公室）	06-6357716	06-6333080
	70151臺南市東區林森路一段418號（林森辦公室）		06-2679751#372
	http://health.tainan.gov.tw/tnhealth		
高雄市政府衛生局	80276高雄市苓雅區凱旋二路132之1號	07-7134000	07-7134000#1377
	http://khd.kcg.gov.tw/		07-7230513
屏東縣政府衛生局	90054屏東縣屏東市自由路272號	08-7370002	08-738-0208
	http://www.ptshb.gov.tw		08-736-2986
宜蘭縣政府衛生局	26051 宜蘭縣宜蘭市女中路二段287號	03-9322634	03-935-7011
	http://www.ilshb.gov.tw		03-932-2634#1206
花蓮縣衛生局	97058花蓮縣花蓮市新興路200號	03-8227141	03-822-6975
	http://www.hlshb.gov.tw		
臺東縣衛生局	95043臺東縣臺東市博愛路336號	089-331171	089-331-171#214
	http://www.ttshb.gov.tw		
連江縣衛生局	20941連江縣南竿鄉復興村216號	083-622095	083-622-095#8855
	http://www.matsuhb.gov.tw		
金門縣衛生局	89148金門縣金湖鎮新市里復興路1-12號	082-330697	082-330-697#609
	http://www.kmhb.gov.tw		
澎湖縣政府衛生局	88041澎湖縣馬公市中正路115號	06-9272162	06-927-0508
	http://www.phchb.gov.tw		06-927-2162#211

ទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋាននិងទូរស័ព្ទ

ទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋាននិងទូរស័ព្ទមន្ទីរសុខាភិបាលរាល់ខេត្តក្រុង

មន្ទីរសុខាភិបាលរាល់ខេត្តក្រុង	អាស័យដ្ឋាន អ៊ីនធឺណេត	ទូរស័ព្ទ	សម្រាប់ទូរស័ព្ទចាក់ផ្ទាំងបង្ការ
មន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងជេអ៊ី	ផ្ទះលេខ1ផ្លូវទីមីងទីក្រុងជេអ៊ី60097	05-2338066	05-2341150
	http://www.cichb.gov.tw		
មន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងថៃណាន	ផ្ទះលេខ163 ផ្លូវតុងស្ទឹង ខណ្ឌឧសីនអ៊ឹង ក្រុងតៃណាន 73064 (ការិយាល័យតុងសឹង)	6-6357716	06-6333080
	ផ្ទះលេខ418 កំណាត់ទី១ ផ្លូវលីនសិន ខណ្ឌឧសីតុង ក្រុងតៃណាន 70151 (ការិយាល័យលីនសិន)		06-2679751#372
	http://health.tainan.gov.tw/tnhealth		
មន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងកាវសុង	ផ្ទះលេខ132ផ្លូវខាយសៀន២សង្កាត់លីងយ៉ាទីក្រុងកាវសុង80276	07-7134000	07-7134000#1377
	http://khd.kcg.gov.tw/		07-7230513
មន្ទីរសុខាភិបាលស្រុកតឹងតុង	ផ្ទះលេខ272ផ្លូវជីយូវក្រុងតឹងតុងស្រុកតឹងតុង90054	08-7370002	08-738-0208
	http://www.ptshb.gov.tw		08-736-2986
មន្ទីរសុខាភិបាលស្រុកអ៊ីឡាន	ផ្ទះលេខ287ផ្លូវសឹងហ្គូទីក្រុងអ៊ីឡានស្រុកអ៊ីឡាន 26051	03-9322634	03-935-7011
	http://www.ilshb.gov.tw		03-932-2634#1206
មន្ទីរសុខាភិបាលស្រុកហាឡាន	ផ្ទះលេខ200ផ្លូវសឹនសឹងក្រុងហ៊ាលានស្រុកហ៊ាលាន97058	03-8227141	03-822-6975
	http://www.hlshb.gov.tw		
មន្ទីរសុខាភិបាលស្រុកថតែង	ផ្ទះលេខ336ផ្លូវប៉ៃអាយទីក្រុងថតែងស្រុកថតែង95043	089-331171	089-331-171#214
	http://www.ttshb.gov.tw		
មន្ទីរសុខាភិបាលស្រុកលានជង	ផ្ទះលេខ216ភូមិហ៊ូវសឹងឃុំម៉ាជូណាឈានស្រុកលានជង20941	083-622095	083-622-095#8855
	http://www.matsuhb.gov.tw		
មន្ទីរសុខាភិបាលស្រុកជឹងមិន	ផ្ទះលេខ1-1ជាន់ទី2ផ្លូវចុងចឹងឃុំជឹងហ៊ូស្រុកជឹងមិន89148	082-330697	082-330-697#609
	http://www.kmhb.gov.tw		
មន្ទីរសុខាភិបាលស្រុកជឹងហ៊ូ	ផ្ទះលេខ115ផ្លូវចុងចឹងក្រុងម៉ាកុងស្រុកជឹងហ៊ូ88041	06-9272162	06-927-0508
	http://www.phchb.gov.tw		06-927-2162#211

育兒津貼、國民年金保險生育給付、農民健康保險生育給付

育兒津貼—安心在家照顧我們的寶貝

衛生福利部訂定「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」，補助父母至少一方在家照顧2歲以下幼兒致未能就業者，低收入戶每名兒童每月5,000元、中低收入戶每名兒童每月4,000元、綜合所得稅稅率未達20%家庭每名兒童每月2,500元。有意申請者請洽兒童戶籍所在地之鄉(鎮、市、區)公所，相關資訊可至衛生福利部社會及家庭署網站(http://www.sfaa.gov.tw/兒少福利/補助專區/父母未就業家庭育兒津貼)。

(資料來源:衛生福利部社會及家庭署)

國民年金保險生育給付

國保女性被保險人於100年7月1日至104年12月17日分娩或早產者，可按當時之月投保金額一次發給1個月生育給付(97年10月至103年12月之月投保金額為1萬7,280元，自104年1月起調整為1萬8,282元)，104年12月18日以後分娩或早產者，則一次發給2個月(3萬6,564元)，雙胞胎以上按比例增給。更多詳細內容請打國民年金專線服務電話：(02)2396-1266轉6066。或網址http://www.bli.gov.tw/(國民年金保險/各項給付/生育給付)

(資料來源: 衛生福利部社會保險司)

農民健康保險生育給付

農保被保險人或其配偶分娩或早產者，可按當月投保薪資一次發給2個月生育給付(目前為2萬400元)；流產者減半給付(目前為1萬200元)。雙胞胎以上按比例增給。

更多詳細內容請打勞保局服務電話(02)2396-1266轉2330。或網址：http://www.bli.gov.tw/(農民保險/農民/如何申請農保給付/農保生育給付)

(資料來源：內政部)

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកុនុងការចិញ្ចឹមកូន ការទូទាត់នការផ្តល់កំណើតនធានារ៉ាប់រងធនលាភប្រជាពលរដ្ឋបប្រចាំឆ្នាំ និងការទូទាត់នការផ្តល់កំណើតនធានារ៉ាប់រងសុខភាពកសិករ

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកុនុងការចិញ្ចឹមកូន—មើលថទៅកូនរបស់យើងនាផ្ទះដាយសុងបចិត្តត

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកុនុងការចិញ្ចឹមកូន—មើលថទៅកូនរបស់យើងនាផ្ទះដាយសុងប់ចិត្តតកុរសួងសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថម្ភហានកំណត់ “ផនៃការប្រាក់ឧបត្ថម្ភកុនុងការចិញ្ចឹមកូននគ្លៃសារមុដាយឪពុកគ្មានការងារ” ជួយឧបត្ថម្ភដល់មុដាយឪពុកដាយយ៉ាងហាចមានមុនាក់មិនអាចធ្វើការហានដាយសារនៅមើលថទៅកូនអាយុកុរាម២ឆ្នាំកុនុងនាៈ គ្លៃសារប្រាក់ចំណូលទាបទទួលហាន៥០០០យនេរាល់ខសៃមុរាប់កូនមុនាក់ គ្លៃសារប្រាក់ចំណូលមធ្យមទទួលហាន៤០០០យនេរាល់ខសៃមុរាប់កូនមុនាក់ និង គ្លៃសារដលៃមានអតុរាបង់ពនុធសរុបមិនដល់២០% ទទួលហាន២៥០០យនេរាល់ខសៃមុរាប់កូនមុនាក់។ប្រសិនបីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សុនីសុំ សូមទំនាក់ទំនងសាលាឃុំ (សុរុក កុរុងខណុឧ) ដលៃបុតុរធីតាចុះអតុរានុកូលដុាន។ ពតិមានជុសរេងៗសូមចូលទៅកាន់គហទំព័រនទីស្នាក់ការសងុគមនិងគ្លៃសារនកៃរសួងសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថម្ភ (http://www.sfaa.gov.tw/របបឧបត្ថម្ភកុមារ/ទំព័រជំនួយឧបត្ថម្ភ/ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកុនុងការចិញ្ចឹមកូននគ្លៃសារមុដាយឪពុកគ្មានការងារ) http://www.sfaa.gov.tw/របបឧបត្ថម្ភកុមារ/ទំព័រជំនួយឧបត្ថម្ភ/ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកុនុងការចិញ្ចឹមកូននគ្លៃសារមុដាយឪពុកគ្មានការងារ

(បុរភពឯកសារៈ ទីសុនាក់ការសងុគមនិងគ្លៃសារនកៃរសួងសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថម្ភកសងុគម)

ការទូទាត់នការផ្តល់កំណើតនធានារ៉ាប់រងធនលាភប្រជាពលរដ្ឋបប្រចាំឆ្នាំ

ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិធានារ៉ាប់រងជាសុតិនៅកុនុង 100 ឆ្នាំទី 1 ខកៃកុកដាទៅ 104 លីខធ្លៃ 17 ចកៃចាយឬមុនអាយុមនុសុសនេះបីយាងតាមចំនួនទឹកប្រាក់ការធានារ៉ាប់រងហានបង់ប្រចាំខប្រៃរាក់ឈនួលជុំមាតុភាពមួយខ (ខតៃុលា 97 ដល់ខធ្លៃនួ 103 ពុរៈច័នុទចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងគឺ 17,280 $ តងាៃន់ពី 104 នាក់នុងខមែករាដីមូបីលតៃមួរប្រាក់ NT $ 18,282 ទាំ) 104 ឆ្នាំបនុទាប់ពីការសមុាលកូននមិនគុរប់ខ 18 ខធ្លៃនួឆ្នាំឬដលៃហានចាត់រយៈពលពីរខដំបូង (36,564 $ តងាៃន់), នេះបីយាងតាមកូនភុលាៈឬចុរិនជាងនេះ សមាមាតុទៅនឹងកំណើតនេះ។ សមុាប់សចេកគីលមុអិតបនុថមែសូមទូរស័ពុទទាសវោទូរស័ពុទសាធនជាតិបនុទាត់: (02) 2396-1266 6066 RPM ។ ឬ http://www.bli.gov.tw/ URL ដលៃ (ធានារ៉ាប់រងសាធនជាតិ/ការទូទាត់/ប្រាក់ឧមែគុភាព)

(បុរភពឯកសារៈ នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រងសងុគមនកៃរសួងសុខាភិបាលនិងរបបឧបត្ថម្ភ)

ការទូទាត់នការផ្តល់កំណើតនធានារ៉ាប់រងសុខភាពកសិករ

Tអ្នកតុរវហានធានានធានារ៉ាប់រងសុខភាពកសិករ នឹងទទួលហានការទូទាត់នការផ្តល់កំណើតសមុាប់២ខ ចំនួន១លីក ដាយយាងទៅតាមទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងប្រាក់បៀវតុសកុនុងខនៃាៈ (បចុចុបុបនុន ចំនួន២0,៤00យន)។ សុជុរិរលូតកូននឹងទទួលហានការទូទាត់ពាក់កណ្តាល (បចុចុបុបនុន ចំនួន១0,២00)យន។កូនភុលាៈពីរនាក់ឡើងទៅនឹងផ្តល់ជូនបនុថមែទៅតាមសមាមាតុរ។

ពតិមានលំអិតសូមទូរស័ពុទទាកាន់ ខុសទៃូរស័ពុទសោកមុមនមៃនុទីរធានារ៉ាប់រងការងារ (02)2396-1266 តុជាប់ 2330 ឬគហទំព័រៈ http://www.bli.gov.tw/(ធានារ៉ាប់រងសុខភាពកសិករ/កសិករ/វិធីសុនីសុំការទូទាត់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពកសិករ/ការទូទាត់នការផ្តល់កំណើតនធានារ៉ាប់រងសុខភាពកសិករ/http://www.bli.gov.tw/(ធានារ៉ាប់រងសុខភាពកសិករ/កសិករ/វិធីសុនីសុំការទូទាត់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពកសិករ/ការទូទាត់នការផ្តល់កំណើតនធានារ៉ាប់រងសុខភាពកសិករ

(បុរភពឯកសារៈ កុរសួងមហាផ្ទទ)

勞工保險生育給付、就業保險育嬰留職停薪津貼

勞工保險生育給付

女性在參加勞保時懷孕或生產，參加勞保年資合計滿280天(早產為181天)者，可按生產當月起前6個月平均月投保薪資一次發給2個月生育給付〈103年5月30日(不含)以前生產者仍為1個月〉，雙胞胎以上按比例增給。

更多詳細內容請打勞保局服務電話:(02)23961266轉2866。或網址http://www.bli.gov.tw/ (勞工保險/給付業務/生育給付)。

就業保險育嬰留職停薪津貼

就業保險年資合計滿1年以上、小孩滿3歲前、依性別工作平等法之規定，辦理育嬰留職停薪的爸媽，可按育嬰留職停薪之當月起前6個月平均月投保薪資的60%按月發給，每一子女最長合計發給6個月，爸媽同為被保險人者，得先後提出申請。更多詳細內容請打勞保局服務電話:(02)23961266轉2866。或網址http://www.bli.gov.tw/ (就業保險/給付業務(含育嬰津貼)/育嬰留職停薪津貼)。

註：育兒津貼與育嬰留職停薪津貼「不得」同時請領。

(資料來源：勞動部勞工保險局)

育嬰留職停薪假期

受僱者任職滿六個月後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿三歲止，但不得逾二年。同時撫育子女二人以上者，其育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育二年為限。更多詳細內容請打勞動部專線(02-8995-6866)。或至勞動部網址http://www.mol.gov.tw/、就業平等網http://eeweb.mol.gov.tw/查詢。

(資料來源：勞動部)

ប្រាក់ខែមាតុភាពធានារ៉ាប់រងការងារហានការធានារ៉ាប់រងការងារឈប់សម្រាកពីឪពុកម្តាយដោយគ្មានប្រាក់បង់

ការបង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងការងារលំហែមាតុភា

នៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលហានចូលរួមក្នុងពលកម្មឬសម្រាល, ដីមុបីចូលរួមនៅក្នុងការសរុបអតីតភាពការងារពលកម្មជាង ២៨០ ថ្ងៃ (១៨១ ថ្ងៃសៃមុរាប់ការសម្រាលកូនមិនគួរប់ខែ) ដែលនេះបីយាងតាមសម្រាលចាប់ផ្តើមនៅខែនេះមុនពេលដែលប្រាក់ឈៀវតុស៍ធានារ៉ាប់រងប្រចាំខដោមធ្យមបុរាំមួយខមែតងចកៃចាយពីរខមែតុភាពបង់ប្រាក់< ថ្ងៃ ៣០ខឆែសភាឆ្នាំ២០១៤ (មិនរួមបញ្ចូល) គឺមុនពេលដែលអ្នកសម្រាលកុនុងមួយខនៅតៃ>កូនភ្លោះឬច្រីនជាងនេះកុនុងសមាមាត្រទៅនឹងការកើនឡើងនេះ

សម្រាប់សចេក្តីលម្អិតបន្ថមែសូមទូរស័ព្ទការិយាល័យពលកម្មទូរស័ព្ទធានារ៉ាប់រងសវោ:(02)23961266ភ្ជាប់ 2866ឬhttp://www.bli.gov.tw/ (ដែលការធានារ៉ាប់រងការងារ/ការទូទាត់បុរាក់ឈ្នួលអាជីវកមុម / មាតុភាព)

ការធានារ៉ាប់រងការងារឈប់សម្រាកពីឪពុកម្តាយដោយគ្មានបុរាក់បុរាក់ខ

ប៉ុន្មានឆ្នាំពញេលញេសរុបនកៃារធានារ៉ាប់រងលីការងារហានអស់រយៈពេលជាង១ឆ្នាំហើយ កុមារដែលមានអាយុជាង ៣ ឆ្នាំមកហើយនេះបីយាងតាមបញ្ញត្តិនសៃមភាពយនេឌ័រកុនុងការងារច្បាប់, ការឈប់សម្រាករបស់ឪពុកម្តាយដោយគ្មានប្រាក់ខរែបស់ឪពុកម្តាយបីយាងទៅតាមការឈប់សម្រាកពីឪពុកម្តាយដោយគ្មានប្រាក់ខពីខមែុន៦ខកៃារធានារ៉ាប់រងប្រចាំខដោមធ្យម ៦០% នបៃុរាក់ឈៀវតុសដែលហានបង់ប្រចាំខសៃមុរាប់កូនគុនាសរុបហានចញេបុរាំមួយខដ្ងៃចឪពុកម្តាយរបស់មនុស្សមុនាក់ធានារ៉ាប់រង, អ្នកអាចមានដីមុបីអនុវត្តត។សម្រាប់សចេក្តីលម្អិតបន្ថមែសូមទូរស័ព្ទការិយាល័យពលកម្មទូរស័ព្ទធានារ៉ាប់រងសវោ: (02) 23961266ភ្ជាប់ 2866 ។ឬ (អាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងការងារ / ការទូទាត់ (រួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថមភ្តពីមាតាបិតា) / ការឈប់សម្រាកពីឪពុកម្តាយដោយគ្មានប្រាក់បុរាក់ខ) http://www.bli.gov.tw/ ដែល។

ចំណាំ: ប្រាក់ឧបត្ថមភ្តថៃទាំកុមារនិងពេលឈប់សម្រាកពីឪពុកម្តាយដោយគ្មានប្រាក់ប្រាក់ខ "នឹង" និងអាចបីកនៅពេលតមែួយហានឡើយ។

(បុរេតព: កុរសួងការងារការិយាល័យធានារ៉ាប់រងការងារ)

ការឈប់សម្រាកមាតាឬដាយគ្មានបុរាក់ខ

បន្ទាប់ពីអតីតបុគ្គលិកដែលហានបមុរីការងារសម្រាប់រយៈពេលបុរាំមួយខ ដីមុបីឱ្យកូនគុនាឈានដល់អាយុបី អ្នកមានដីមុបីអនុវត្តការឈប់សម្រាករបស់ឪពុកម្តាយដាយគ្មានចំណុចបុរាក់ខរែហូតដល់កូនឈានដល់អាយុបីឆ្នាំឈប់នេះប៉ុន្តែមិនច្រីនជាងពីរឆ្នាំ។ បុរសិនបីមានមនុស្សពីរនាក់ឬច្រីនជាងនេះ,នៅកុនុងពេលចិញ្ចឹមកូនជាមួយគុនានេះដែរកុនុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកពីឪពុកម្តាយរបស់ពួកគដោយគ្មានប្រាក់ខនោះនឹងត្រូវបុរមូលផ្តុំឡើងទៅកុមារមិនទាន់ពញេវយភាគច្រីនបំផុតត្រូវហានកំណត់ដាយការចិញ្ចឹម2ឆ្នាំ។សម្រាប់សចេក្តីលម្អិតបន្ថមែសូមទូរស័ព្ទទានាយកដ្ឋហានបន្ទាត់ការងារ (02-8995-6866)ឬទៅhttp://www.mol.gov.tw/ គហោទំព័ររបស់កុរសួងការងារសំណួរ http://eeweb.mol.gov.tw/ការងារសមភាពបណ្តាញ។

(បុរេតព: កុរសួងការងារ)

守護女孩，讓每個寶寶平安出生，長大

若有發現違法檢測及選擇胎兒性別的情事，請洽：
各縣市胎兒性別篩選查報窗口

機關	查報窗口
宜蘭縣政府衛生局	電話：03-9322634#2312、03-9367855 傳真：03-9360855 E-MAIL：ian@mail.e_land.gov.tw
基隆市衛生局	電話：02-24230181#166 傳真：02-24282255 E-MAIL：yumi@klchb.gov.tw
新北市政府衛生局	電話：02-22577155、1999(新北市民單一申訴專線) 傳真：02-22589064 E-MAIL：tpc24105@ntpc.gov.tw
臺北市政府衛生局	電話：1999(外縣市:02-2720-8889)#1831傳真：02-87884560 E-MAIL：http://www.gov.taipei>首頁>市政信箱
桃園市政府衛生局	電話：03-3340935#2521 傳真：03-3472411 E-MAIL：http://www.tychb.gov.tw/index.asp>首頁>熱門服務>局長信箱
新竹市衛生局	電話：03-5355191#327 傳真：03-5355516 E-MAIL：hc3200@ems.hccg.gov.tw
新竹縣政府衛生局	電話：03-5519065 傳真：03-5512743 E-MAIL：4021892@hchg.gov.tw
苗栗縣政府衛生局	電話：037-558510 傳真：037-558590 E-MAIL：http://www.mlshb.gov.tw >首頁>意見箱>局長信箱
臺中市政府衛生局	電話：04-25265394#3151 傳真：04-25279062 E-MAIL：http://www.health.taichung.gov.tw >首頁>服務信箱
彰化縣衛生局	電話：04-7115141#502 傳真：04-7121309 E-MAIL：http://www.chshb.gov.tw >首頁>民意信箱>局長信箱
南投縣政府衛生局	電話：049-2222473#253 傳真：049-2202628 E-MAIL：fifth@.mail.ntshb.gov.tw
雲林縣衛生局	電話：05-5373488#155 傳真：05-5345633 E-MAIL：ylshb@ylshb.gov.tw
嘉義縣衛生局	電話：05-3620600#275 傳真：05-3621138 E-MAIL：http://www.cyshb.gov.tw >首頁>陳情案件
嘉義市政府衛生局	電話：05-2338066#513傳真：05-2821232 E-MAIL：service@mail.cichb.gov.tw
臺南市政府衛生局	電話：06-2881493 傳真：06-2698029 E-MAIL：service@tncghb.gov.tw
高雄市政府衛生局	電話：07-7134000#6122 傳真：07-7242966 E-MAIL：http://khd.kcg.gov.tw/
屏東縣政府衛生局	電話：08-7383479、08-7370002#132 傳真：08-7372918 E-MAIL：pthsysmgr@ksmail.doh.gov.tw
臺東縣衛生局	電話：089-321144#309 傳真：089-310334 E-MAIL：vhml0036@mail.ttshb.gov.tw
花蓮縣衛生局	電話：038-227141#262 傳真：038-230169 E-MAIL：mjnancy@ms.hlshb.gov.tw
澎湖縣政府衛生局	電話：06-9272162#237 傳真：06-9266693 E-MAIL：http://www.phchb.gov.tw>首頁>服務信箱>局長信箱
金門縣衛生局	電話：082-330697#715 傳真：082-334897 E-MAIL：jmh1117@tpmail.mohw.gov.tw
連江縣衛生局	電話：083-622095#8866傳真：083-623210 E-MAIL：matsuhb@matsuhb.gov.tw
衛生福利部國民健康署	電話：0800-870870 http://www.hpa.gov.tw

តវេតាថរក្សា,ផ្តល់អោយកុមារមានសុខភាពល្អមានសចេក្តីសុខសប្បាយ

ប្រសិនបើមានឃើញការត្រួតពិនិត្យលម្អិតច្បាប់និងការជ្រើសរើសភេទទារក,សូមទំនាក់ទំនងការិយាល័យរាយការណ៍ការជ្រើសរើសភេទទារកក្នុងផ្ទៃរៀល់ស្រុកនិងទីក្រុង

ការិយាល័យ	បង្អួចដលែរហាយការណ៍ស្វែងរក
មន្ទីរសុខាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលខេត្តអ៊ីឡាន់	ទូរស័ព្ទ: 03-9322634#2312, 03-9367855 ទូរសារ: 03-9360855 អ៊ីម៉ែល:ian@mail.e_land.gov.tw
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងជីឡុង	ទូរស័ព្ទ:02-24230181#166 ទូរសារ: 02-24282255 អ៊ីម៉ែល: yumi@klchb.gov.tw
ការិយាល័យសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីមប៊ី	ទូរស័ព្ទ: 02-22577155,1999 (ពាក្យបណ្តឹងប្រជាពលរដ្ឋបតម្លៃយក្រុងស៊ីមបិកាន់បន្ទាត់) ទូរសារ: 02-22589064 អ៊ីម៉ែល: tpc24105@ntpc.gov.tw
ការិយាល័យសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតប៉ៃ	ទូរស័ព្ទ: 1999(នៅខាងក្រៅស្រុក:02-2720-8889)#1831 ទូរសារ: 02-87884560 អ៊ីម៉េល: http://www.gov.taipei>ទំព័រដើម>ប្រអប់សំបុត្ររាជធានី
ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងធាលយនេ	ទូរស័ព្ទ: 03-3340935 # 2521 ទូរសារ: 03-3472411 អ៊ីម៉េល: http://www.tychb.gov.tw/index.asp>ទំព័រដើម>សផ៉ោកម្មពញ្ញនិយម>នាយកម៉ែល
ការិយាល័យសុខាភិបាលរបស់ក្រុងស៊ីងជូ	ទូរស័ព្ទ: 03-5355191 # 327 ទូរសារ: 03-5355516 អ៊ីម៉ែល: hc3200@ems.hccg.gov.tw
មន្ទីរសុខាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខេត្តស៊ីងជូ	ទូរស័ព្ទ: 03-5519065 ទូរសារ: 03-5512743 អ៊ីម៉ែល: 4021892@hchg.gov.tw
ការិយាល័យសុខាភិបាលរបស់ខេត្តម៉វែលី	ទូរស័ព្ទ:037-558510 ទូរសារ: 037-558590 អ៊ីម៉ែល: http://www.mlshb.gov.tw >ទំព័រដើម>意見箱>មតិ>នាយកម៉ែល
ការិយាល័យសុខាភិបាលរបស់ក្រុងតជុង	ទូរស័ព្ទ: 04-25265394 # 3151 ទូរសារ: 04-25279062 អ៊ីម៉េល: http://www.health.taichung.gov.tw >ទំព័រដើម>ប្រអប់ទទួលសវ៉ោ
មន្ទីរសុខាភិបាលរបស់ជាំងហ័	ទូរស័ព្ទ: 04-7115141 # 502 ទូរសារ: 04-7121309 អ៊ីម៉េល: http: //www.chshb.gov.tw>ទំព័រដើម>ប្រអប់សំបុត្រមតិ>ប្រអប់សំបុត្រលេខាធិការ
ការិយាល័យសុខាភិបាលរបស់ណាន់ថរ	ទូរស័ព្ទ: 049-2222473 # 253 ទូរសារ: 049-2202628 អ៊ីម៉ែល: fifth@ .mail.ntshb.gov.tw
មន្ទីរសុខាភិបាលរបស់ខេត្តអ៊ុំងលីង	ទូរស័ព្ទ: 05-5373488 # 155 ទូរសារ: 05-5345633 អ៊ីម៉ែល: ylshb@ylshb.gov.tw
មន្ទីរសុខាភិបាលរបស់ខេត្តជអ៊ើ	ទូរស័ព្ទ: 05-3620600 # 275 ទូរសារ: 05-3621138 អ៊ីម៉េល: http://www.cyshb.gov.tw >ទំព័រដើម>ករណីដលែញត្តិhttp://www.cyshb.gov.tw/main.asp
ការិយាល័យសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងជអ៊ើ	ទូរស័ព្ទ: 05-2338066#513 ទូរសា: 05-2821232 អ៊ីម៉ែល: service@mail.cichb.gov.tw
ការិយាល័យសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតណៃាន់	ទូរស័ព្ទ: 06-2881493 ទូរសារ: 06-2698029 អ៊ីម៉ែល: service@tncghb.gov.tw
ការិយាល័យសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាស្យុង	ទូរស័ព្ទ: 07-7134000 # 6122 ទូរសារ: 07-7242966 អ៊ីម៉ែល: http://khd.kcg.gov.tw/
ការិយាល័យសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលរបស់ខេត្តភីងតុង	ទូរស័ព្ទ: 08-7383479,08-7370002#132 ទូរសារ: 08-7372918 អ៊ីម៉ែល: pthsysmgr@ksmail.doh.gov.tw
មន្ទីរសុខាភិបាលរបស់ខេត្តតទៃ្វតុង	ទូរស័ព្ទ: 089-321144#309 ទូរសារ: 089 -310334 អ៊ីម៉ែល: vhml0036@mail.ttshb.gov.tw
មន្ទីរសុខាភិបាលរបស់ខេត្តហ័លាន	ទូរស័ព្ទ: 038-227141 # 262 ទូរសារ: 038-230169 អ៊ីម៉េល: mjnancy@ms.hlshb.gov.tw
មន្ទីរសុខាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខេត្តភឹងហ៊ូ	ទូរស័ព្ទ 06-9272162 # 237 ទូរសារ: 06-9266693 អ៊ីម៉េល: http://www.phchb.gov.tw>ទំព័រដើម>ប្រអប់ទទួលសវ៉ោ>ប្រអប់ទទួលសវ៉ោលេខាធិការ
ការិយាល័យសុខាភិបាលរបស់ខេត្តជ៊ីងមិន	ទូរស័ព្ទ: 082-330697 # 715 ទូរសារ: 082-334897 អ៊ីម៉ែល: jmh1117@tpmail.mohw.gov.tw
មន្ទីរសុខាភិបាលរបស់ខេត្តលានជាំង	ទូរស័ព្ទលេខ: 083-622095 # 8866 ទូរសារ: 083-623210 អ៊ីម៉ែល: matsuhb@matsuhb.gov.tw
ក្រសួងសុខាភិបាលនិងភ្នាក់ងារសុខភាពជាតិសុខុមាលភាព	ទូរស័ព្ទ: 0800-870870 http://www.hpa.gov.tw

孕婦B型肝炎追蹤檢查紀錄表

姓名　　出生日期　　身分證字　號

項目 / 結果 / 日期		產前檢查	產後追蹤檢查			
		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
B型肝炎表面抗原(HBsAg)(-陰性；+陽性)						
B型肝炎e抗原 (HBeAg)(-陰性；+陽性)						
肝功能檢查	AST(GOT)					
	ALT(GPT)					
肝臟超音波(建議填列有無肝硬化等資料)						
其　　他						
檢查院所						

1. 請產前檢查醫院針對孕婦產前檢查為B型肝炎表面抗原陽性【HBsAg(+)】個案，填列上表，並衛教產後應定期追蹤檢查。
2. 檢查項目依專業醫師評估而訂。

◎ 母親為e抗原(HBeAg)陽性者，其所生小孩於接種B型肝炎免疫球蛋白(HBIG)及3劑B型肝炎疫苗後，B型肝炎帶原機率由90%左右大幅降低，但仍可能有10%之帶原機會，故建議幼兒於出生約1歲左右進行B型肝炎表面抗原(HBsAg)及B型肝炎表面抗體(anti-HBs)檢測，以利及早發現幼兒帶原狀況及瞭解疫苗接種成效，並定期進行追蹤檢查。

◎ 孕婦B型肝炎產檢結果請同時於本表登錄，e抗原陽性之母親請攜帶本表提供臨床醫師做為幼兒B型肝炎表面抗原(HBsAg)及B型肝炎表面抗體(anti-HBs)檢測之參考資料。

◎ 母親為B型肝炎帶原，新生兒有依規定時程施打疫苗者，仍可正常餵哺母乳。

◎ B型肝炎帶原者，若其肝功能正常，原則建議每6個月至1年複檢一次，如肝功能異常，則由醫師決定其肝功能及超音波複檢時間。

◎ 目前治療B型肝炎藥物：
包括干擾素(Interferon)與抗病毒藥物兩大類；為降低肝硬化與肝癌之發生率，健保署辦理「全民健康保險加強慢性B型及C型肝炎治療計畫」，請有慢性肝炎孕婦，積極尋求健保治療；健保署亦辦理「全民健康保險B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者醫療給付改善方案」，提供每6個月1次之追蹤管理照護，有關治療對象之藥品給付規定及特約醫院等，請參閱中央健康保險署網站http://www.nhi.gov.tw

តារាងកត់ត្រាតួរតពិនិត្យតាមដានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានជំងឺថ្លើមប្រភេទB

• ឈ្មោះ_____ • ឯកឌ្ឍនាំកំណើត_____ • អត្តសញ្ញាប័ណ្ណ_____

បុរការ / លតុថផល / ងវៃ	តួរតពិនិទ្យមុនពលេសំរាល	តួរតពិនិត្យតាមដានកុរាយពលេសំរាល			
	___ឆ្នាំ ___ខែ___ថ្ងៃ	___ឆ្នាំ ___ខែ___ថ្ងៃ	___ឆ្នាំ ___ខែ___ថ្ងៃ	___ឆ្នាំ ___ខែ___ថ្ងៃ	___ឆ្នាំ ___ខែ___ថ្ងៃ
បុរភពបុរឆាំង(HBsAg) ជំងឺថ្លើមបុរភេទB(-,+)					
បុរភពបុរឆាំងe (HBsAg) ជំងឺថ្លើមបុរភេទB(-,+)					
តួរតពិនិត្យសមត្ថភាពថ្លើម AST(GOT)					
តួរតពិនិត្យសមត្ថភាពថ្លើម ALT(GPT)					
ថតរូបថ្លើម(អាយយោបល់បំពេញឯកសារថ្លើមវែង)					
ដទៃ					
ដទៃ					
មនុទ្ទីតួរតពិនិត្យ					

១. សូមមនុទ្ទីពទេ្យតួរតពិនិត្យមុនពលេសំរាលបំពេញតារាងខាងលើចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតួរតដលែពិនិត្យឃើញថាមានរាគថ្លើមបុរភេទB HBsAg(+) ,ហើយតួរតាមដានតួរតពិនិត្យជាទាងទាត់កុរាយពលេសំរាលកូន។

២. បុរការតួរតពិនិត្យគឺយោងទៅតាមការិភាគរបស់តួរពទេ្យឯកទេស

- មុតាយមានរាគុបុរភេពe(HBeAg),កូនគតួរវចាក់ថ្នាំបង្កាការាគថ្លើមបុរភេទB៣ដងនិង(HBIG),បុរភពជំងឺថ្លើមបុរភេទBហានកាត់បនុថយពី90%,ប៉ុនុតកៃអាចមានឪកាស10%ដរែ,ដូចនេះអាយយោបល់កុមារធ្ងរីការតួរតពិនិត្យ(HBsAg)និង(anti-HBs),ដើមបីឆាប់ឃើញពីសុថានភាពនិងយល់ដឹងពីលតុថផលថ្នាំបង្កា,ហើយតួរតតាមដានពិនិត្យអាយហានទាងទាត់។
- សូមកត់តុរាកុនុងតារាងនេះជាមួយនឹងលតុថផលការតួរតពិនិត្យជំងឺថ្លើមបុរភេទBរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ,មុតាយដលែមានរាគបុរភេពeសូមនាំយកតារាងនេះដើមបីតួរពទេ្យធ្ងរីការតួរតពិនិត្យ(HBsAg)និង(anti-HBs)។
- មុតាយដលែមានបុរភពជំងឺថ្លើមB,ទារកតួរវចាក់ថ្នាំបង្កាតាមវរលោកំណត់,ក៏អាចបំបាដោះជាធមុមតា។
- អុនុកដលែមានបុរភពជំងឺថ្លើមបុរភេទB,បុរសិនបើសមតុថភាពថ្លើមគបេ្រកុតើ,កុនុងគាលការណ៍តួរតពិនិត្យមុតងកុនុងរយៈពលេ៦ខទៅ១ឆ្នាំ,បុរសិនបើថ្លើមមានសូមុថភាពអបុរកុតើ,ពលេវលោតួរតពិនិត្យសមុថភាពថ្លើមនិងថតរូបតួរវសុរេចទៅលើតួរពទេ្យកំណត់។
- បចុចុបុនុនថ្នាំពុយាហាលជំងឺថ្លើមបុរភេទBរួមមាន(Interferon)និងថ្នាំកំចាត់មរោគ២បុរភេទ។ដើមុបីកាត់បនុថយជំងឺរងថ្លើមនិងមហារីកថ្លើម,មនុទ្ទីសុខាភិបាលហានជំរុញ(ផនែ្នការស្ងាកលុបង់ពុយាហាលជំងឺថ្លើមបុរភេទbនិងcការពារសុុខភាពបុរជាពលរដ្ឋ),សូមអុនុកជំងឺថ្លើមរួសរាន់សុំការពុយាហាលធានាសុខភាព។ការផ្តលុថ្នាំនិងមនុទ្ទីពទេ្យចំពោះអុនុកជំងឺទាក់ទង។ល។សូមមើលអីនថនតេមនុទ្ទីធានាសុខភាពចុងយោង http://www.nhi.gov.tw

孕婦免費愛滋病毒篩檢同意書

我知道愛滋病毒篩檢併同初次產檢(標準抽血檢查項目：血型、Rh因子等)實施，我已清楚了解孕婦免費愛滋病毒篩檢服務的說明(詳見頁次：P106)

本人 □拒絕 接受愛滋病毒篩檢
□同意 接受愛滋病毒篩檢

您的決定並不會影響您獲得產前醫療服務的權益

孕婦簽名：
身分證字號(居留證號碼)：
日期： 年 月 日

請將此頁撕下交給醫護人員黏貼於病歷表上

請沿虛線剪下

កិច្ចព្រមព្រៀងនៃការពិនិត្យវីរុសអដេស៍ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ស្ត្រី

ខ្ញុំដឹងថាការត្រួតពិនិត្យជំងឺអដេស៍និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃពោះលើកដំបូង(ប្រភេទការត្រួតពិនិត្យឈាម-ប្រភេទឈាម,Rh។ល។),ខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ពីការបញ្ជាក់ពីសវោកម្មមត្រួតពិនិត្យជំងឺអដេស៍ដាយឥតគិតថ្លៃចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ(ទំព័រទី ៖ ១០៧)

ខ្ញុំ ☐ បដិសេធទទួលការត្រួតពិនិត្យជំងឺអដេស៍

☐ យល់ព្រមទទួលការត្រួតពិនិត្យជំងឺអដេស៍

ការសំរេចចិត្តរបស់អ្នកមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធសវោកម្មមពេ្យាបាលមុនពេលសំរាលដលែអ្នកទទួលបាននាៈទេ

ហត្ថលេខាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ_____

អត្តសញ្ញាប័ណ្ណ_____

ងៃខែឆ្នាំ_____

សូមបាកែទំព័រនេះបុរគល់អាយគ្រូពេទ្យបីតលីបុរេត្តជំងឺ

Please cut along the dotted line.

國家圖書館出版品預行編目資料(CIP)

孕婦健康手冊/衛生福利部國民健康署著.-- 第3版.
-- 臺北市：衛生福利部國民健康署，2017.07
面；　公分
ISBN 978-986-05-1202-1（平裝）
1.妊娠 2.分娩 3.產前照護
429.12

105023561

書名：孕婦健康手冊
著(編、譯)者：衛生福利部國民健康署(廣告)
出版機關：衛生福利部國民健康署
地址：臺中市西區民權路95號6樓(臺中辦公室)
網址：http://www.hpa.gov.tw/

電話：(04) 2217-2200
出版年月：2017年07月
版(刷)次：第3版；2008年6月初版
發行數量：4,000本
其他類型版本說明：本書同時登載於衛生福利部國民健康署網站，網址為http://www.hpa.gov.tw

定價：新臺幣20元
展售處
　臺北：國家書店
　地址：10485臺北市松江路209號1、2樓
　電話：(02)2518-0207
　臺中：五南文化廣場
　地址：40042臺中市中區中山路6號
　電話：(04)2226-0330
GPN：101503093
ISBN：978-986-05-1202-1

著作財產權人：衛生福利部國民健康署
本書保留所有權利。欲利用本書全部或部分內容者，需徵求著作財產權人衛生福利部國民健康署同意或書面授權。請洽衛生福利部國民健康署(電話：04－22172200)。
©All rights reserved. Any forms of using or quotation, part or all should be authorized by copyright holder Bureau of Health Promotion, Department of Health, Taipei City, Taiwan.(R.O.C). Please contact with Bureau of Health Promotion Department of Health, R.O.C.. (TEL：886-4-22172200)
本出版品經費由衛生福利部國民健康署菸害防制及衛生保健基金支應。
This publication is funded by the Tobacco Hazards Prevention and Health Protection Funds of Health Promotion Administration.

ឯកសារដែលមានគំរងហៈពមុកដាយបណ្ណាល័យជាតិ(CIP)

សៀវភៅសុខភាពស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ/មន្ទីសុខាភិបាលមន្ទីសុខភាពជាតិ--
ហៈពុម្ពលីកទី3
ទីក្រុងសីនបឺ ពមុក-ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុ
ខភាព 2017.07
មុខ, ស/ម
ISBN 978-986-05-1202-1
១,មានផ្ទៃពោះ២,សំរាលកូន៣,ថៃទាំមុនពលេសំរាល
429.12

105023561

ឈុមាៈសៀវភៅ-សៀវភៅសុខភាពស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ
និពន្ធឡុងដាយ-ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាពអង្ការហៈពមុក-ក្រសួង
(ពាណិជ្ជកមុម)
សុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពទីភ្នាក់ងារសុខភាព
អាស័យដ្ឋានផ្ទះលខេ95ជាន់ទី6ផ្លូវមីនឈានសង្កាត់សីទីក្រុងថថៃចុង (ការិយាល័យតចុង)
អឺនចឺនតេhttp://www.hpa.gov.tw/

ទូរស័ពុទ(04)2217-2200
ខឆ្នៃនាំហៈ2017.07
ហៈពមុកលីកដំបូង-សៀវភៅទី3, ហៈពមុកលីកដំបូងនាខមិថុនាឆ្នាំ២០០៨
ចំនួនហៈពមុក4,000កុហាល
បញ្ជាក់ពីសៀវភៅផ្សងេៗទៀត-សៀវភៅនះមាននាលីអឺនចឺនតេមន្ទីរសុខាភិបាលមន្ទីសុខភាពជាតិ
http://www.hpa.gov.tw
មានតំលៃ20បុកាក់តវ៉ាន់
ទីកន្លងៃមានលក់
តបៃ-បណ្ណាគារជាតិ
អាស័យដ្ឋានផ្ទះលខេ209ជាន់ទី1,2ផ្លូវសុងជងៃទីក្រុងតបៃ
ទូរស័ពុទ(02)25180207
ថចុង-ទីរបុបធម៌អ៊ូណាន
អាស័យដ្ឋានផ្ទះលខេ6ផ្លូវចុងសានសង្កាត់ចុងទីក្រុងថចុង40042
ទូរស័ពុទ(04)22260330
GPN: 1010503093

ISBN: 978-986-05-1202-1

សៀវភៅនះផ្តល់សិទ្ធឡុងដាយមន្ទីសុខាភិបាលមន្ទីសុខភាពជាតិ
សៀវភៅនះមានកុសាសិទ្ធ។ជនដលែបុរីបុរាស់អតុថន័យសៀវភៅនះទាំងអស់ឬមួយចំនួន,តូវសុនីសុំផ្តល់សិទ្ធពីមន្ទីសុខាភិបាលមន្ទីសុខភាពជាតិជាផ្លូវការ។សូមទំនាក់ទំនងមន្ទីសុខាភិបាលមន្ទីសុខភាពជាតិ(ទូរស័ពុទ04-22172200)។

© All rights reserved. Any forms of using or quotation, part or all should be authorized by copyright holder Bureau of Health Promotion Department of Health, R.O.C. Please contact with Bureau of Health Promotion, Department of Health, Taipei City, Taiwan.(R.O.C). (TEL:886-4-22172200)

ថវិការរហៈពុមុតនះតូវហានឧបថមុត ដាយទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលជាតិនតៃការបុរឆាំងថុនាំជក់និងមូលនិធិថទាំអនាម័យសុខភាព
This publication is funded by the Tobacco Hazards Prevention and Health Protection Funds of Health Promotion Administration.

note