



主旨：柑橘類花期，籲請農民注意小型害蟲防治。臺南區農改場、防檢局及田邊好幫手關心您。

親愛的會員您好

這是來自行政院農委會—田邊好幫手的 植物疫情 通知

主旨：柑橘類花期，籲請農民注意小型害蟲防治。臺南區農改場、防檢局及田邊好幫手關心您。

發布日期：2015/03/27

發布單位：行政院農業委員會臺南區農業改良場

植物品項：柑橘類

發布縣市：台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市

疫情內容：

柑橘類水果種類甚多，包含文旦、白柚、椪柑、柳丁、茂谷等，此類作物花期容易受蚜蟲及薊馬的危害。近日由於氣溫回暖，田間薊馬密度升高，為確保柑橘果實品質，臺南區農業改良場籲請農友加強小型害蟲防治。 蚜蟲主要停留在柑橘樹新梢上刺吸取食，密度高時會影響新芽之生長，且容易誘發煤病。另危害柑橘類之薊馬以小黃薊馬及花薊馬居多，主要發生於新芽生長期、開花期及幼果期，此類害蟲體型細小，通常長度僅1公厘左右，習性又好隱藏，農友常忽略它的存在。新芽生長期，葉片受害後會呈縱向皺縮，無法正常生長。在開花期，薊馬會群集花器取食，造成花器受害而影響授粉。在幼果期，薊馬會以刺吸式口器刺破柑橘幼果表皮細胞吸取汁液，造成果皮粗糙或呈銹斑而無光澤，危害狀呈不規則形，隨果實長大而顯著，往往在發現果實受害時，都已失去最佳防治時機，因此，為了有效防治薊馬及蚜蟲，必須把握新芽及開花至小果期之最佳防治時機，以確保柑橘果實之品質。

建議用藥：

由於薊馬與蚜蟲繁殖速度相當快，於發生初期及早防治，可收事半功倍之效。防治薊馬可使用48.34%丁基加保扶乳劑1000倍。防治蚜蟲可使用20%免扶克乳劑800倍、44%大滅松乳劑1000倍等。建議輪流選用不同作用機制之藥劑，延緩抗藥性產生。農友可參考植物保護手冊用藥。

行政院農業委員會版權所有 Copyright © 2008-2012 All Rights Reserved

10014 臺北市中正區南海路37號 電話：(02)2381-2991 傳真：(02)2312-5878

服務時間：AM8:30-PM5:30 網址：m.coa.gov.tw