

「庫斯蘇力菌 SA-11」農藥使用方法及其範圍

85% (32,000 IU/MG) 庫斯蘇力菌 SA-11 WG 水分散性粒劑

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
玉米	玉米螟	0.3-0.4 公斤	3,000	苗高約 30 公分，黃 昏施藥。	7				雄花穗前 7 天 去雄,吐絲及全 部吐絲後各一 次;展著劑「力 道威」2,000 倍。	本項修 正。
十字花科 包葉菜類	小菜蛾	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。					本藥劑試驗時, 添加展著劑力 道威 2,000 倍。	
十字花科 小葉菜類	小菜蛾	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。					本藥劑試驗時, 添加展著劑力 道威 2,000 倍。	
茼蒿	夜蛾類	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
十字花科 根菜類	小菜蛾	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。					本藥劑試驗時, 添加展著劑力 道威 2,000 倍。	
蘆筍	夜蛾類	0.5-1 公斤	2,000	甜菜夜蛾 發生時。	7				本藥劑試驗時, 添加展著劑力 道威 2,000 倍。	
小麥、小 米、玉 米、高 粱、竹	鱗翅目 害蟲	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					本項新 增。
薑	玉米螟	0.3-0.4 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					本項新 增。
薑	夜蛾類	0.3-0.4 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					本項新 增。