

「貝萊斯芽孢桿菌 BF」農藥使用方法及其範圍

一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	有效成分
貝萊斯芽孢桿菌 BF	<i>Bacillus velezensis</i> BF	<i>Bacillus velezensis</i> BF

二、「貝萊斯芽孢桿菌 BF」農藥使用方法與範圍一覽表

1×10⁹ CFU/G 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑(WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
草莓	灰黴病	2 公斤	600	病害發生初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續三次；進一步施藥則視病害發展和藥劑的持效期而定。					藥液須均勻噴施於植株。	原始登 記廠商 名稱：亞 亮生技 股份有 限公司
柿	灰黴病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續三次；進一步施藥則視病害發展和藥劑的持效期而定。					藥液須均勻噴施於植株。	原始登 記廠商 名稱：亞 亮生技 股份有 限公司
水稻	白葉枯病	1.67 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次			全株均噴施。	原始登 記廠商 名稱：亞 亮生技 股份有 限公司

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
檬果	黑斑病	2 公斤	600	葉部發病初期開始，每隔 7 天施藥一次，連續 3 次。幼果形成後開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續 4 次。						原始登 記廠商 名稱：亞 亮生技 股份有 限公司
十字 花科 包葉 菜類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				原始登 記廠商 名稱：亞 亮生技 股份有 限公司
十字 花科 小葉 菜類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				原始登 記廠商 名稱：亞 亮生技 股份有 限公司
十字 花科 根菜 類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				原始登 記廠商 名稱：亞 亮生技 股份有 限公司
油菜	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次			適用於 油菜 籽。	原始登 記廠商 名稱：亞 亮生技 股份有 限公司