

「待普克利」農藥使用方法及其範圍

45.5% 待普克利 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
玉米	銹病	0.2 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7-10	3	施藥時藥液均勻施於葉片上下兩面。	9		

500 G/L (50% W/V)待普克利 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
玉米	銹病	0.2 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7-10	3	施藥時藥液均勻施於葉片上下兩面。	9		
水稻	紋枯病	0.333 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	14	連續 2 次		21		本項新增。原始登記廠商名稱：台灣先正達股份有限公司

45.5%待普克利 濃懸乳劑 (SE)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
玉米	銹病	0.2 公升	5,000	發病開始時施藥一次。	7-10	3	施藥時藥液均勻施於葉片上下兩面。	9		