

「液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05」農藥使用方法及其範圍

一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	有效成分
液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Tcba05	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Tcba05

二、「液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05」農藥使用方法與範圍一覽表

1×10⁹ CFU/G 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 可濕性粉劑(WP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
菜豆	萎凋病	36.3 公斤	250	菜豆種子直 播或定植 後，待長出 第3~4片葉 子完全展開 後，開始進 行施用。	7	共8次			應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	原始登 記廠商 名稱：福 壽實業 股份有 限公司

1×10⁹ CFU/ML 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 水懸劑(SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
菜豆	萎凋病	36.3 公升	250	菜豆種子直 播或定植 後，待長出 第3~4片葉 子完全展開 後，開始進 行施用。	7	共8次			應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。	原始登 記廠商 名稱：福 壽實業 股份有 限公司