

## 「三氟敏」農藥使用方法及其範圍

43.7% 三氟敏 水懸劑 (SC)

| 作物名稱       | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用量                            | 稀釋<br>倍數 | 使用時<br>期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項   | 說明     |
|------------|------|--|----------|-------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|--------|
| 水稻         | 紋枯病  | 每公斤<br>種子加<br>6 毫升<br>藥劑與<br>9 毫升<br>水 |          |                         |                 |          |          |                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用範圍：水稻紋枯病（水稻種子處理）</li> <li>2. 芽長度不超過 0.5 毫米，即和藥液混拌均勻。</li> <li>3. 混拌藥液之稻種，靜置陰涼處 10-15 分鐘，使藥液完全附著於稻種。</li> <li>4. 藥劑與水混合後再拌種。</li> </ol> |        |
| 蔥科小葉<br>菜類 | 銹病   | 0.2-0.6<br>公升                          | 3,500    | 病害發<br>生初期<br>開始施<br>藥。 | 7               |          |          | 12               | 抽苔後不得使用。   |        |
| 蔥科根菜<br>類  | 銹病   | 0.2-0.6<br>公升                          | 3,500    | 病害發<br>生初期<br>開始施<br>藥。 | 7               |          |          | 21               | 抽苔後不得使用。   |        |
| 金針         | 銹病   | 0.2-0.6<br>公升                          | 3,500    | 病害發<br>生初期<br>開始施<br>藥。 | 7               |          |          | 7                | 金針採收前 7 天、碧玉筍採收前 21 天停止施藥。   | 本項修正漏字 |

| 作物名稱   | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時<br>期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項   | 說明       |
|--|------|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|--------|----------|
| 草莓   | 炭疽病  | 0.3-0.7<br>公升   | 3,000    | 病害發<br>生初期<br>開始施<br>藥。 | 7               |          |          | 7                |        |          |
| 蓮霧   | 炭疽病  |                 | 3,000    | 開花盛<br>期施<br>藥。         | 7-10            | 3-4      |          | 20               |        |          |
| 百合   | 銹病   | 0.2-0.6<br>公升   | 3,500    | 病害發<br>生初期<br>開始施<br>藥。 | 7               |          |          | 21               |        |          |
| 山茶科茶<br>類  | 炭疽病  | 0.3-0.9<br>公升   | 3,400    | 病害發<br>生初期<br>開始施<br>藥。 | 7               |          |          | 14               |        |          |
| 菜豆<br>豌豆<br>花豆<br>樹豆<br>菜豆<br>蠶豆<br>扁豆<br>翼豆<br>刀豆<br>豇豆 | 銹病   | 0.2-0.5<br>公升   | 3,000    | 病害發<br>生初期<br>開始施<br>藥。 | 7               | 共 2 次    |          | 7                | 適用於鮮豆。 | 本項新<br>增 |

500 G/L (50% W/V) 三氟敏 水懸劑 (SC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量                        | 稀釋<br>倍數 | 使用時期 | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                             | 說明 |
|------|------|--|----------|------|-----------------|----------|----------|------------------|----------------------------------|----|
| 水稻   | 紋枯病  | 每公斤<br>種子加<br>6 毫升<br>藥劑與<br>9 毫升<br>水 |          |      |                 |          |          |                  | 1. 使用範圍：水稻紋枯病（水稻種子處理）<br>2. 芽長度不 |    |

| 作物名稱       | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項   | 說明         |
|------------|------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|------------|
|            |      |                 |          |                     |                 |          |          |                  | 超過 0.5<br>毫米，即<br>和藥液混<br>拌均勻。<br>3. 混拌藥液<br>之稻種，<br>靜置陰涼<br>處 10-15<br>分鐘，使<br>藥液完全<br>附著於稻<br>種。<br>4. 藥劑與水<br>混合後再<br>拌種。 |            |
| 蔥科小葉<br>菜類 | 銹病   | 0.2-0.5<br>公升   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 12               | 抽苔後不得使<br>用。   |            |
| 蔥          | 銹病   | 0.3-0.5<br>公升   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 12               |  |            |
| 蔥科根菜<br>類  | 銹病   | 0.2-0.5<br>公升   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 21               | 抽苔後不得使<br>用。   |            |
| 金針         | 銹病   | 0.2-0.5<br>公升   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 7                | 金針採收前 7<br>天、碧玉筍採<br>收前 21 天停止<br>施藥。  | 本項修<br>正漏字 |
| 瓜菜類        | 蔓枯病  | 0.25 公<br>升     | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4        |          | 18               | 本藥劑使用範<br>圍：瓜菜類蔓<br>枯病（胡瓜除<br>外）。  |            |
| 瓜果類        | 蔓枯病  | 0.25 公<br>升     | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4        |          | 18               |  |            |
| 香蕉         | 炭疽病  | 0.1-0.2         | 4,000    | 開花初期                | 7               |          |          | 18               |  |            |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項          | 說明 |
|------|------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------|---------------|----|
|      |      | 公升              |          | 施藥。                 |                 |          |          |                  |               |    |
| 木瓜   | 炭疽病  | 0.1-0.5<br>公升   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               |               |    |
| 番荔枝  | 銹病   | 0.2-0.4<br>公升   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 18               |               |    |
| 番荔枝  | 炭疽病  | 0.2-0.4<br>公升   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               |               |    |
| 酪梨   | 炭疽病  | 0.3-0.5<br>公升   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               |               |    |
| 紅龍果  | 炭疽病  | 0.2-0.4<br>公升   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               |               |    |
| 百香果  | 炭疽病  | 0.2-0.4<br>公升   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               |               |    |
| 紅毛丹  | 炭疽病  | 0.2-0.3<br>公升   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               |               |    |
| 葡萄   | 銹病   | 0.2 公升          | 6,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7-10            | 3        |          | 18               |               |    |
| 葡萄   | 晚腐病  | 0.2-0.4<br>公升   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               | 施藥至套袋前<br>為止。 |    |
| 楊桃   | 炭疽病  | 0.2-0.4<br>公升   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               | 施藥至套袋前<br>為止。 |    |
| 蓮霧   | 炭疽病  |                 | 3,000    | 開花盛期<br>施藥。         | 7-10            | 3-4      |          | 20               |               |    |
| 蓮霧   | 果腐病  |                 | 5,000    | 開花初期<br>起施藥。        | 7               |          |          | 21               | 施藥至套袋前<br>停止。 |    |
| 番石榴  | 炭疽病  | 0.3-0.5<br>公升   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               | 施藥至套袋前<br>為止。 |    |
| 無花果  | 炭疽病  | 0.2-0.4<br>公升   | 4,000    | 小果期施<br>藥。          | 7               |          |          | 18               |               |    |
| 龍眼   | 炭疽病  | 0.2-0.3<br>公升   | 4,000    | 開花初期<br>施藥          | 7               |          |          | 18               |               |    |
| 荔枝   | 炭疽病  | 0.2-0.3<br>公升   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               |               |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數  | 使用時期        | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                                | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|-----------|-------|-------------|---------|------|-------------------------------------|----------|------|----|
| 檬果   | 炭疽病  |           | 4,000 | 開花初期施藥。     | 7       |      | 結果後每隔14天施藥一次，至套袋前為止。如遇陰雨時，施藥間隔酌予縮短。 | 18       |      |    |
| 梨    | 炭疽病  | 0.3-0.5公升 | 4,000 | 開花初期施藥。     | 7       |      |                                     | 9        |      |    |
| 梨    | 黑星病  | 0.2-0.4公升 | 5,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |                                     | 9        |      |    |
| 梨    | 赤星病  | 0.2-0.3公升 | 6,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |                                     | 9        |      |    |
| 蘋果   | 炭疽病  | 0.2-0.3公升 | 4,000 | 開花初期施藥。     | 7       |      |                                     | 18       |      |    |
| 蘋果   | 黑星病  | 0.2公升     | 5,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |                                     | 18       |      |    |
| 桃    | 銹病   | 0.2-0.3公升 | 6,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |                                     | 18       |      |    |
| 桃    | 炭疽病  | 0.3-0.5公升 | 4,000 | 開花初期施藥。     | 7       |      |                                     | 18       |      |    |
| 桃    | 黑星病  | 0.2-0.4公升 | 5,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |                                     | 18       |      |    |
| 梅    | 銹病   | 0.2-0.3公升 | 6,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |                                     | 18       |      |    |

| 作物名稱                       | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數   | 使用時期        | 施藥間隔(天) | 施藥次數  | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                                 | 說明   |
|----------------------------|------|-----------|--------|-------------|---------|-------|------|----------|--------------------------------------|------|
| 梅                          | 炭疽病  | 0.3-0.5公升 | 4,000  | 開花初期施藥。     | 7       |       |      | 18       |                                      |      |
| 梅                          | 黑星病  | 0.2-0.4公升 | 5,000  | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |       |      | 18       |                                      |      |
| 李                          | 銹病   | 0.2-0.3公升 | 6,000  | 病害發生初期開始施藥。 | 10      |       |      | 18       |                                      |      |
| 枇杷                         | 炭疽病  | 0.4-0.5公升 | 4,000  | 開花初期施藥。     | 7       |       |      | 18       |                                      |      |
| 鼠李科梨果類                     | 銹病   | 0.1-0.2公升 | 6,000  | 病害發生初期開始施藥。 | 10      |       |      | 18       |                                      |      |
| 鼠李科梨果類                     | 白粉病  |           | 5,000  | 結果初期施藥 1 次。 |         | 1     |      | 18       |                                      |      |
| 柿                          | 炭疽病  | 0.3-0.4公升 | 4,000  | 開花初期施藥。     | 7       |       |      | 18       |                                      |      |
| 柑桔類                        | 黑點病  | 0.1-0.2公升 | 10,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |       |      | 21       | 金桔、金柑採收前 27 天停止施藥。其他柑桔類採收前 21 天停止施藥。 |      |
| 柑桔類                        | 黑點病  |           | 10,000 | 自謝花後施藥。     | 21      | 4     |      | 14       |                                      |      |
| 百合                         | 銹病   | 0.2-0.5公升 | 4,000  | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |       |      | 21       |                                      |      |
| 山茶科茶類                      | 炭疽病  | 0.3-0.8公升 | 4,000  | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |       |      | 14       |                                      |      |
| 菜豆<br>豌豆<br>花豆<br>樹豆<br>菜豆 | 銹病   | 0.1-0.4公升 | 4,000  | 病害發生初期開始施藥。 | 7       | 共 2 次 |      | 7        | 適用於鮮豆                                | 本項新增 |

| 作物名稱                       | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期 | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項 | 說明 |
|----------------------------|------|-----------------|----------|------|-----------------|----------|----------|------------------|------|----|
| 蠶豆<br>扁豆<br>翼豆<br>刀豆<br>豇豆 |      |                 |          |      |                 |          |          |                  |      |    |

50.0% 三氟敏 水分散性粒劑 (WG)

| 作物名稱       | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項                                  | 說明 |
|------------|------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------|---------------------------------------|----|
| 蔥科小葉<br>菜類 | 銹病   | 0.2-0.5<br>公斤   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 12               |                                       |    |
| 蔥          | 銹病   | 0.3-0.5<br>公斤   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 12               |                                       |    |
| 蔥科根菜<br>類  | 銹病   | 0.3-0.5<br>公斤   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 12               |                                       |    |
| 金針         | 銹病   | 0.2-0.5<br>公斤   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               |          |          | 7                | 金針採收前 7<br>天，碧玉筍採<br>收前 21 天停止<br>施藥。 |    |
| 瓜菜類        | 蔓枯病  | 0.25 公<br>斤     | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4        |          | 18               | 本藥劑使用範<br>圍：瓜菜類蔓<br>枯病（胡瓜除<br>外）。     |    |
| 瓜果類        | 蔓枯病  | 0.25 公<br>斤     | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 4        |          | 18               |                                       |    |
| 香蕉         | 炭疽病  | 0.1-0.2<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               |                                       |    |
| 木瓜         | 炭疽病  | 0.1-0.5<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |          | 18               |                                       |    |
| 番荔枝        | 銹病   | 0.2-0.4         | 4,000    | 病害發生                | 7               |          |          | 18               |                                       |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法            | 安全<br>採收<br>期<br>(天) | 注意事項          | 說明 |
|------|------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------------|---------------|----|
|      |      | 公斤              |          | 初期開始<br>施藥。         |                 |          |                     |                      |               |    |
| 番荔枝  | 炭疽病  | 0.2-0.4<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |                     | 18                   |               |    |
| 酪梨   | 炭疽病  | 0.3-0.5<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |                     | 18                   |               |    |
| 紅龍果  | 炭疽病  | 0.2-0.4<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |                     | 18                   |               |    |
| 百香果  | 炭疽病  | 0.2-0.4<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |                     | 18                   |               |    |
| 紅毛丹  | 炭疽病  | 0.2-0.3<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |                     | 18                   |               |    |
| 葡萄   | 銹病   | 0.2 公斤          | 6,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7-10            | 3        |                     | 18                   |               |    |
| 葡萄   | 晚腐病  | 0.2-0.4<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |                     | 18                   | 施藥至套袋前<br>為止。 |    |
| 楊桃   | 炭疽病  | 0.2-0.4<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |                     | 18                   | 施藥至套袋前<br>為止。 |    |
| 蓮霧   | 炭疽病  |                 | 3,000    | 開花盛期<br>施藥。         | 7-10            | 3-4      |                     | 21                   |               |    |
| 蓮霧   | 果腐病  |                 | 5,000    | 開花初期<br>起施藥。        | 7               |          |                     | 21                   | 施藥至套袋前<br>停止。 |    |
| 番石榴  | 炭疽病  | 0.3-0.5<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |                     | 18                   | 施藥至套袋前<br>為止。 |    |
| 無花果  | 炭疽病  | 0.2-0.4<br>公斤   | 4,000    | 小果期施<br>藥。          | 7               |          |                     | 18                   |               |    |
| 龍眼   | 炭疽病  | 0.2-0.3<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |                     | 18                   |               |    |
| 荔枝   | 炭疽病  | 0.2-0.3<br>公斤   | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          |                     | 18                   |               |    |
| 檬果   | 炭疽病  |                 | 4,000    | 開花初期<br>施藥。         | 7               |          | 結果後<br>每隔 14<br>天施藥 | 18                   |               |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數  | 使用時期        | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                      | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|-----------|-------|-------------|---------|------|---------------------------|----------|------|----|
|      |      |           |       |             |         |      | 一次，至套袋前為止。如遇陰雨時，施藥間隔酌予縮短。 |          |      |    |
| 梨    | 炭疽病  | 0.3-0.5公斤 | 4,000 | 開花初期施藥。     | 7       |      |                           | 9        |      |    |
| 梨    | 黑星病  |           | 5,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7-10    | 4    |                           | 9        |      |    |
| 梨    | 黑星病  | 0.2-0.4公斤 | 5,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |                           | 9        |      |    |
| 梨    | 赤星病  | 0.2-0.3公斤 | 6,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |                           | 9        |      |    |
| 蘋果   | 炭疽病  | 0.2-0.3公斤 | 4,000 | 開花初期施藥。     | 7       |      |                           | 18       |      |    |
| 蘋果   | 黑星病  | 0.2公斤     | 5,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |                           | 18       |      |    |
| 桃    | 銹病   | 0.2-0.3公斤 | 6,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |                           | 18       |      |    |
| 桃    | 炭疽病  | 0.3-0.5公斤 | 4,000 | 開花初期施藥。     | 7       |      |                           | 18       |      |    |
| 桃    | 黑星病  | 0.2-0.4公斤 | 5,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |                           | 18       |      |    |
| 梅    | 銹病   | 0.2-0.3公斤 | 6,000 | 病害發生初期開始    | 7       |      |                           | 18       |      |    |

| 作物名稱   | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數   | 使用時期        | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                             | 說明           |
|--------|------|-----------|--------|-------------|---------|------|------|----------|----------------------------------|--------------|
|        |      |           |        | 施藥。         |         |      |      |          |                                  |              |
| 梅      | 炭疽病  | 0.3-0.5公斤 | 4,000  | 開花初期施藥。     | 7       |      |      | 18       |                                  |              |
| 梅      | 黑星病  | 0.2-0.4公斤 | 5,000  | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |      | 18       |                                  |              |
| 李      | 銹病   | 0.2-0.3公斤 | 6,000  | 病害發生初期開始施藥。 | 10      |      |      | 18       |                                  |              |
| 枇杷     | 炭疽病  | 0.4-0.5公斤 | 4,000  | 開花初期施藥。     | 7       |      |      | 18       |                                  |              |
| 鼠李科梨果類 | 銹病   | 0.1-0.2公斤 | 6,000  | 病害發生初期開始施藥。 | 10      |      |      | 18       |                                  |              |
| 鼠李科梨果類 | 銹病   | 0.1-0.2公斤 | 6,000  | 病害發生初期開始施藥。 | 10      |      |      | 18       |                                  | 重複範圍，本項刪除    |
| 鼠李科梨果類 | 白粉病  |           | 5,000  | 結果初期施藥1次。   |         | 1    |      | 18       |                                  |              |
| 柿      | 炭疽病  | 0.3-0.4公斤 | 4,000  | 開花初期施藥。     | 7       |      |      | 18       |                                  |              |
| 柑桔類    | 黑點病  | 0.1-0.2公斤 | 10000  | 病害發生初期開始施藥  | 7       |      |      | 21       | 金桔、金柑採收前27天停止施藥。其他柑桔類採收前21天停止施藥。 |              |
| 柑桔     | 黑點病  |           | 10,000 | 自謝花後施藥。     | 21      | 4    |      | 14       |                                  | 本項修正為原登記作物品項 |
| 百合     | 銹病   | 0.2-0.5公斤 | 4,000  | 病害發生初期開始施藥。 | 7       |      |      | 21       |                                  |              |
| 山茶科茶   | 炭疽病  | 0.3-0.8   | 4,000  | 病害發生        | 7       |      |      | 14       |                                  |              |

| 作物名稱   | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期<br>(天) | 注意事項   | 說明       |
|--|------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|----------------------|--------|----------|
| 類  |      | 公斤              |          | 初期開始<br>施藥。         |                 |          |          |                      |        |          |
| 菜豆<br>豌豆<br>花豆<br>樹豆<br>菜豆<br>蠶豆<br>扁豆<br>翼豆<br>刀豆<br>豇豆 | 銹病   | 0.1-0.4<br>公斤   | 4,000    | 病害發生<br>初期開始<br>施藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 7                    | 適用於鮮豆。 | 本項新<br>增 |