

檔號：

保存年限：

財團法人台灣香蕉研究所

函

地址：904 屏東縣九如鄉玉泉村榮泉街 1 號

承辦人：翁敏雄

電話：(08)7392111~3

傳真：(08)7390595

E-mail：kaofone@yahoo.com.tw

受文者：台南市政府農業局

發文日期：中華民國 108 年 12 月 17 日

發文字號：(108)台蕉研發字第 3424 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：蕉株抽穗期間為花薊馬好發期，籲請蕉農務必適時防治，俾確保生產外觀優良品質，請查照。

說明：

- 一、若香蕉花苞抽出莖頂，尚未彎曲前未能及時做好花薊馬防治，易導致花薊馬侵入花苞，在香蕉幼果果皮上產卵及吸取汁液，造成果皮外表出現許多卵斑及水銹疤痕，影響香蕉外觀品質至鉅。
- 二、防治方法：抽穗期每 3-5 天巡視蕉園 1 次，在花苞抽出莖頂前期或初彎前，選擇下列一種藥劑配方防治：
 - (一)以 2.8%賽洛寧乳劑 2,000 倍液，噴施剛抽出莖頂或初彎下花苞，每隔 5 天噴施 1 次，共噴 3 次。
 - (二)5 %陶斯松粒劑每株 15 公克撒施於第 1、2 葉鞘內。
 - (三)終花後切除花苞，減少蕉園花薊馬密度。
 - (四)定期防除蕉園雜草，避免花薊馬滋生擴散。



正本：台灣香蕉、芒果外銷業者聯誼會、台灣省青果運銷合作社、台灣省青果運銷合作社高雄分社、屏東分社、台中分社、嘉南分社、東台分社、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台中市政府農業局、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府農業局、高雄市政府農業局、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府
副本：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、行政院農業委員會農糧署、本所農場

農業局 108/12/18



1081476383

財團法人台灣香蕉研究所
香蕉病蟲害預測中心

