

# 防疫之公眾集會 因應指引

(20200304版本)



# 定義

- 人數超過**1000人**
- 包含自發性、計畫性的活動
- 舉例：  
開學/畢業典禮、  
**節慶/祭典**、  
運動賽事、  
宗教/政治/文化/學術/藝文/旅遊、  
法人/社團/非政府組織(NGO)性質之聚眾活動



# 風險評估

能否參加者資訊 (旅遊史、接觸史、症狀、體溫)	參加者座位是否固定 (避免換座位)
活動空間是否通風	活動持續時間
參加者之間距離是否 > 1 公尺	能否落實手部衛生及配 戴口罩

- 若為高風險建議延期、取消或以其他方式辦理
- 倘評估決定辦理，主辦者應訂定完善之防疫應變計畫
- 有慢性疾病、免疫力差者，建議避免參加集會活動

# 防護措施—集會前

## 環境




現場動線及住宿場所規劃、  
疑似個案暫時隔離或安置空間

## 醫療資源



## 建立相關單位之聯繫窗口



相關人員應熟悉通報流程

確立疑似個案後送醫院及流程

# 防護措施—集會前

- 宣導生病在家休息不參加集會活動

- 活動空間及用具預先清潔消毒



- 設置充足的洗手設施




# 集會時

- 加強衛教 (海報、LED螢幕等)



- 安排人員量體溫



- 持續關注傳染病現況



# 集會時

- 目前不建議所有參加者與工作人員全面配戴口罩
- 但若
  1. 可能經常直接面對面接觸出現呼吸道症狀患者
  2. 須在人潮眾多之密閉場所工作之人員則建議配戴口罩



# 相關人員健康管理

- 落實自我健康狀況監測

倘有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ；額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ )、呼吸道症狀或腹瀉等應主動向單位主管或負責人員報告，並採取適當的防護措施及引導就醫治療

- 制定請假規則及工作人力備援規劃



- 照護暫時留置之呼吸道症狀患者，應配戴外科口罩，並勤洗手



# 參考資料



**衛生福利部疾病管制署**

Taiwan Centers for Disease Control

<https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/V6Xe4EItDW3NdGTgC5PtKA>