

臺灣小型食肉目動物相關資料

臺北市立動物園

一、鼬獾

1. 學名：*Melogale moschata subaurantiaca*
2. 英文名：Formosan Ferret-badger
3. 別名：臭狸
4. 分類地位：哺乳綱/食肉目/鼬科
5. 保育等級：一般類野生動物
6. 外型特徵：頭體長 35~40 公分，尾長 14~20 公分，體重 1~1.7 公斤。背部色調一般為灰棕色到棕黑色，腹部顏色較淺，頭頂經後頸至背中央有一白色縱帶條紋。四肢短，腳寬大，爪長而強壯利於挖掘。尾呈叢狀，具白色長毛。
7. 食性：為雜食性，食物來源主要為動物，包括蛙類、蜥蜴、小型啮齒類、昆蟲、蚯蚓、蝸牛、果實等。
8. 生態習性：為夜行性動物，白天會在樹洞、土洞或岩洞中休息。臭腺發達，當受驚嚇或被逼迫時會由分泌具惡臭之氣味以驅敵。
9. 棲地分布：分布於低、中海拔山區，常棲息於闊葉林、灌叢或開墾地，分布海拔可達 2100 公尺，活動範圍約 2~11 公頃。



(鼬獾，詹德川攝影)

二、白鼻心

1. 學名：*Paguma larvata taivana*
2. 英文名：Formosan Gem-faced civet、Masked palm civet
3. 別名：果子狸、白面狸、烏腳香、玉面貓
4. 分類地位：哺乳綱/食肉目/靈貓科
5. 保育等級：保育類野生動物 III(其他應予保育之野生動物)
6. 外型特徵：體長 48~50 公分，尾長 37~41 公分。
白鼻心的體型略為圓胖、四肢粗短、頭部黑色，由額至鼻端有一明顯白帶。軀幹顏色全為褐色，惟腹部較背部稍淡；而後頸、肩、四肢之下部為黑色，喉部淡黑色。尾部前半與背部同色，後半為黑色。
7. 食性：為雜食性，以果實為主食，亦會捕食小型動物，包括哺乳類、鳥類、昆蟲等。
8. 生態習性：為夜行性動物，擅於爬樹，約傍晚開始外出覓食、活動，至翌日早上又返回洞穴中。肛門附近有臭腺，遇敵時會釋出異味驅敵。
9. 棲地分布：分布於 2700 公尺以下的森林，以低海拔闊葉林的數量最多，對人為干擾環境的適應力佳。



(白鼻心，詹德川攝影)

三、麝香貓

1. 學名：*Viverricula indica pallida*
2. 英文名：Small Chinese Civet
3. 別名：九節貓、筆貓
4. 分類地位：哺乳綱/食肉目/靈貓科
5. 保育等級：保育類野生動物 II(珍貴稀有野生動物)
6. 外型特徵：頭體長 52~55 公分，尾長約 30~31 公分，體重約 2~4 公斤。頭細長、耳大、鼻尖，皮毛黃褐，



(麝香貓，詹德川攝影)

- 喉部色較淡，身體上半部有小黑點，而後半部則有排列整齊成縱紋的較大黑點。後背自頸部至尾部身體末端有數條排列整齊的黑褐色縱紋、尾部有 8~9 個黑白相間的環帶。
7. 食性：為肉食性，包括昆蟲、蚯蚓、鼠類及爬蟲類。
 8. 生態習性：雌雄均有麝香腺，分泌物具有強烈之臭味，牠們會把腺體所分泌的特殊氣味塗在岩石或樹幹上，作為領域標示的記號。為夜行性，有時亦見白天活動，如被其他動物追趕時，通常只避於草叢中，卻很少爬至樹上避敵。
 9. 棲地分布：大多分佈於低海拔至 1000 公尺左右的山區，主要棲息在濃密的原始闊葉林中。目前野生族群現況與分布仍不清楚，可能為不連續分布的小族群。在福山植物園、高雄六龜至屏東高樹淺山區有較明確的族群分布。

四、石虎

1. 學名：*Prionailurus bengalensis chinensis*
2. 英文名：Leopard cat
3. 別名：山貓、金錢貓、華南豹貓
4. 分類地位：哺乳綱/食肉目/貓科
5. 保育等級：保育類野生動物 I(瀕臨絕種野生動物)
6. 外型特徵：



(石虎，詹德川攝影)

- 頭體長 55~65 公分、尾長 27~30 公分、體重 3~6 公斤。
- 石虎外型與家貓類似，尾部與身體的比例較家貓長，尾部與身體的比例為 1:2。重要的分辨特徵為耳背的黑底白斑，和頭頂至兩眼內側的灰白色縱帶。
7. 食性：為肉食性，食物以鼠類為主，其他還包括小型哺乳類、鳥類、兩棲類與爬蟲類。
 8. 生態習性：石虎為夜行性動物，白天棲居於樹洞、大樹根之洞穴或岩洞中，夜間單獨行動。
 9. 棲地分布：分布在 500~1500 公尺的闊葉林，主要分布地為臺灣西部的桃園至台南之間，其中苗栗、臺中和南投等地是現存認為族群較穩定的地區。石虎的活動範圍約為 4 至 6 平方公里。野外救傷資料顯示，石虎受傷的原因多為獸銜。

五、食蟹獾

1. 學名：*Herpestes urva*
2. 英文名：Crab-eating Mongoose
3. 別名：棕簞貓
4. 分類地位：哺乳綱/食肉目/獾科
5. 保育等級：保育類野生動物 II(珍貴稀有野生動物)
6. 外型特徵：頭體長 36~46 公分、尾長 17~28 公分，體重 1.8~3.2 公斤。口鼻尖，身軀細長，軀幹中央部份略膨大，從頭部兩側到肩部有明顯的白色條紋。四肢短，腳趾間有蹼。
7. 食性：食性很廣，食物包括淡水蟹、蝸牛、昆蟲、青蛙、蜥蜴、老鼠、鳥類、魚類及蛇。
8. 生態習性：為日行性動物，以清晨或傍晚為活動高峰，大多單獨活動。棲息於溪流附近的森林中，以岩洞或自掘洞穴為居所，覓食時會移動至溪流附近，會將排遺排放在溪邊或林間的路徑上。
9. 棲地分布：在臺灣野外的分佈很廣，分布於低至中海拔山區森林與溪流附近。從海拔 200 公尺到 2600 公尺處人造或原始的闊葉林、針葉林或混生林中都曾觀察到其活動。



(食蟹獾，詹德川攝影)

六、華南鼬鼠

1. 學名：*Mustela sibirica*
2. 英文名：Golden weasel
3. 別名：黃鼠狼
4. 分類地位：哺乳綱/食肉目/貂科
5. 保育等級：一般類野生動物
6. 外型特徵：頭體長 25~34 公分、尾長 15~21 公分，體重約 300~600 公克，雄性體型大於雌性。頭部扁平、身體修長、四肢短小。夏季體背為赤褐色，冬季毛色變淡，鼻吻端及喉部有白斑。
7. 食性：肉食性，以野鼠、鳥類、鳥蛋、蛇類、蜥蜴類與大型昆蟲為主食，有一次大量攝取單一食物的習性。
8. 生態習性：為夜行性動物，但白天亦可發現，為臺灣最常見的貂科動物。活動範圍大，可達 0.11~2.16 公頃，並不因為氣候嚴寒而有冬眠或往低海拔遷移的現象。
9. 棲地分布：分布在低至高海拔，棲息在天然闊葉林、混生林、針葉林與高山草原為主，以中高海拔 1500 公尺至 3500 公尺之間的森林與箭竹原最常見。近幾年在臺北關渡地區也有出現的紀錄。



(華南鼬鼠，詹德川攝影)

台灣齧齒目鼠科(Muridae)動物共有5屬12種，較常見有9種，依其習性可區分為下列二大類群

一、住宅中鼠類---有下列三種：

- (一)溝鼠(*Rattus norvegicus*)—頭與軀幹20~28公分，尾16~18公分，體背面淡灰褐色，腹面灰白色，尾背面暗灰色，腹面黃白色。分布於全省各地，為住家中最大型鼠類。
- (二)亞洲家鼠(*Rattus tanezumi*)—舊稱屋頂鼠，頭與軀幹13~19公分，尾17~20公分，體背面黑色，腹面灰白色，尾黑褐色，背腹一致。
- (三)家鼯鼠(*Mus musculus*)—頭與軀幹6.8~7.6公分，尾8.3~8.9公分，體背面黃褐色，腹面較黃，尾背面灰黑色，腹面略淡。分布全省各地，喜侵入人家。

二、田野中鼠類---有下列六種：

- (一)小黃腹鼠(*Rattus losea*)—頭與軀幹14~16公分，尾14~16公分，體背面濃褐色，向體側漸淡，至腹面為灰白色，尾黑色，背腹一致。為田野中佔最大多數的鼠類，全省皆有。
- (二)鬼鼠(*Bandicota indica*)—頭與軀幹20~28公分，尾17~25公分，為台灣最大鼠類，體格壯，四肢強大，耳圓，尾粗大。體背面暗褐色，腹面淡色或帶白褐色，尾灰褐色，背腹一致。分布於全省各地。
- (三)田鼯鼠(*Mus caroli*)—頭與軀幹6.3~8.9公分，尾7.0~9.6公分，體背面暗灰色，腹面灰白色，背腹之界顯明，尾背面暗褐色，腹面淡黃色，二者界線明顯。分布於全省農地中。
- (四)赤背條鼠(*Apodemus agrarius*)—頭與軀幹5.4~9.6公分，尾6.8~8.3公分，體背面暗黃褐色，腹面灰白色，背部中央有一黑色縱帶，自頭額以到尾根，尾部背面暗青褐色，腹面灰色。主要分布地為耕地，如甘蔗園、菜園附近，最高能達2,700公尺。
- (五)刺鼠(*Rattus coxinga*)—頭與軀幹16~19公分，尾15~25公分，體背面暗黃褐色，有硬的剛毛雜生於軟毛之間，腹面乳白色，尾雙色背灰腹白，尾端白色。產於台北、台中、高雄、花蓮、台東各地，由山腳以至海拔2,900公尺處。
- (六)緬甸小鼠(*Rattus exulans*)—頭與軀幹12.4~13.3公分，尾11.6~15.2公分，體背面棕褐色，腹灰白色。尾暗褐色，背腹一致。分布於花蓮縣。

臭鼩(*Suncus murinus*)--常於住宅內外發現，屬於食蟲目(Insectivora)尖鼠科(Soricidae)，頭與軀幹11~15公分，尾6.5~8.7公分，體背面褐灰色，腹面較淡，體軀與四肢較為纖細，頭骨纖長，吻端尖，尾短，尾毛長而疏，耳殼小，喜入人家，行走時作擲錢聲，故又名錢鼠。

老鼠與錢鼠簡易檢索表

