

一、三氟敏

50.000%三氟敏 WG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
蓮霧	炭疽病		3,000	開花盛期施藥	7-10	3-4		21		延伸使用	1061027

500 G/L (50% W/V)%三氟敏 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
香蕉	炭疽病	0.1-0.2 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
木瓜	炭疽病	0.1-0.5 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
番荔枝	炭疽病	0.2-0.4 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
酪梨	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
紅龍果	炭疽病	0.2-0.4 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
百香果	炭疽病	0.2-0.4 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
紅毛丹	炭疽病	0.2-0.3 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
楊桃	炭疽病	0.2-0.4 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	施藥至套袋前 為止	延伸使用	1061027
番石榴	炭疽病	0.3-0.5	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	施藥至套袋前	延伸使用	1061027

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
		公升							為止		
無花果	炭疽病	0.2-0.4 公升	4,000	小果期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
龍眼	炭疽病	0.2-0.3 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
荔枝	炭疽病	0.2-0.3 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
檬果	炭疽病		4,000	開花初期施藥	7	-	結果後每隔14天施藥一次，至套袋前為止。如遇陰雨時，施藥間隔酌予縮短。	18		延伸使用	1061027
梨	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	9	-	延伸使用	1061027
蘋果	炭疽病	0.2-0.3 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
桃	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
梅	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
枇杷	炭疽病	0.4-0.5 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
柿	炭疽病	0.3-0.4 公升	4,000	開花初期施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
瓜菜類	蔓枯病	0.25 公升	4,000	病害發生初期	7	4	-	18	本藥劑使用範	延伸使用	1061027

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
				開始施藥					圍：瓜菜類蔓枯病（胡瓜除外）		
瓜果類	蔓枯病	0.25 公升	4,000	病害發生初期 開始施藥	7	4		18		延伸使用	1061027
蔥	銹病	0.3-0.5 公升	4,000	病害發生初期 開始施藥	7			12		延伸使用	1061027
葡萄	銹病	0.2 公升	6,000	病害發生初期 開始施藥	7-10	3		18		延伸使用	1061027
桃	銹病	0.2-0.3 公升	6,000	病害發生初期 開始施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
梅	銹病	0.2-0.3 公升	6,000	病害發生初期 開始施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
李	銹病	0.2-0.3 公升	6,000	病害發生初期 開始施藥	10	-	-	18	-	延伸使用	1061027
鼠李科 梨果類	銹病	0.1-0.2 公升	6,000	病害發生初期 開始施藥	10	-	-	18	-	延伸使用	1061027
梨	黑星病	0.2-0.4 公升	5,000	病害發生初期 開始施藥	7	-	-	9	-	延伸使用	1061027
蘋果	黑星病	0.2 公升	5,000	病害發生初期 開始施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
桃	黑星病	0.2-0.4 公升	5,000	病害發生初期 開始施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027
梅	黑星病	0.2-0.4 公升	5,000	病害發生初期 開始施藥	7	-	-	18	-	延伸使用	1061027

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
葡萄	晚腐病	0.2-0.4公升	4,000	開花初期施藥	7	—	—	18	施藥至套袋前為止	延伸使用	1061027
蓮霧	果腐病		5,000	開花初期起施藥	7	—		21	施藥至套袋前停止	延伸使用	1061027
梨	赤星病	0.2-0.3公升	6,000	病害發生初期開始施藥	7	—	—	9	—	延伸使用	1061027
鼠李科梨果類	白粉病	—	5,000	結果初期施藥1次	—	1	—	18		延伸使用	1061027

二、 可尼丁

0.500%可尼丁 GR

● 對蜜蜂有劇毒性

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
茄科果菜類	粉蝨類	60 公斤		定植後於畦上施藥 1 次。						延伸使用	1061027
豆科乾豆類	潛蠅類	60 公斤		定植後於畦上施藥 1 次，施藥後全園灌水至畦面濕潤。						延伸使用	1061027
豌豆	潛蠅類	60 公斤		定植後於畦上施藥 1 次，施藥後全園灌水至畦面濕潤。					適用於葉用豌豆。	延伸使用	1061027
豆薯	潛蠅類	60 公斤		定植後於畦上施藥 1 次，施藥後全園灌水至畦面濕潤。						延伸使用	1061027
狗尾草	潛蠅類	60 公斤		定植後於畦上施藥 1 次，施藥後						延伸使用	1061027

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
				全園灌水至畦面濕潤。							
闊葉大豆	潛蠅類	60 公斤		定植後於畦上施藥 1 次，施藥後全園灌水至畦面濕潤。						延伸使用	1061027
豆菜類	潛蠅類	60 公斤		定植後於畦上施藥 1 次，施藥後全園灌水至畦面濕潤。						延伸使用	1061027
大豆	粉蝨類	60 公斤		播種後 21 天畦上施藥 1 次。施藥後全園灌水至畦面濕潤。						延伸使用	1061027

16. 000%可尼丁 SG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
茄科果菜類	粉蝨類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			7		延伸使用	1061027
油茶	葉蟬類	0.25 - 0.75 公斤	4,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	7			21	避免於開花期使用。	延伸使用	1061027
茶	葉蟬類	0.25 - 0.75 公斤	4,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	7			21	避免於開花期使用。	延伸使用	1061027
山茶	葉蟬類	0.25 - 0.75 公斤	4,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	7			21		延伸使用	1061027
茶	葉蟬類	0.25 - 0.75 公斤	4,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥	7			21	避免於開花期使用。	延伸使用	1061027
臺灣樂樹	薊馬類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7				避免於開花期使用。	延伸使用	1061027
檬果	薊馬類	0.3-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			6		延伸使用	1061027

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
香蕉	薊馬類	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			10		延伸使用	1061027
木瓜	薊馬類	0.2-0.7 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			10		延伸使用	1061027
百香果	薊馬類	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			10		延伸使用	1061027
茶	薊馬類	0.3-1 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			21	避免於開花期使用。	延伸使用	1061027
油茶	薊馬類	0.3-1 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			21	避免於開花期使用。	延伸使用	1061027
山茶	薊馬類	0.3-1 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			21		延伸使用	1061027
茶	薊馬類	0.3-1 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			21	避免於開花期使用。	延伸使用	1061027

三、可濕性硫黃

52.000%可濕性硫黃 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
蔬菜	白粉病	1.5-1.8 公升	650	病害發生初期開始施藥	7				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027
果樹	白粉病	0.4-2.5 公升	800	病害發生初期開始施藥	10				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027

75.000%可濕性硫黃 WP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
蔬菜	白粉病	1.1-1.3 公斤	950	病害發生初期開始施藥	7				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027
果樹	白粉病	0.3-1.7 公斤	1,200	病害發生初期開始施藥	10				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027

80.000%可濕性硫黃 WG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
蔬菜	白粉病	1.0-1.2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥	7				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027
果樹	白粉病	0.3-1.7 公斤	1,200	病害發生初期開始施藥	10				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027

80.000%可濕性硫黃 WP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
蔬菜	白粉病	1.0-1.2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥	7				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027
果樹	白粉病	0.3-1.7 公斤	1,200	病害發生初期開始施藥	10				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027

90.000%可濕性硫黃 WP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
蔬菜	白粉病	0.9-1.0 公斤	1,150	病害發生初期開始施藥	7				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027
果樹	白粉病	0.3-1.5 公斤	1,400	病害發生初期開始施藥	10				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027

95.000%可濕性硫黃 WP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
蔬菜	白粉病	0.8-1.0 公斤	1,200	病害發生初期開始施藥	7				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027
果樹	白粉病	0.3-1.5 公斤	1,400	病害發生初期開始施藥	10				高溫易生藥害，避免於盛花期使用。	延伸使用	1061027

四、 布芬淨

40.000%布芬淨 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
水稻	褐飛蟲	0.48 公升	2,500	孕穗末期若蟲發生盛期	-	-		15	1. 本劑對若蟲防治效果較佳。2. 宜於水稻孕穗末期若蟲發生盛期使用一次。	延伸使用	1061027
小葉	粉蝨類	0.6-0.9 公	2,500	害蟲發生時開	7	2		6		延伸	1061027

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
菜類		升		始施藥						使用	
瓜菜類	粉蝨類	0.67-1.13公升	1,500	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	15	本藥劑使用範圍：瓜菜類粉蝨類（胡瓜除外）	延伸使用	1061027
瓜果類	粉蝨類	0.67-1.13公升	1,500	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	15		延伸使用	1061027
菊	粉蝨類	0.2-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥	7		藥液應噴到葉背	12		延伸使用	1061027
花椰菜	銀葉粉蝨	0.67-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥	-	2		15		延伸使用	1061027
芥藍	銀葉粉蝨	0.6-0.9公升	2,500	害蟲發生時開始施藥	7	2		6		延伸使用	1061027
瓜果類	銀葉粉蝨	0.67-1.13公升	1,500	害蟲發生時開始施藥	7	-		15		延伸使用	1061027
花木	銀葉粉蝨		1,500	害蟲發生時開始施藥	7	-	應噴到葉背	-	限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試	延伸使用	1061027
菊	溫室粉蝨	0.4-0.8公升	1,500	發現葉片有溫室粉蝨時開始施藥	7	-	藥液應噴到葉背	-		延伸使用	1061027
梨	梨木蝨	0.96公升	2,500	害蟲發生時開始施藥	7	2		9		延伸使用	1061027
檬果	檬果木蝨	0.38-0.81公升	1,200	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	15	-	延伸使用	1061027
檬果	葉蟬類		1,200	抽穗及開花期害蟲發生時開	10	-		15	為保護授粉昆蟲及天敵，盛花期避免施藥	延伸使用	1061027

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
				始施藥							

五、 芬佈賜

50.000%芬佈賜 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
蘭科作物	檢疫處理	-	-	檢疫處理時 施藥 1 次	-	1	-	-	施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定 處理	延伸 使用	1061027

六、 阿巴汀

2.000%阿巴汀 EW

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
枸杞	銹蟬類	0.25-0.75 公升	2,000	害蟎發生時開始 施藥	7	-	-	12		延伸 使用	1061027
茄科小葉 菜類	蟎蟬類	0.25- 0.75 公升	2,000	害蟎發生時開始 施藥	7			12		延伸 使用	1061027
茄科果菜 類	蟎蟬類	0.25- 0.75 公升	2,000	害蟎發生時開始 施藥	7			12		延伸 使用	1061027
茄科根菜 類	蟎蟬類	0.25- 0.75 公升	2,000	害蟎發生時開始 施藥	7			12		延伸 使用	1061027

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
茉莉	葉蟬類	0.67-1.67 公升	1,500	害蟬發生時開始施藥	7			7		延伸使用	1061027
桑樹	銹蟬類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥	7	-	-	3	-	延伸使用	1061027
破布子	銹蟬類	0.45-1.0 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥	7	-	-	3	-	延伸使用	1061027
茶	銹蟬類	0.5-1.5 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥	7	-	-	14	避免於開花期使用。	延伸使用	1061027
葡萄	銹蟬類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥	7	-	-	3	避免於開花期使用。	延伸使用	1061027
蘭科作物	檢疫處理	-	-	檢疫處理時施藥1次	-	1	-	-	施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理	延伸使用	1061027

七、 保粒黴素 甲

10%(POLYOXIN-B 100,000AmBu/g)保粒黴素 甲 WP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
鼠李科梨果類	白粉病	1-2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥	7				藥劑使用濃度增高有發生藥害之慮。	延伸使用	1061027
檬果	白粉病	1-2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥	7				藥劑使用濃度增高有發生藥害之慮。	延伸使用	1061027
葫蘆科小葉	白粉病	1-2 公斤	1,000	病害發生初期開	7				藥劑使用濃度增高有發生藥	延伸	1061027

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
菜類				始施藥					害之慮。	使用	
瓜菜類	白粉病	1-2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥	7				藥劑使用濃度增高有發生藥害之慮。	延伸使用	1061027
瓜果類	白粉病	1-2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥	7				藥劑使用濃度增高有發生藥害之慮。	延伸使用	1061027

50%(POLYOXIN-B 500, 000AmBu/g)保粒黴素 甲 SG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
鼠李科梨果類	白粉病	0.2-0.4 公斤	5,000	病害發生初期開始施藥	7				藥劑使用濃度增高有發生藥害之慮。	延伸使用	1061027
檬果	白粉病	0.2-0.4 公斤	5,000	病害發生初期開始施藥	7				藥劑使用濃度增高有發生藥害之慮。	延伸使用	1061027
葫蘆科小葉菜類	白粉病	0.2-0.4 公斤	5,000	病害發生初期開始施藥	7				藥劑使用濃度增高有發生藥害之慮。	延伸使用	1061027
瓜菜類	白粉病	0.2-0.4 公斤	5,000	病害發生初期開始施藥	7				藥劑使用濃度增高有發生藥害之慮。	延伸使用	1061027
瓜果類	白粉病	0.2-0.4 公斤	5,000	病害發生初期開始施藥	7				藥劑使用濃度增高有發生藥害之慮。	延伸使用	1061027

八、 氟芬隆

9. 600%氟芬隆 DC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
高粱	玉米螟	0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥	7	-	-	7		延伸使用	1061027

九、 納乃得

25.000%納乃得 SP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
蘭科作物	檢疫處理	-	-	檢疫處理時施藥 1 次	-	1	-	-	施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理	延伸使用	1061027

40.000%納乃得 SG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
蘭科作物	檢疫處理	-	-	檢疫處理時施藥 1 次	-	1	-	-	施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理	延伸使用	1061027

40.000%納乃得 SPSB

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
蘭科作物	檢疫處理	-	-	檢疫處理時施藥 1 次	-	1	-	-	施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理	延伸使用	1061027

十、 滅普寧

40.000%滅普寧 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
芋	白絹病	2-2.4 公升	500	病害發生初期開始施藥	10	-	-	21	1. 本藥劑試驗時加展著劑「加展」2,500 倍。2. 若為水芋，先排水後再施藥。3. 施藥時勿噴及葉面，避免藥害發生。	延伸使用	1061027
胡蘿蔔	白絹病	2-2.4 公升	500	病害發生初期開始施藥	7	2		21	施藥時將藥劑噴及植株地際部	延伸使用	1061027
菱角	白絹病	2 公升	500	病害發生初期開始施藥	10	5		3		延伸使用	1061027
菠菜	苗立枯病	4 公克/每公斤種子			-	-	藥先溶於 10 毫升蒸餾水中再和 1 公斤種子充分混合	-	限拌種使用	延伸使用	1061027
菠菜	苗立枯病		800		-	-		-	限苗床使用。	延伸使用	1061027

75.000%滅普寧 WP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	通過日期
玉米	黑穗病	0.5 公克/每公斤種子		播種前拌種施藥	-	-	藥先溶於 10ML 蒸餾水中再和 1KG 種子充分混合	-	1. 種子經藥劑處理後乾燥，以保品質，若長期儲藏須置於攝氏 4-10 度之冷藏庫。2. 限拌種使用	延伸使用	1061027