

檔號：
保存年限：

財團法人台灣香蕉研究所 函

地址：904 屏東縣九如鄉玉泉村榮泉街 1 號
承辦人：蘇慶昌
電話：(08)7392111~3
傳真：(08)7390595
E-mail：succcc@yahoo.com.tw

受文者：台南市政府農業局
發文日期：中華民國 106 年 2 月 15 日
發文字號：(106)台蕉研發字第 2964 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：冬末初春時節，種植香蕉組織培養苗易發生香蕉嵌紋病及萎縮病危害，籲請宣導農友及時強化防治上揭兩病毒病害工作，俾確保蕉苗正常發育，請查照。

說明：

一、近日氣候適溫乾燥且無雨，尤以地處作物相繁雜蕉區，媒介病毒之帶毒有翅型蚜蟲蟲口密度恐有增高趨勢，而香蕉組織培養苗種植初期，因植株較小，易受棉蚜及蕉蚜兩媒介帶毒蚜蟲所傳播之香蕉嵌紋病及萎縮病危害，對蕉苗正常成活率影響至鉅，請蕉農務必加強防治工作。

二、預防方法：

(一)、疫區宜儘速拔除病株，減少感染源，並補植健康成熟度大之吸芽。規劃新植組織培養苗之蕉區附近，避免有豆科或茄科作物種植，並宜在種植區畦面覆蓋銀色反光塑膠布，忌避蚜蟲侵入。

(二)、強化蕉園及附近雜草等之防除。

(三)、噴施蚜蟲防治藥劑：定植組培蕉苗初期，每週噴施一次 40.64% 加保扶水懸劑 800 倍液，連續噴施 3 個月，減少蚜蟲危害風險。

(四)、其他防治藥劑參考植物保護手冊



正本：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、台灣香蕉、芒果外銷業者聯誼會、台灣省青果運銷合作社、台灣省青果運銷合作社高雄分社、屏東分社、台中分社、嘉南分社、東台分社、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台中市政府農業局、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府農業局、高雄市政府農業局、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府

副本：行政院農業委員會農糧署、本所農場

農業局 106/02/20



1060212118

台灣香蕉研究所病蟲害預測中心

