

檔號：

保存年限：

財團法人台灣香蕉研究所 函

地址：904 屏東縣九如鄉玉泉村榮泉街 1 號

承辦人：蘇慶昌

電話：(08)7392111~3

傳真：(08)7390595

E-mail：succccc@yahoo.com.tw

受文者：台南市政府農業局

發文日期：中華民國 105 年 8 月 29 日

發文字號：(105)台蕉研發字第 2886 號

速別：


密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：夏秋季節多雨期間，籲請 貴單位所屬轄區蕉農加強香蕉葉部病害防治作業，以確保香蕉良好之品質及產量，請 查照。

說明：

- 一、近日來午後雷陣雨頻仍，氣候高溫多濕，香蕉黑星病及葉斑病之病菌藉由雨水易發生傳播感染，對蕉株正常產期、產量及品質影響極大。因此，進入中株期至即將抽穗之蕉園，籲請蕉農務必把握香蕉葉部病害防治時機加強做好葉部病害防治工作。
- 二、噴藥前宜先行清園並割除下方嚴重受害之病葉(發病超過 30 %之枯葉)，以減少感染源。進入終花期之果串，需先將果房適當整梳後，再行套袋。套袋後，需將套袋拉直，並避免套袋頂端因形成凹槽，造成雨水蓄集於套袋上方，引發套袋破裂及果房發生黑星病。
- 三、採用系統性藥劑配方，並於清晨葉片向展開時進行防治，每 3-4 週噴施一次。噴藥方式及藥劑配方如下列(可任選一種，並宜輪流施用，避免產生抗藥性。注意此類藥劑不可直接噴及果房。):

農業局 105/08/29

1050904582

(一)、使用肩背式微粒動力噴霧機：

(1) 206.7 g/L 凡殺護矽得乳劑，每公頃 0.5 公升，加水至 30 公升。

(2) 23 % 亞托敏水懸劑，每公頃 0.4 公升，加水至 30 公升。

(3) 25 % 普克利乳劑，每公頃 0.4 公升，加水至 30 公升。

(二)、使用配置落地式捲軸噴藥管之動力噴霧機或自走式噴藥車：藥劑種類同前，惟藥劑濃度凡殺護矽得乳劑、亞托敏水懸劑及普克利乳劑調至 1,000 至 2,000 倍。

(三)、其他防治藥劑及施藥配方，請參考植物保護手冊選用。

四、噴藥作業時，須做好安全措施，全程戴帽、戴口罩及穿長袖衣、長褲，避免皮膚接觸藥液，並將藥液儘量噴至葉片上方



正本：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、台灣香蕉、芒果外銷業者聯誼會、台灣省青果運銷合作社、台灣省青果運銷合作社高雄分社、屏東分社、台中分社、嘉南分社、東台分社、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台中市政府農業局、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府農業局、高雄市政府農業局、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府

副本：行政院農業委員會農糧署、本所農場

台灣香蕉研究所病蟲害預測中心

