

一、依滅列

◎蔥科小葉菜類紫斑病

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
21.2%依滅列 EC (imazalil)	0.5-1.3 公升	1,500	發病初期開始施藥，必要 時隔 7 天施藥一次。	採收前 6 天停 止施藥。

◎葫蘆科小葉菜類、葫蘆科瓜菜類、葫蘆科瓜果類蔓枯病

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
21.2%依滅列 EC (imazalil)	0.4-1 公升	2000	發病初期開始施藥， 必要時隔 7 天施藥一 次。	小葉菜類採收前 6 天、瓜菜類採收前 6 天及瓜果類採收前 3 天停止施藥。

備註：刪除 21.2%依滅列 EC 於瓜果類蔓枯病、西瓜蔓枯病之使用方法與範圍。

二、克收欣

◎蔥科小葉菜類、蔥科根菜類紫斑病

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
44.2%克收欣 SC (kresoxim-methyl)	0.3-0.8 公升	2,500	發病初期開始施藥，必 要時隔 7 天施藥一次。	採收前 10 天停 止施藥。
50%克收欣 WG (kresoxim-methyl)	0.3-0.7 公斤	2,800	發病初期開始施藥，必 要時隔 7 天施藥一次。	採收前 10 天停 止施藥。

備註：刪除 44.2%克收欣 SC 於韭菜紫斑病、蔥紫斑病、蔥科蔬菜紫斑病之使用
方法與範圍。

三、甲鋅保粒素

◎蔥科小葉菜類、蔥科根菜類紫斑病

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
45%甲鋅保粒素 WP (propineb + polyoxin B)	1.6-4 公斤	500	發病初期開始施藥，必 要時隔 7 天施藥一次。	採收前 10 天 停止施藥。

備註：刪除 45%甲鋅保粒素 WP 於蔥科蔬菜類紫斑病、蔥韭紫斑病之使用方法
與範圍。

四、亞托環克座

◎蔥科小葉菜類、蔥科根菜類銹病

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋倍 數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
28%亞托環克座 SC (cyproconazole +azoxystrobin)	0.3-0.7 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時 隔 7 天施藥一次。	採收前 10 天停 止施藥。

備註：刪除 28%亞托環克座 SC 於蔥科葉菜類銹病之使用方法與範圍。

五、銅右滅達樂

◎蔥科小葉菜類、蔥科根菜類露菌病

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍 數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
71.6%銅右滅達樂 WP (copper oxychloride + metalaxyl-M)	1.3-3.3 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時 隔 7 天施藥一次。	採收前 3 天停 止施藥。

備註：刪除 71.6%銅右滅達樂 WP 於蔥科蔬菜類露菌病之使用方法與範圍。

◎修正 羅勒露菌病

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
71.6%銅右滅達樂 WP(Copper oxychloride + Metalaxyl-M)	0.4-1.3 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時 隔 7 天施藥一次。	採收前 3 天停 止施藥。

六、銅減達樂

◎蔥科小葉菜類、蔥科根菜類露菌病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
76.5%銅減達樂 WP (copper oxychloride + metalaxyl)	1.3-3.3 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 3 天停止施藥。

◎羅勒露菌病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
76.5%銅減達樂 WP (copper oxychloride + metalaxyl)	0.4-1.3 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 3 天停止施藥。

七、錳乃浦

◎蔥科小葉菜類、蔥科根菜類露菌病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
80%錳乃浦 WP (maneb)	2-5 公斤	400	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 7 天停止施藥。
37%錳乃浦 SC (maneb)	4-10 公升	200	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 7 天停止施藥。

備註：刪除 80%錳乃浦 WP 蔥科蔬菜類露菌病之使用方法與範圍。

八、多保鏈黴素

◎蔥科小葉菜類、蔥科根菜類細菌性軟腐病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
68.8% 多保鏈黴素 WP (thiophanate-methyl + streptomycin)	0.8-2 公斤	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 12 天停止施藥。

備註：刪除 68.8% 多保鏈黴素 WP 於蔥科蔬菜類細菌性軟腐病之使用方法與範圍。

九、鏈黴素

◎蔥科小葉菜類、蔥科根菜類細菌性軟腐病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
12.5% 鏈黴素 SL (streptomycin)	0.8-2 公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	

備註：刪除 12.5% 鏈黴素 SL 於蔥科蔬菜類細菌性軟腐病之使用方法與範圍。

十、可尼丁

◎水稻飛蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
16%可尼丁 SG (clothianidin)	0.4kg	3,000	田間褐飛蟲密度每叢平均 5 隻左右施藥一次，其後如密度升高至每叢 20 隻以上時，行第二次施藥。	採收前 10 天停止施藥。
0.5%可尼丁 GR (clothianidin)	育苗箱：每公頃施用 50 公克。		育苗箱使用：插秧前 24 小時，將藥劑均勻撒布於育苗箱，並灑水至飽和狀態。	
0.5%可尼丁 GR (clothianidin)	本田：每公頃每次施 40-60 公斤。		本田使用： 1. 害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次。 2. 有施藥時稻田需保持水位約 1 公分。	

備註：刪除 16%可尼丁 SG 於水稻褐飛蟲之使用方法與範圍。

十一、布得芬諾

◎水稻飛蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
15% 布得芬諾 WP (Buprofezin + Tebufenozide)	1.2 公斤	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	收割前 15 天停止施藥

備註：刪除 15% 布得芬諾 WP 於水稻褐飛蟲之使用方法與範圍。

◎水稻螟蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
15% 布得芬諾 WP (Buprofezin + Tebufenozide)	1.2 公斤	1000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	收割前 21 天停止施藥

備註：刪除 15% 布得芬諾 WP 於水稻瘤野螟之使用方法與範圍。

十二、芬佈賜

◎柑桔類蟎類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%芬佈賜 WP (fenbutatin-oxide)	0.5 – 1.2 公斤	2,000	害蟎發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 60 天停止施藥。
50%芬佈賜 SC (fenbutatin-oxide)	0.5 – 1.2 公升	2,000	害蟎發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 60 天停止施藥。

備註：刪除 50%芬佈賜 WP 於柑桔類柑桔葉蟎及 50%芬佈賜 SC 於柑桔類銹蟎之使用方法與範圍。

◎柿樹科梨果類、鼠李科梨果類葉蟎類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%芬佈賜 SC (fenbutatin-oxide)	0.6 – 1.7 公升	1,500	害蟎發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 10 天停止施藥。

備註：刪除 50%芬佈賜 SC 於印度棗葉蟎類之使用方法與範圍。

◎柿樹科梨果類、薔薇科果樹、鼠李科梨果類葉蟬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%芬佈賜 WP (fenbutatin-oxide)	0.6 – 1.7 公斤	1,500	害蟬發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 10 天停止施藥。

備註：刪除 50%芬佈賜 WP 於印度棗葉蟬類、枇杷葉蟬類、桃葉蟬類、梅葉蟬類、梨二點葉蟬、梨果類葉蟬類、蘋果葉蟬類之使用方法與範圍。

十三、依芬寧

◎禾本科雜糧類鱗翅目害蟲

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
20%依芬寧 WP (etofenprox)	0.67 公斤	1,500	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔 10-14 天施藥，共 3 次。	採收前 15 天停止施藥。
10%依芬寧 EC (etofenprox)	1.6 公升	750	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔 10-14 天施藥，共 3 次。	採收前 15 天停止施藥。

備註：刪除 20%依芬寧 WP 於玉米玉米螟之使用方法與範圍。

十四、布瑞莫

◎柿樹科梨果類、薔薇科果樹、鼠李科梨果類白粉病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
250 g/L (25% w/v) 布瑞莫EC (bupirimate)	0.3-0.4 公升	3,000	發病初期開始施藥，每隔 10 天施藥一次，連續三次。	採收前 2 天停止施藥。
25%布瑞莫EC (bupirimate)	0.3-0.4 公升	3,000	發病初期開始施藥，每隔 10 天施藥一次，連續三次。	採收前 2 天停止施藥。

備註：刪除 250 g/L (25% w/v)布瑞莫EC及 25%布瑞莫EC 於梨果類白粉病及蘋果白粉病之使用方法與範圍。

十五、嘉保信

◎菠蘿蜜、榴槤蜜、無花果銹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
75% 嘉保信 WP (oxycarboxin)	0.2-0.4 公斤	4,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 5 天停止施藥。
20% 嘉保信 EC (oxycarboxin)	0.8-1.6 公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 5 天停止施藥。

◎桑樹銹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
20% 嘉保信 EC (oxycarboxin)	0.8-1.6 公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	桑椹採收前 5 天停止施藥。

◎修正桑樹銹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
75% 嘉保信 WP (oxycarboxin)	0.2-0.4 公斤	4,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7-10 天施藥一次。	桑椹、桑葉採收前 5 天停止施藥。

十六、三亞蟎

◎柑桔類葉蟎類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
20% 三亞蟎 EC (amitrax)	2 公升	1,000	害蟎發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 18 日停止施藥。

備註：刪除 20% 三亞蟎 EC 於柑桔類柑桔葉蟎之使用方法與範圍。

十七、賽速安

◎水稻飛蟲類及葉蟬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
25%賽速安 SG (thiamethoxam)	0.3 公斤	1,600	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 10 天停止施藥。

◎茶葉蟬類及粉虱類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
10%賽速安 SG (thiamethoxam)	0.5 公斤	2,000	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 21 天停止施藥。
25%賽速安 SG (thiamethoxam)	0.2 公斤	5,000	害蟲發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 21 天停止施藥。

備註：刪除 25%賽速安 SG 於茶小綠葉蟬之使用方法與範圍。