

毆殺滅

防治對象	藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
水稻線蟲 白尖病	5%毆殺滅粒劑 (oxamyl)	每育苗箱 120 g		秧苗綠化期均勻灑佈。	1. 不可施用於本田。 2. 施藥時必須戴手套。
甘蔗寄生性線蟲	5%毆殺滅粒劑 (oxamyl)	80-120 公斤		將藥劑均勻施於植溝內，覆土後植蔗。	1. 適用於春植砂質地灌溉方便之蔗園區。 2. 施藥時必須戴手套。
茄科果菜類地下部線蟲類	5%毆殺滅粒劑 (oxamyl)	40-80 公斤		移植當日將藥劑條施於15公分深之植溝內，覆土後定植。	1. 限種植前使用，生長期不可施用。 2. 施藥時必須戴手套。
荖藤根瘤線蟲	5%毆殺滅粒劑 (oxamyl)	40 公斤		種植當日將藥劑條施於植溝內再種植；於「落藤」時條施於根莖旁並加以覆土。	施藥時必須戴手套。
晚香玉根瘤線蟲	5%毆殺滅粒劑 (oxamyl)	80 公斤		種植當日施於植溝內，覆土後再種植。	施藥時必須戴手套。
番茄根瘤線蟲	5%毆殺滅粒劑 (oxamyl)	40-80 公斤		移植當日應開溝15公分條施之，並即行覆土，施藥完後可立即栽植。	施藥時必須戴手套。
菸草根瘤線蟲	5%毆殺滅粒劑 (oxamyl)	120 公斤		移植前將藥劑條施於植溝內，並與土壤混拌後覆土定植。	施藥時必須戴手套。

防治對象	藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
葫蘆科瓜果類地下部線蟲類	5%毆殺滅粒劑 (oxamyl)	40-80 公斤		移植當日將藥劑條施於15公分深之植溝內，覆土後定植。	1. 限種植前使用，生長期不可施用。 2. 施藥時必須戴手套。
葫蘆科瓜菜類地下部線蟲類	5%毆殺滅粒劑 (oxamyl)	40-80 公斤		移植當日將藥劑條施於15公分深之植溝內，覆土後定植。	1. 限種植前使用，生長期不可施用。 2. 施藥時必須戴手套。