

一、氟比賽得

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
葡萄露菌病	71.1%氟比賽得 WG (Fluopicolide+ Fosetyl-Al)	0.6 公斤	1200	發病初期開始 施藥，每隔 7 天施藥一次， 連續 4 次。	採收前 21 天停止施 藥。

備註：申請廠商為台灣拜耳股份有限公司。

二、亞派占

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
葫蘆科瓜菜 類、葫蘆科瓜 果類白粉病	125g/L 亞派占 (12.5% w/v) EC (Isopyrazam)	0.2-1 公 升	2000	發病初期開始 施藥，每隔 7 天施藥一次。	採收前 3 天 停止施藥。

備註：申請廠商為台灣先正達股份有限公司。

三、因汀氟滅

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及 方法	注 意 事 項
十字花科 包葉菜類 鱗翅目蝶 蛾類	10%因汀氟滅 WG (Emamectin benzoate + flubendiamide)	0.1-0.3 公 斤	3000	害蟲發生 時開始施 藥，每隔 7 天施藥一 次，連續 2 次。	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止施 藥。
十字花科 小葉菜類 鱗翅目蝶 蛾類	10%因汀氟滅 WG (Emamectin benzoate + flubendiamide)	0.1-0.3 公 斤	4000	害蟲發生 時開始施 藥，害蟲密 度低時，施 藥一次。必 要時，每隔 7 天施藥一 次，連續 2 次。	採收前 3 天 (設施栽培 9 天)停止施 藥。

備註：申請廠商為惠光股份有限公司。

四、三氟派瑞

作物/害物	藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
檬果炭疽病	500 g/L 三氟派 瑞 SC (fluopyram+ trifloxystrobin)	0.3 公升	4000	結果後每隔 14 天施藥 1 次至 套袋前為止。	採收前 18 天停止施 藥。

備註：申請廠商為台灣拜耳股份有限公司。