

- 一、 增列**亞托敏**用於防治繖形花科小葉菜類葉斑病；羅勒、蔥科小葉菜類、藜科小葉菜類、豆科小葉菜類露菌病；旋花科小葉菜類、莧科小葉菜類白銹病；菊科小葉菜類露菌病與白銹病；葫蘆科露菌病。

(一)繖形花科小葉菜類葉斑病

藥 劑 名 稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋 倍數 (倍)	施藥時期及方法	注 意 事 項
10% 亞托敏 SC (azoxystrobin)	1.1 公 升	900	發病初期開始施藥，必要時隔 10 天施藥一次。	1. 採收前 10 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。
23% 亞托敏 SC (azoxystrobin)	0.5 公 升	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔 10 天施藥一次。	1. 採收前 10 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋 倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
250 g/L (25% W/V) 亞托敏 SC (azoxystrobin)	0.5 公 升	2000	發病初期開始施藥，必要時隔 10 天施藥一次。	1. 採收前 10 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。
50% 亞托敏 WG (azoxystrobin)	0.2 公 斤	4500	發病初期開始施藥，必要時隔 10 天施藥一次。	1. 採收前 10 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。

(二)羅勒、蔥科小葉菜類、藜科小葉菜類、豆科小葉菜類露菌病；旋花科小葉菜類、莧科小葉菜類、菊科小葉菜類露菌病與白銹病

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋 倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
10% 亞托敏 SC (azoxystrobin)	1.1 公 升	900	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 10 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋 倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
				使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。
23% 亞托敏 SC (azoxystrobin)	0.5 公 升	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 10 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。
250 g/L (25% W/V) 亞托敏 SC (azoxystrobin)	0.5 公 升	2000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 10 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。
50% 亞托敏 WG (azoxystrobin)	0.2 公 斤	4500	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 10 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。

(三)葫蘆科小葉菜類露菌病

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋 倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
10% 亞托敏 SC (azoxystrobin)	1.1 公 升	900	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 6 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。
23% 亞托敏 SC (azoxystrobin)	0.5 公 升	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 6 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。
250 g/L (25% W/V) 亞托敏 SC (azoxystrobin)	0.5 公 升	2000	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 6 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋 倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
50% 亞托敏 WG (azoxystrobin)	0.2 公 斤	4500	發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 6 天停止施藥。 2. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 3. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4. 避免與高浸透性展著劑混合使用，以免發生藥害。 5. 避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。

二、增列**福多寧**用於防治葉用甘藷、莧菜、莧菜、洋蔥、芋、茼蒿、甘藷、樹薯白絹病。

(一)葉用甘藷白絹病、莧菜白絹病、莧菜白絹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
15%福多寧 EC (flutolanil)	1.0-1.7 公升	900	發病初期開始施藥於植株莖基部，以後每隔 10 天施藥一次，連續三次。	採收前 18 天停止施藥
20%福多寧 SC (flutolanil)	0.8-1.3 公升	1200	發病初期開始施藥於植株莖基部，以後每隔 10 天施藥一次，連續三次。	採收前 18 天停止施藥
50%福多寧 WP (flutolanil)	0.3-0.5 公斤	3000	發病初期開始施藥於植株莖基部，以後每隔 10 天施藥一次，連續三次。	採收前 18 天停止施藥

(二)蔥科小葉菜類白絹病及蔥科根菜類白絹病、芋白絹病、茼蒿白絹病、甘藷白絹病、樹薯白絹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
15%福多寧 EC (flutolanil)	1.0-1.3 公升	900	發病初期開始施藥於植株莖基部，以後每隔 10 天施藥一次，連續三次。	根菜類之安全採收期為 21 天；小葉菜類之安全採收期為 18 天
20%福多寧 SC (flutolanil)	0.8-1.0 公升	1200	發病初期開始施藥於植株莖基部，以後每隔 10 天施藥一次，連續三次。	根菜類之安全採收期為 21 天；小葉菜類之安全採收期為 18 天

藥 劑 名 稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注 意 事 項
50%福多寧 WP (flutolanil)	0.3-0.4 公斤	3000	發病初期施藥一次，7 天後再施藥一次。	根菜類之安全採收期為 21 天；小葉菜類之安全採收期為 18 天

三、增列撲滅寧用於防治十字花科小葉菜類、十字花科包葉菜類、十字花科根菜類、結球萵苣菌核病；十字花科小葉菜類、十字花科包葉菜類、香椿、錦葵科果菜類、十字花科根菜類灰黴病；山藥、百合、芋、甜菜、山蘇、豆科乾豆類、胡麻、菱角白絹病，以及刪除刪除 60%撲滅寧 WP 的使用範圍。

(一)十字花科小葉菜類、十字花科包葉菜類菌核病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%撲滅寧 WP (procymidone)	0.75-1 公斤	2000	發病初期於植株莖基部澆灌，必要時隔 10 天再施藥一次。	1. 採收前 7 天停止施藥。 2. 施用於十字花科蔬菜幼苗時，注意避免發生藥害。易發生藥害，不可任意提高劑量。

(二)十字花科根菜類菌核病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%撲滅寧 WP (procymidone)	0.75-1 公斤	2000	發病初期於植株莖基部澆灌，必要時隔 10 天再施藥一次。	1. 採收前 14 天停止施藥。 2. 施用於十字花科蔬菜幼苗時，注意避免發生藥害。易發生藥害，不可任意提高劑量。

(三)結球萵苣菌核病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%撲滅寧 WP (procymidone)	0.75-1 公斤	2000	發病初期於植株莖基部澆灌，必要時隔 10 天再施藥一次。	採收前 7 天停止施藥。易發生藥害，不可任意提高劑量。

(四)十字花科小葉菜類、十字花科包葉菜類、香椿灰黴病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%撲滅寧 WP (procymidone)	0.5 公斤	2000	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天再施藥一次。	1. 採收前 7 天停止施藥。 2. 施用於十字花科蔬菜幼苗時，注意避免發生藥害。

(五)錦葵科果菜類灰黴病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%撲滅寧 WP (procymidone)	0.5 公斤	2000	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天再施藥一次。	採收前 6 天停止施藥。

(六)十字花科根菜類灰黴病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%撲滅寧 WP (procymidone)	0.5 公斤	2000	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天再施藥一次。	1. 採收前 14 天停止施藥。 2. 施用於十字花科蔬菜幼苗時，注意避免發生藥害。

(七)山藥、百合、芋、甜菜 白絹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%撲滅寧 WP (procymidone)	0.5 公斤	2000	發病初期於植株莖基部澆灌。	採收前 14 天停止施藥。

(八)山蘇白絹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%撲滅寧 WP (procymidone)	0.5 公斤	2000	病害發生初期開始施藥，必要時隔 10 天再施藥一次。	採收前 7 天停止施藥。

(九)豆科乾豆類、胡麻 白絹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%撲滅寧 WP (procymidone)	0.5 公斤	2000	定植後每株灌注 200 毫升，15 天後再灌注一次。	限定植時使用

(十)菱角白絹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%撲滅寧 WP (procymidone)	0.5 公斤	2000	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天再施藥一次。	採收前 14 天停止施藥。

(十一)蔥科小葉菜類白絹病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%撲滅寧 WP (procymidone)	0.5 公斤	2000	病害發生初期開始施藥，每隔 10 天再施藥一次。	採收前 14 天停止施藥。

四、增列**毆殺滅**用於防治茄科果菜類、葫蘆科瓜菜類、葫蘆科瓜果類 地下部線蟲類。

(一)茄科果菜類、葫蘆科瓜菜類、葫蘆科瓜果類 地下部線蟲類

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋 倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
10% 毆 殺 滅 GR (oxamy1)	20-40 公 斤		1. 移植當日將藥劑條施於 15 公分深之植溝內，覆土後 定植。2. 土壤須保持濕潤才 能發揮藥效。	1. 限種植前使用，生長期不 可施用。2. 施藥時必須戴手 套。3. 對蜜蜂具毒性，避免 開花時使用。

五、增列**益達胺**用於防治茄科小葉菜類、葫蘆科小葉菜類、十字花科小葉菜類、十字花科包葉菜類、菊科小葉菜類、旋花科小葉菜類、藜科小葉菜類、蔥科小葉菜類、繖形花科小葉菜類、唇形科小葉菜類蚜蟲類；豆科豆菜類粉蝨類。

(一)茄科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
9.6%益達胺 SC (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 6 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
9.6%益達胺 SL (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 6 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
18.2% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 6 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
28.8% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 6 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

(二)葫蘆科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
9.6%益達胺 SC (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
9.6%益達胺 SL (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注意事項
18.2% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
28.8% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

(三)十字花科小葉菜類、十字花科包葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍 數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
9.6% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
9.6% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
18.2% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
28.8% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

(四) 菊科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
9.6% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
9.6% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
28.8% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

(五) 旋花科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
9.6% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
9.6% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
18.2% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始 施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停 止施藥。 2. 避免施用於弱勢 苗，以免發生藥害。 對蜜蜂具毒性，避免 開花時使用
28.8% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始 施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停 止施藥。 2. 避免施用於弱勢 苗，以免發生藥害 。對蜜蜂具毒性， 避免開花時使用

(六) 藜科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
9.6% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施 藥，必要時隔 7 天 施藥一次。	1. 採收前 9 天停 止施藥。 2. 避免施用於弱 勢苗，以免發生藥 害。對蜜蜂具毒性 ，避免開花時使用
9.6% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施 藥，必要時隔 7 天 施藥一次。	1. 採收前 9 天停 止施藥。 2. 避免施用於弱 勢苗，以免發生藥 害。對蜜蜂具毒性 ，避免開花時使用
18.2% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施 藥，必要時隔 7 天 施藥一次。	1. 採收前 9 天停 止施藥。 2. 避免施用於弱勢 苗，以免發生藥 害。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
28.8% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

(七)蔥科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
9.6% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
9.6% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
18.2% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
28.8% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

(八)繖形花科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
9.6% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
9.6% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
18.2% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
28.8% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

(九)唇形科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
9.6% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
9.6% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
18.2% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
28.8% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

(十)豆科豆菜類粉蝨類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
9.6%益達胺 SC (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
9.6%益達胺 SL (imidacloprid)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
18.2% 益達胺 SC (imidacloprid)	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用
28.8% 益達胺 SL (imidacloprid)	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1. 採收前 9 天停止施藥。 2. 避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用

六、增列**四氯異苯腈**用於防治葫蘆科小葉菜類、葫蘆科瓜菜類、葫蘆科瓜果露菌病。

(一)葫蘆科小葉菜類、葫蘆科瓜菜類、葫蘆科瓜果露菌病

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
75% 四氯異苯腈 WP (chlorothalonil)	2-3 公斤	500	發病初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續 3 至 4 次。	1. 小葉菜類、瓜菜類採收前 7 天停止施藥，瓜果類採收前 14 天停止施藥。 2. 藥液應噴施於葉片上下兩面。
75% 四氯異苯腈 WG (chlorothalonil)	2-3 公斤	500	發病初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續 3 至 4 次。	1. 小葉菜類、瓜菜類採收前 7 天停止施藥，瓜果類採收前 14 天停止施藥。 2. 藥液應噴施於葉片上下兩面。
40% 四氯異苯腈 SC (chlorothalonil)	1-1.2 公升	1000	發病初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續 3 次。	1. 小葉菜類、瓜菜類採收前 7 天停止施藥，瓜果類採收前 14 天停止施藥。 2. 藥液應噴施於葉片上下兩面。

七、增列**佈飛松**用於防治菊科小葉菜類、菊科包葉菜類、菊科根菜類薊馬類。

(一)菊科小葉菜類、菊科包葉菜類薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍 數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
43% 佈飛松 EC (profenofos)	1.5-2.0 公升	800	害蟲發生時，開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 10 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

(二)菊科根菜類薊馬類（根菜類農藥殘留容許量為 0.05 ppm）

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍 數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
43% 佈飛松 EC (profenofos)	1.5-2.0 公升	800	害蟲發生時，開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	採收前 10 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

八、增列**賓克隆**用於防治旋花科小葉菜類根腐病；繖形花科小葉菜類莖腐病；茄科小葉菜類苗立枯病；莧科小葉菜類葉枯病；菊科小葉菜類、葫蘆科小葉菜類、蔥科小葉菜類立枯病；豆科小葉菜類立枯病及苗腐病。

(一)旋花科小葉菜類(葉用甘藷)根腐病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
23.2% 賓克隆 SC (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。
25% 賓克隆 WP (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。

(二)繖形花科小葉菜類(芹菜)莖腐病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
23.2% 賓克隆 SC (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。
25% 賓克隆 WP (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。

(三)茄科小葉菜類苗立枯病

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍 數 (倍)	施藥時期及方法	注 意 事 項
23.2% 賓克隆 SC (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗 出現病斑時澆灌一 次。	1. 採收前 15 天停止 施藥。 2. 對水生物劇毒，標 示應加註魚毒警告標 誌。
25% 賓克隆 WP (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗 出現病斑時澆灌一 次。	1. 採收前 15 天停止 施藥。 2. 對水生物劇毒，標 示應加註魚毒警告標 誌。

(四)莧科小葉菜類 (莧菜)葉枯病

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍 數 (倍)	施藥時期及方法	注 意 事 項
23.2% 賓克隆 SC (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗 出現病斑時澆灌一 次。	1. 採收前 15 天停止 施藥。 2. 對水生物劇毒，標 示應加註魚毒警告標 誌。
25% 賓克隆 WP (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗 出現病斑時澆灌一 次。	1. 採收前 15 天停止 施藥。 2. 對水生物劇毒，標 示應加註魚毒警告標 誌。

(五) 菊科小葉菜類立枯病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
23.2% 賓克隆 SC (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。
25% 賓克隆 WP (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。

(六) 葫蘆科小葉菜類 (龍鬚菜) 立枯病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
23.2% 賓克隆 SC (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。
25% 賓克隆 WP (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。

(七)蔥科小葉菜類立枯病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
23.2% 賓克隆 SC (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。
25% 賓克隆 WP (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。

(八)豆科小葉菜類立枯病及苗腐病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
23.2% 賓克隆 SC (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。
25% 賓克隆 WP (pencycuron)	2.5 公升	1,000	苗床播種後，或幼苗出現病斑時澆灌一次。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 對水生物劇毒，標示應加註魚毒警告標誌。

九、擬增列**納乃得**用於防治莧科小葉菜類、葫蘆科小葉菜類、十字花科小葉菜類、十字花科包葉菜類、菊科小葉菜類、菊科包葉菜類、旋花科小葉菜類、旋花科根菜類、藜科小葉菜類、繖形花科小葉菜類、繖形花科包葉菜、唇形科小葉菜類、蔥科小葉菜類、蔥科根菜類、茄科小葉菜類、茄科果菜類、茄科根菜類、禾本科小葉菜類、禾本科根菜類、芋頭蚜蟲類。

(一)莧科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥方法	注意事項
40%納乃得 SP (methomyl)	0.6-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。
40%納乃得 SP-SB(methomyl)	0.6-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。
40%納乃得 SG(methomyl)	0.6-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。
25%納乃得 SP(methomyl)	0.6-0.8 公斤	1000	蟲害發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。

(二)葫蘆科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥方法	注意事項
40%納乃得 SP(methomyl)	0.6-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥。
40%納乃得 SP-SB(methomyl)	0.6-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥方法	注意事項
40%納乃得 SG(methomyl)	0.6-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥。
25%納乃得 SP(methomyl)	0.6-0.8 公斤	1000	蟲害發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥。

(三)十字花科小葉菜類、十字花科包葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SP (methomyl)	0.6-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，包葉菜類及根菜類採收前 6 天停止施藥。
40%納乃得 SP-SB (methomyl)	0.6-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，包葉菜類及根菜類採收前 6 天停止施藥。
40%納乃得 SG (methomyl)	0.6-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，包葉菜類及根菜類採收前 6 天停止施藥。
25%納乃得 SP (methomyl)	0.9-1.2 公斤	1000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，包葉菜類及根菜類採收前 6 天停止施藥。

(四) 菊科小葉菜類、菊科包葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SP (methomyl)	0.5-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，包葉菜類及根菜類採收前 6 天停止施藥。
40%納乃得 SP-SB (methomyl)	0.5-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，包葉菜類及根菜類採收前 6 天停止施藥。
40%納乃得 SG (methomyl)	0.5-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，包葉菜類及根菜類採收前 6 天停止施藥。
25%納乃得 SP (methomyl)	0.8-1.2 公斤	1000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，包葉菜類及根菜類採收前 6 天停止施藥。

(五) 旋花科小葉菜類、旋花科根菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SP (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。
40%納乃得 SP-SB (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SG (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。
25%納乃得 SP (methomyl)	0.2-1.2 公斤	1000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。

(六) 藜科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SP (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。
40%納乃得 SP-SB (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。
40%納乃得 SG (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。
25%納乃得 SP (methomyl)	0.2-1.2 公斤	1000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。

(七) 繖形花科小葉菜類、繖形花科根菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SP (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。
40%納乃得 SP-SB (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SG (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。
25%納乃得 SP (methomyl)	0.2-1.2 公斤	1000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。

(八)唇形科小葉菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SP (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。
40%納乃得 SP-SB (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。
40%納乃得 SG (methomyl)	0.1-0.8 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。
25%納乃得 SP (methomyl)	0.2-1.2 公斤	1000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	採收前 4 天停止施藥。

(九)蔥科小葉菜類、蔥科根菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SP (methomyl)	0.5-1.3 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 10 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SP-SB (methomyl)	0.5-1.3 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 10 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。
40%納乃得 SG (methomyl)	0.5-1.3 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 10 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。
25%納乃得 SP (methomyl)	0.8-2.0 公斤	1000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類採收前 10 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。

(十)茄科小葉菜類、茄科果菜類、茄科根菜類蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SP (methomyl)	0.4-1.4 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類及果菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。
40%納乃得 SP-SB (methomyl)	0.4-1.4 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類及果菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。
40%納乃得 SG (methomyl)	0.4-1.4 公斤	1500	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類及果菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。
25%納乃得 SP (methomyl)	0.6-2.1 公斤	1000	蟲害發生時開始施藥，必要時每隔 7 天施藥一次。	小葉菜類及果菜類採收前 4 天停止施藥，根菜類採收前 6 天停止施藥。

(十一)芋頭蚜蟲類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
40%納乃得 SP (methomyl)	0.4-1.1 公斤	1500	蟲害發生時開始施 藥，必要時每隔 7 天 施藥一次。	採收前 6 天停 止施藥。
40%納乃得 SP-SB (methomyl)	0.4-1.1 公斤	1500	蟲害發生時開始施 藥，必要時每隔 7 天 施藥一次。	採收前 6 天停 止施藥。
40%納乃得 SG (methomyl)	0.4-1.1 公斤	1500	蟲害發生時開始施 藥，必要時每隔 7 天 施藥一次。	採收前 6 天停 止施藥。
25%納乃得 SP (methomyl)	0.6-1.6 公斤	1000	蟲害發生時開始施 藥，必要時每隔 7 天 施藥一次。	採收前 6 天停 止施藥。

十、增列**賽滅寧**用於防治唇形科小葉菜類、旋花科小葉菜類、繖形花科小葉菜類、莧科小葉菜類、蔥科小葉菜類、豆科小葉菜類、茄科小葉菜類、茄科果菜類、菊科小葉菜類、菊科包葉菜類、葫蘆科小葉菜類、葫蘆科瓜果類夜蛾類；蔥科小葉菜類、豆科小葉菜類、茄科小葉菜類、茄科果菜類、葫蘆科小葉菜類、葫蘆科瓜果類、菊科小葉菜類、菊科包葉菜類薊馬類。

(一)唇形科小葉菜類、旋花科小葉菜類、繖形花科小葉菜類、莧科小葉菜類 夜蛾類

藥 劑 名 稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及 方法	注 意 事 項
10%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.3-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.7-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EW (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 ME (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EC (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

(二)旋花科小葉菜類

藥 劑 名 稱	每公頃每次施藥 量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及 方法	注 意 事 項
10%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.3-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時 開始施藥，必 要時隔 7 天 施藥 1 次	採收前 6 天停止施 藥。對水生物具毒 性，避免於水域使 用。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用。
5%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.7-1.6 公斤	750	害蟲發生時 開始施藥，必 要時隔 7 天 施藥 1 次	採收前 6 天停止施 藥。對水生物具毒 性，避免於水域使 用。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用。
5%賽滅寧 EW (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時 開始施藥，必 要時隔 7 天 施藥 1 次	採收前 6 天停止施 藥。對水生物具毒 性，避免於水域使 用。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用。
5%賽滅寧 ME (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時 開始施藥，必 要時隔 7 天 施藥 1 次	採收前 6 天停止施 藥。對水生物具毒 性，避免於水域使 用。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用。
5%賽滅寧 EC (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時 開始施藥，必 要時隔 7 天 施藥 1 次	採收前 6 天停止施 藥。對水生物具毒 性，避免於水域使 用。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用。

(三)蔥科小葉菜類、豆科小葉菜類 夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
10%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.3-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.7-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EW (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 ME (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EC (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

(四)茄科小葉菜類、茄科果菜類 夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
10%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.3-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及果菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.7-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及果菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
5%賽滅寧 EW (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及果菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 ME (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及果菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EC (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及果菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

(五) 菊科小葉菜類、菊科包葉菜類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
10%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.3-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及包菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.7-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及包菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EW (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及包菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 ME (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及包菜類採收前 6 天停止施藥。對蜜蜂具毒

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
				性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EC (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始 施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及包菜 類採收前 6 天停止 施藥。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用。

(六)葫蘆科小葉菜類、葫蘆科瓜果類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
10%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.3-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始 施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及瓜果 類採收前 6 天停止 施藥。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用。
5%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.7-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始 施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及瓜果 類採收前 6 天停止 施藥。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用。
5%賽滅寧 EW (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始 施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及瓜果 類採收前 6 天停止 施藥。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用。
5%賽滅寧 ME (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始 施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及瓜果 類採收前 6 天停止 施藥。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用。
5%賽滅寧 EC (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始 施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次	小葉菜類及瓜果 類採收前 6 天停止 施藥。對蜜蜂具毒 性，避免開花時使 用。

(七)蔥科小葉菜類、豆科小葉菜類 薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
10%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.3-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.7-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EW (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 ME (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EC (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

(八)茄科小葉菜類、茄科果菜類 薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
10%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.3-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及果菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.7-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及果菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
5%賽滅寧 EW (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及果菜類 採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 ME (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及果菜類 採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EC (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及果菜類 採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

(九)葫蘆科小葉菜類、葫蘆科瓜果類 薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
10%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.3-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及瓜果類 採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.7-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及瓜果類 採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EW (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及瓜果類 採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 ME (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及瓜果類 採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

藥 劑 名 稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
				性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EC (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及瓜果類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

(十) 菊科小葉菜類、菊科包葉菜類 薊馬類

藥 劑 名 稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方 法	注 意 事 項
10%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.3-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及包菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 WP (cypermethrin)	0.7-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及包菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EW (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及包菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 ME (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及包菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。
5%賽滅寧 EC (cypermethrin)	0.7-1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次	小葉菜類及包菜類採收前6天停止施藥。對蜜蜂具毒性，避免開花時使用。

十一、增列**滅達樂**用於防治茄科小葉菜類、菊科小葉菜類、葫蘆科小葉菜類、蔥科小葉菜類及豆科小葉菜類疫病。

增列右**滅達樂**用於防治茄科小葉菜類、菊科小葉菜類、葫蘆科小葉菜類、蔥科小葉菜類及豆科小葉菜類疫病。

(一)用於防治茄科小葉菜類、菊科小葉菜類、葫蘆科小葉菜類、蔥科小葉菜類及豆科小葉菜類疫病。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥方法	注意事項
35%滅達樂 WP (metalaxyl)	3 公克		3 公克藥劑加水 10 毫升，藥劑配成漿狀，與種子拌勻後播種。	限拌種前施用。
35%滅達樂 SC (metalaxyl)	3 公克		3 公克藥劑加水 10 毫升，藥劑配成漿狀，與種子拌勻後播種。	限拌種前施用。
17.5%滅達樂 SL (metalaxyl)	5 毫升		每公斤種子使用 5 毫升，將種子放入塑膠袋內，徐徐倒入藥液均勻混拌。	限拌種前施用。
35%滅達樂 WS (metalaxyl)	3 公克		3 公克藥劑加水 10 毫升，藥劑配成漿狀，與種子拌勻後播種。	限拌種前施用。

(二)茄科小葉菜類、菊科小葉菜類、葫蘆科小葉菜類、蔥科小葉菜類及豆科小葉菜類疫病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥時期及方法	注意事項
2.5%右滅達樂 GR (Metalaxyl-M)	20 公斤		種植前於畦面均勻施藥	限種植前使用

十二、增列**賽滅淨**用於防治旋花科小葉菜類、繖形花科小葉菜類、茄科小葉菜類、莧科小葉菜類、葫蘆科小葉菜類、藜科小葉菜類潛蠅類，修正蔥科蔬菜菜類潛蠅類使用範圍。

(一)用於防治旋花科小葉菜類、繖形花科小葉菜類、茄科小葉菜類、莧科小葉菜類、葫蘆科小葉菜類、藜科小葉菜類潛蠅類

藥劑名稱	每公頃每次 施藥量	稀釋倍數	施藥方法	注意事項
8.9%賽滅淨 SL (cyromazine)	0.3-1.3 公 升	800	害蟲發生時開始施 藥，必要時隔 7 至 14 天施藥一次。	小葉菜類採收前 7 天停止施藥。
75%賽滅淨 WP (cyromazine)	0.1-0.2 公 斤	5000	害蟲發生時開始施 藥，必要時隔 7 至 14 天施藥一次。	小葉菜類採收前 7 天停止施藥。