

「庫斯蘇力菌 SA-12」農藥使用方法及其範圍

70% (16,000 IU/MG) 庫斯蘇力菌 SA-12 WP 可溼性粉劑

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
玉米	玉米螟	1.6-2 公斤	600	輪生期施 藥					雄花抽穗, 吐 絲初, 吐絲後 及全吐絲後 5 天各一次, 展 著劑 YAMATO3000 倍	
十字花科 包葉菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	10					
十字花科 包葉菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	10					
十字花科 包葉菜類	擬尺蠖	0.4-0.6 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 包葉菜類	小菜蛾	0.4-0.6 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 包葉菜類	紋白蝶	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 小葉菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	10					
十字花科 小葉菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	10					
十字花科 小葉菜類	擬尺蠖	0.4-0.6 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 小葉菜類	小菜蛾	0.4-0.6 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花科 小葉菜類	紋白蝶	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 根菜類	菜心螟		1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	10					
十字花科 根菜類	大菜螟		1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	10					
十字花科 根菜類	擬尺蠖	0.4-0.6 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 根菜類	小菜蛾	0.4-0.6 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
十字花科 根菜類	紋白蝶	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					
茶	茶蠹	0.5 公斤	2,000		-				1. 盡量在幼 齡時期施 藥。 2. 發生茶叢 行局部施 藥。	
檳榔	椰子 綴蛾	0.5 公斤	600	害蟲發生 初期開 始施藥。	14	2				本項新 增。