

「貝萊斯芽孢桿菌 BF」農藥使用方法及其範圍

中華民國 109 年 5 月 4 日農授防字第 1091488539I 號公告

中華民國 110 年 6 月 1 日農授防字第 1101489024B 號公告

1×10⁹ CFU/G 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑(WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	白葉枯病	1.67 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次			全株均勻噴施。	
油菜	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次			適用於油菜籽。	
十字花科包葉菜類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				
十字花科小葉菜類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				
十字花科根菜類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				
草莓	灰黴病	2 公斤	600	病害發生初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續三次；進一步施藥則視病害發展和藥劑的持效期而定。					藥液須均勻噴施於植株全株。	
檬果	黑斑病	2 公斤	600	葉部發病初期開始，每隔 7 天施藥						

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				一次，連續3次。幼果形成後開始施藥，每隔7天施藥一次，連續4次。						
柿	灰黴病	1.66公斤	600	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次；進一步施藥則視病害發展和藥劑的持效期而定。					藥液須均勻噴施於植株。	
<u>蓮霧</u>	<u>炭疽病</u>	<u>5公斤</u>	<u>600</u>	<u>開花盛期開始施藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續4-5次</u>				本項新增。原始登記廠商名稱：亞亮生技股份有限公司
<u>茶</u>	<u>赤葉枯病</u>	<u>1.67公斤</u>	<u>600</u>	<u>病害發生初期開始施藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續4次</u>				本項新增。原始登記廠商名稱：亞亮生技股份有限公司