

檔號：

保存年限：

財團法人台灣香蕉研究所

函

地址：904 屏東縣九如鄉玉泉村榮泉街 1 號

承辦人：蘇慶昌

電話：(08)7392111~3

傳真：(08)7390595

E-mail：succccc@yahoo.com.tw

受文者：台南市政府農業局

發文日期：中華民國 104 年 3 月 10 日

發文字號：(104)台蕉研發字第 2580 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：避免造成蕉果嚴重水銹斑而影響香蕉外觀優良品質，請蕉農務必把握抽穗期蕉株花薊馬防治時機作業，請查照。

說明：

- 一、香蕉花薊馬於初春時期易於生長繁殖，尤以種植“寶島蕉”(新北蕉)及“台蕉七號”且逢蕉株抽穗蕉園者為甚。倘若香蕉花苞抽出莖頂，尚未彎曲前疏忽花薊馬防治，易導致花薊馬侵入花苞，在香蕉幼果果皮上產卵及剝吸汁液，造成果皮外表出現許多卵斑及水銹疤痕，影響香蕉外觀品質至鉅。務請蕉農把握防治時機，及時進行田間花薊馬防治作業。
- 二、防治方法：每 3~5 天巡視蕉園 1 次，在花苞抽出莖頂前期或初彎前，選擇下列一種藥劑配方防治：
 - (一)、以 2.8 % 第滅寧乳劑 3,000 倍液，噴施剛抽出莖頂或初彎下花苞，每隔 5 天噴施 1 次，共噴 3 次。
 - (二)、5 % 陶斯松粒劑或 10 % 福瑞松粒劑：每株 15 公克，分別撒施於第 1、2 葉鞘內，並於終花期前以 2.8 % 第滅寧乳劑 3,000 倍液噴果房 1 次。
 - (三)、終花後切除花苞，減少蕉園花薊馬密度。
 - (四)、定期防除蕉園雜草，避免花薊馬滋生擴散



正本：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、台灣香蕉、芒果外銷業者聯誼會、台灣省青果運銷合作社、台灣省青果運銷合作社高雄分社、屏東分社、台中分社、嘉南分社、東台分社、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台中市政府農業局、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府農業局、高雄市政府農業局、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府

副本：行政院農業委員會農糧署、本所農場

農業局 104/03/10



1040249828

