

玉米秋行軍蟲緊急防治藥劑及其使用方法與範圍

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時期及方法 | 注意事項 |
|--|----------------|-------|---|---------------|
| 5.87% 賜諾特 SC (spinetoram) | 0.625 公升 | 1,600 | 於玉米播種後 25-35 天，發現幼蟲時開始施藥，隔 10 天施藥 1 次，連續 2 次；於 50% 雄花抽穗時開始施藥，隔 10 天施藥 1 次，連續 2 次，全期計施藥 4 次。 | 採收前 9 天停止施藥。 |
| 11.7% 賜諾特 SC (spinetoram) | 0.33 公升 | 3,000 | 於玉米播種後 25-35 天，發現幼蟲時開始施藥，隔 10 天施藥 1 次，連續 2 次；於 50% 雄花抽穗時開始施藥，隔 10 天施藥 1 次，連續 2 次，全期計施藥 4 次。 | 採收前 9 天停止施藥。 |
| 100 G/L (10% W/V) 諾伐隆 DC (novaluron) | 0.5-0.8 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | 採收前 10 天停止施藥。 |
| 20% 氟大滅 WG (flubendiamide) | 0.3-0.35 公斤 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | 採收前 21 天停止施藥。 |
| 18.4% 剋安勃 SC (chlorantraniliprole) | 0.1-0.3 公升 | 2,500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 10-14 天施藥一次。 | 採收前 14 天停止施藥。 |
| 5% 護賽寧 SL (flucythrinate) | 1 公升 | 800 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7-10 天施藥一次。 | 採收前 15 天停止施藥。 |
| 10% 依芬寧 EC (etofenprox) | 1.6 公升 | 750 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 10-14 天施藥一次。 | 採收前 15 天停止施藥。 |
| 20% 依芬寧 WP (etofenprox) | 0.67 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 10-14 天施藥 | 採收前 15 天停止施 |

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數 | 施藥時期及方法 | 注意事項 |
|----------------------------|-------------|-------|--|------|
| | | | 一次。 | 藥。 |
| 75% 硫敵克 WP (thiodicarb) | | | 每公頃使用 250 克硫敵克混合 10-15 公斤米糠與 1 公斤蔗糖之餌料，於植株莖基部施用，以防治 3 齡以上幼蟲。 | |
| 48.1% 蘇力菌 WG | 0.8-1 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | |
| 54% 鮎澤蘇力菌 NB-200 WG | 0.8-1 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | |